

## frühe Beschwerde: Tränen der Augen

07f

allgemeine Angaben		00ALL %	ja, Tränen der Augen	nein/k. A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
<b>allgemeine Fragen</b>								0
Männerquote (Frauenquote = 100% - Männerquote)			60,0	59,7	0,3	59,3	0,7	00B
Anzahl Probanden			50,0	186,0	136,0	236,0	-186,0	thl SIGEL
Wert/Code			1,0	0,0	1,0	9,0	-8,0	Value
Lebenseinstellung		01LEB %	ja, Tränen der Augen	nein/k. A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
<b>Selbsteinschätzung</b>								11
ernst			46,0	40,9	5,1	42,0	4,1	11.1
pflichtbewusst			86,0	84,4	1,6	84,8	1,3	11.2
strebsam			68,0	47,3	20,7	51,7	16,3	11.3
gründlich			54,0	55,9	-1,9	55,5	-1,5	11.4
Empfindsam, "dünnhäutig"			56,0	50,5	5,5	51,7	4,3	11.5
fröhlich			32,0	35,5	-3,5	34,8	-2,8	11.6
spontan			16,0	21,0	-5,0	19,9	-3,9	11.7
leichtlebig			2,0	3,8	-1,8	3,4	-1,4	11.8
humorvoll			18,0	30,6	-12,6	28,0	-10,0	11.9
<b>musikalische Betätigung</b>								12
Instrument gespielt?			26,0	22,6	3,4	27,5	-1,5	16A
<b>psychosoziale Faktoren</b>								13
Spannungen: im Beruf			44,0	25,8	18,2	29,7	14,3	21BER
Spannungen: in der Familie			48,0	47,3	0,7	47,5	0,5	21FAM
Spannungen: im Freundes/Bekanntkreis			6,0	4,3	1,7	4,7	1,3	21FREU
Neigung eigene Gefühle zu unterdrücken			72,0	64,0	8,0	65,7	6,3	22
Depressionsquote			34,0	33,3	0,7	64,4	-30,4	34JN
Ernährung, Verdauung, Genußmittel		02ERN %	ja, Tränen der Augen	nein/k. A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
<b>Ernährung allgemein</b>								20
Viel Obst und Rohkost im Jahr. vor Erkrankung			58,0	54,3	3,7	55,1	2,9	24
Gerne süße Speisen/Cola/Limo			76,0	80,6	-4,6	79,7	-3,7	26A
Heißhunger auf Süßes			48,0	50,5	-2,5	50,0	-2,0	26B
Konnte Mahlzeit auslassen			68,0	64,5	3,5	65,3	2,8	27A
Aß Kleinigkeit zwischen Mahlzeiten			34,0	39,8	-5,8	38,6	-4,6	27B
Nahrungsgewohnheiten geändert			36,0	33,9	2,1	34,3	1,7	35
<b>Verdauungsbeschwerden</b>								22
Verdauungsbeschwerde Blähungen			54,0	30,1	23,9	35,2	18,8	28BLAE
Verdauungsbeschwerde Durchfall			8,0	4,8	3,2	5,5	2,5	28DURC
Verdauungsbeschwerde Verstopfung			54,0	38,2	15,8	41,5	12,5	28VERS
<b>Kaffee/Tee</b>								25
Kaffeetrinker			66,0	68,3	-2,3	69,9	-3,9	20KAF
Teetrinker			44,0	50,0	-6,0	52,0	-8,0	20TEE
Anzahl Tassen Kaffee/Tag			2,3	2,4	-0,2	2,4	-0,1	20KTA
Anzahl Tassen Tee/Tag			1,1	1,4	-0,3	1,3	-0,3	20TTA
<b>Alkohol</b>								26
Alkohol Verträglichkeitsquote			60,0	65,1	-5,1	68,0	-8,0	19
Wein vertragen			30,0	31,2	-1,2	30,9	-0,9	19C1
Sekt vertragen			22,0	19,4	2,6	19,9	2,1	19C2
Bier vertragen			34,0	33,9	0,1	33,9	0,1	19C3
Branntwein vertragen			8,0	8,6	-0,6	8,5	-0,5	19C4
Likör vertragen			10,0	12,9	-2,9	12,3	-2,3	19C5
<b>Rauchen</b>								27
Wie stark geraucht?			42,0	28,5	13,5	0,4	41,6	17S
Konstitution		03KON %	ja, Tränen der Augen	nein/k. A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
<b>Belastung und Belastbarkeit</b>								32
Erblichkeitsquotient			8,0	14,0	-6,0	12,7	-4,7	10

Wie belastbar früher?		76,0	80,1	-4,1	79,2	-3,2	12A
Wie belastet im Jahrz. vor Parkinson?		68,0	65,1	2,9	65,7	2,3	12B
<b>Konstitution, Schlaf</b>							
Wie groß war Schlafbedarf?		50,0	53,8	-3,8	53,0	-3,0	13
Ich ging gerne früh schlafen.		44,0	46,2	-2,2	45,8	-1,8	13B
War früh schlafen möglich?		46,0	52,2	-6,2	50,9	-4,9	13C
<b>Konstitution, sportliche Betätigung</b>							
Sport, Jogging, Gymn. (Jahrz. vor PK)		38,0	42,5	-4,5	41,5	-3,5	15A
Wie häufig Gymnastik (Jahrz. vor PK)		22,0	23,7	-1,7	23,3	-1,3	15GYM
Wie häufig Jogging (Jahrz. vor PK)		10,0	7,5	2,5	8,1	2,0	15JOG
Wie oft Sport (Jahrz. vor PK)		20,0	28,0	-8,0	26,3	-6,3	15SPO
<b>Einflußfaktoren auf Symptomatik</b>							
		05COP	ja, Tränen der Augen	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
<b>Verschlechterungen durch ...</b>							
schlechter: Überanstrengung		70,0	62,9	7,1	64,4	5,6	36A1
schlechter Aufregung,Sorge		78,0	76,3	1,7	76,7	1,3	36A2
schlechter: Hetze		74,0	64,5	9,5	66,5	7,5	36A3
schlechter: Zu wenig Schlaf		34,0	33,9	0,1	33,9	0,1	36A4
schlechter: Zu wenig Trinken		22,0	9,7	12,3	12,3	9,7	36A5
schlechter: Klimastürze		62,0	54,8	7,2	56,4	5,6	36A6
schlechter: Hitze		36,0	39,2	-3,2	38,6	-2,6	36A7
schlechter: Schlechte Luft		36,0	29,6	6,4	30,9	5,1	36A8
schlechter: Tabakrauch		30,0	22,6	7,4	24,2	5,9	36A9
<b>Verbesserungen durch...</b>							
gut: in heiterer Gesellschaft		64,0	57,5	6,5	58,9	5,1	37A
gut: bei leichter Musik		48,0	41,4	6,6	42,8	5,2	37B
gut: nach Gymnastik		48,0	39,2	8,8	41,1	6,9	37C
gut: nach dem Schlafen		44,0	41,4	2,6	42,0	2,1	37D
gut: in frischer Luft		60,0	71,5	-11,5	69,1	-9,1	37E
gut: nach Entspannungsübungen		36,0	37,6	-1,6	37,3	-1,3	37F
gut: nach dem Schwimmen		22,0	20,4	1,6	20,8	1,2	37G
<b>Krankheitsverlauf</b>							
		06SYM	ja, Tränen der Augen	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
<b>Krankheitsverlauf, Symptomatik</b>							
32 Äquivalenztyp J/N		44,0	28,0	16,0	31,4	12,6	32EQUI
32 Rigordominanztyp J/N		38,0	43,0	-5,0	42,0	-4,0	32RIGO
32 Tremordominanztyp J/N		18,0	29,0	-11,0	26,7	-8,7	32TREM
Beschwerden seit Diag. schlimmer?		84,0	77,4	6,6	78,8	5,2	33BS
Versteifung seit Diagnose besser?		24,0	22,0	2,0	22,5	1,5	33VB
Versteifung seit Diagnose schlimmer?		52,0	57,5	-5,5	56,4	-4,4	33VS
Zittern seit Diagnose gebessert?		38,0	26,9	11,1	29,2	8,8	33ZB
Zittern seit Diagnose zugenommen?		62,0	48,4	13,6	63,1	-1,1	33ZS
<b>offene Fragen</b>							
		08OFF	ja, Tränen der Augen	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
		Anzahl					
<b>Verweise auf Ergebnisse offener Fragen</b>							
Anzahl Medikamente heute		2,8	3,1	-0,2	3,0	-0,2	ANZ30H
Angaben zu 31 Ärzten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ANZ31ARZ
Angaben zu 31 Behandlungen		2,7	3,5	-0,8	3,3	-0,6	ANZ31BEH
Anzahl Medikamente V31		0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	ANZ31SUM
Anzahl verschlechternde Umstände (offene Listen)		0,2	0,2	-0,1	0,2	-0,1	ANZ36OFF
Anzahl verbessernde Umstände (offene Listen)		0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	ANZ37OFF
Anzahl erwähnenswerte Belastungen (offene Listen)		0,5	0,4	0,0	0,5	0,0	ANZ38OFF
Angaben (offen) zu Krankheitsursachen		7,6	6,8	0,8	7,0	0,6	ANZ6
Angaben zu frühsymptomen		6,4	3,5	2,9	4,1	2,3	ANZ7
<b>Indexe</b>							
		10NDX	ja, Tränen der Augen	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
		Index!					
<b>Indexvariablen</b>							
In gespannten Verhältnissen gelebt		4,8	4,5	0,3	4,6	0,3	21
Was früher gegessen?		1,7	1,6	0,1	1,6	0,1	23
beruflicher Aufstieg2		0,4	0,5	-0,1			AUFST

beruflicher Aufstieg		0,5	0,8	-0,2	0,7	-0,2	UFSTEIG	
Vorlaufsymptome & Lebensalter		11 Jr ja, Tränen der Augen		nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
		Jahre						
<b>Zusammenhang mit Lebensalter</b>								41
Alter: Zum Zeitpunkt der Befragung		67,3	65,6	1,7	66,0	1,3	LA00C	
Alter: Berufsaufgabe		55,2	56,0	-0,8	55,8	-0,6	LA03J	
Alter: Diagnose PK		61,4	57,9	3,5	58,7	2,7	LA04J	
Alter: Auftreten typ. Pk-Beschwerden		55,0	54,9	0,1	54,9	0,1	LA05J	
Alter: Muskelverspannungen		50,7	50,3	0,4	50,5	0,3	LA07AJ	
Alter: Gelenk- oder Muskelschmerzen		49,5	49,8	-0,3	49,7	-0,2	LA07BJ	
Alter: Schlafstörungen		49,4	49,1	0,4	46,7	2,8	LA07CJ	
Alter: Kopfschmerzen im Hinterkopf		48,0	46,6	1,4	47,2	0,8	LA07DJ	
Alter: Nachlassen des Geruchssinns		54,6	52,9	1,6	53,6	1,0	LA07EJ	
Alter: Tränen der Augen		57,0			57,0	0,0	LA07FJ	
Alter: kleinere/unsichere Schrift		57,9	54,8	3,1	55,4	2,5	LA07GJ	
Alter: Leiseres Sprechen		59,4	55,7	3,8	57,1	2,3	LA07HJ	
Alter: Gedrücktere Stimmung		56,4	52,1	4,3	52,4	4,1	LA07IJ	
Alter: deutlicher Anzeichen Vergeßlichkeit		49,7	54,5	-4,8	52,2	-2,5	LA09J	
Alter: Beginn Spiel eines Musikinstrumentes		18,9	17,4	1,6	17,5	1,4	LA16B	
Alter: Aufgabe Spiel eines Musikinstrumentes		31,2	39,2	-8,0	38,2	-7,1	LA16E	
Alter: Beginn Rauchen		22,6	22,6	0,0	18,2	4,4	LA17AJ	
Alter: Aufgabe Rauchen		48,1	45,9	2,2	46,6	1,5	LA17EJ	
Alter: Beginn trauriger Verstimmungen/Depris		56,8	56,3	0,4	56,7	0,1	LA34AJ	
Alter: Ende trauriger Verstimmungen/Depris		65,9	63,2	2,7	63,6	2,3	LA34EJ	
<b>Zusammenhang mit Jahr der PK-Diagnose</b>								42
Seit wieviel Jahren Parkinson?		5,9	7,4	-1,5	7,1	-1,2	K_JAHRE	
Berufsaustritt/Aufgabe J		-6,8	-3,3	-3,4	-4,2	-2,6	PK03J	
typische PK-Beschw. (retrospektiv)		-5,5	-2,5	-2,9	-3,2	-2,3	PK05J	
Zeitl.Zus.Pk: Muskelverspannung		-9,4	-6,9	-2,6	-7,5	-1,9	PK07AJ	
Zeitl.Zus.Pk: Gelenk-/bzw. Muskelschmerzen		-10,6	-9,0	-1,6	-9,4	-1,2	PK07BJ	
Zeitl.Zus.Pk: Schlafstörungen x Jahre vor (-) bzw. nach(+) PK-Di		-9,0	-8,8	-0,2	-11,7	2,6	PK07CJ	
Zeitl.Zus.Pk: Kopfschmerzen im Hinterkopf		-12,5	-11,5	-1,0	-11,7	-0,7	PK07DJ	
Zeitl.Zus.Pk: Nachlassen Geruchssinn		-6,0	-5,4	-0,5	-5,4	-0,6	PK07EJ	
Zeitl.Zus.Pk: Tränen der Augen		-4,4			-4,3	-0,1	PK07FJ	
Zeitl.Zus.Pk: Kleinere (oder unsichere) Schrift		-2,6	-1,3	-1,3	-2,2	-0,4	PK07GJ	
Zeitl.Zus.Pk: Leiseres Sprechen		-1,1	-0,4	-0,8	-0,6	-0,6	PK07HJ	
Zeitl.Zus.Pk: Gedrückte Stimmung		-5,3	-3,1	-2,2	-4,8	-0,5	PK07IJ	
Zeitl.Zus.Pk: deutl. Anz. von Vergeßlichkeit		-9,1	-5,4	-3,7	-7,3	-1,8	PK09J	
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Musizieren		-41,9	-40,3	-1,7	-41,3	-0,7	PK16BJ	
Zeitl.Zus.Pk: Ende Musizieren		-29,7	-18,4	-11,3	-20,3	-9,4	PK16EJ	
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Rauchen		-38,2	-33,9	-4,4	-38,0	-0,3	PK17AJ	
Zeitl.Zus.Pk: Aufgabe des Rauchens		-12,7	-9,5	-3,1	-12,3	-0,3	PK17EJ	
Zeitl.Zus.Pk: Depressionsbeginn		-2,7	-0,5	-2,2	-0,9	-1,8	PK34AJ	
Zeitl.Zus.Pk: Ende Depressionen		6,4	6,4	0,0	6,3	0,2	PK34EJ	
<b>Dauer</b>								43
Dauer Musizieren		12,2	21,8	-9,6	19,6	-7,3	DAUR16	
Dauer Rauchen		25,6	23,4	2,2	23,3	2,3	DAUR17	
Dauer Depressionen		9,0	6,9	2,1	7,6	1,4	DAUR34	