

frühe Beschwerde: Leiseres Sprechen

07h

allgemeine Angaben		00ALL %	ja, leiseres Sprechen	nein/k. A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
allgemeine Fragen								0
Männerquote (Frauenquote = 100% - Männerquote)			74,5	50,0	24,5	59,3	15,2	00B
Anzahl Probanden			94,0	142,0	-48,0	236,0	-142,0	01 SIGEL
Wert/Code			1,0	0,0	1,0	9,0	-8,0	Value
Lebenseinstellung		01LEB %	ja, leiseres Sprechen	nein/k. A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Selbsteinschätzung								11
ernst			47,9	38,0	9,8	42,0	5,9	11.1
pflichtbewußt			88,3	82,4	5,9	84,8	3,5	11.2
strebsam			59,6	46,5	13,1	51,7	7,9	11.3
gründlich			59,6	52,8	6,8	55,5	4,1	11.4
Empfindsam, "dünnhäutig"			60,6	45,8	14,9	51,7	8,9	11.5
fröhlich			40,4	31,0	9,4	34,8	5,7	11.6
spontan			22,3	18,3	4,0	19,9	2,4	11.7
leichtlebig			5,3	2,1	3,2	3,4	1,9	11.8
humorvoll			29,8	26,8	3,0	28,0	1,8	11.9
musikalische Betätigung								12
Instrument gespielt?			26,6	21,1	5,5	27,5	-0,9	16A
psychosoziale Faktoren								13
Spannungen: im Beruf			37,2	24,6	12,6	29,7	7,6	21BER
Spannungen: in der Familie			46,8	47,9	-1,1	47,5	-0,7	21FAM
Spannungen: im Freundes/Bekanntkreis			5,3	4,2	1,1	4,7	0,7	21FREU
Neigung eigene Gefühle zu unterdrücken			68,1	64,1	4,0	65,7	2,4	22
Depressionsquote			41,5	28,2	13,3	64,4	-22,9	34JN
Ernährung, Verdauung, Genußmittel		02ERN %	ja, leiseres Sprechen	nein/k. A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Ernährung allgemein								20
Viel Obst und Rohkost im Jahr. vor Erkrankung			56,4	54,2	2,2	55,1	1,3	24
Gerne süße Speisen/Cola/Limo			79,8	79,6	0,2	79,7	0,1	26A
Heißhunger auf Süßes			54,3	47,2	7,1	50,0	4,3	26B
Konnte Mahlzeit auslassen			63,8	66,2	-2,4	65,3	-1,4	27A
Aß Kleinigkeit zwischen Mahlzeiten			39,4	38,0	1,3	38,6	0,8	27B
Nahrungsgewohnheiten geändert			39,4	31,0	8,4	34,3	5,0	35
Verdauungsbeschwerden								22
Verdauungsbeschwerde Blähungen			42,6	30,3	12,3	35,2	7,4	28BLAE
Verdauungsbeschwerde Durchfall			7,4	4,2	3,2	5,5	1,9	28DURC
Verdauungsbeschwerde Verstopfung			44,7	39,4	5,2	41,5	3,2	28VERS
Kaffee/Tee								25
Kaffeetrinker			60,6	72,5	-11,9	69,9	-9,3	20KAF
Teetrinker			45,7	50,7	-5,0	52,0	-6,3	20TEE
Anzahl Tassen Kaffee/Tag			2,2	2,5	-0,3	2,4	-0,2	20KTA
Anzahl Tassen Tee/Tag			1,3	1,3	0,0	1,3	0,0	20TTA
Alkohol								26
Alkohol Verträglichkeitsquote			62,8	64,8	-2,0	68,0	-5,2	19
Wein vertragen			28,7	32,4	-3,7	30,9	-2,2	19C1
Sekt vertragen			20,2	19,7	0,5	19,9	0,3	19C2
Bier vertragen			40,4	29,6	10,8	33,9	6,5	19C3
Branntwein vertragen			9,6	7,7	1,8	8,5	1,1	19C4
Likör vertragen			10,6	13,4	-2,7	12,3	-1,7	19C5
Rauchen								27
Wie stark geraucht?			38,3	26,8	11,5	0,4	37,9	17S
Konstitution		03KON %	ja, leiseres Sprechen	nein/k. A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Belastung und Belastbarkeit								32
Erblichkeitsquotient			13,8	12,0	1,9	12,7	1,1	10

Wie belastbar früher?		75,5	81,7	-6,2	79,2	-3,7	12A
Wie belastet im Jahrz. vor Parkinson?		63,8	66,9	-3,1	65,7	-1,9	12B
Konstitution, Schlaf							
Wie groß war Schlafbedarf?		61,7	47,2	14,5	53,0	8,7	13
Ich ging gerne früh schlafen.		47,9	44,4	3,5	45,8	2,1	13B
War früh schlafen möglich?		47,9	52,8	-4,9	50,9	-3,0	13C
Konstitution, sportliche Betätigung							
Sport, Jogging, Gymn. (Jahrz. vor PK)		35,1	45,8	-10,7	41,5	-6,4	15A
Wie häufig Gymnastik (Jahrz. vor PK)		21,3	24,6	-3,4	23,3	-2,0	15GYM
Wie häufig Jogging (Jahrz. vor PK)		9,6	7,0	2,5	8,1	1,5	15JOG
Wie oft Sport (Jahrz. vor PK)		20,2	30,3	-10,1	26,3	-6,1	15SPO
Einflußfaktoren auf Symptomatik							
		05COP	ja, leiseres Sprechen	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Verschlechterungen durch ...							
schlechter: Überanstrengung		69,1	61,3	7,9	64,4	4,7	35A1
schlechter Aufregung,Sorge		81,9	73,2	8,7	76,7	5,2	35A2
schlechter: Hetze		73,4	62,0	11,4	66,5	6,9	35A3
schlechter: Zu wenig Schlaf		40,4	29,6	10,8	33,9	6,5	35A4
schlechter: Zu wenig Trinken		17,0	9,2	7,9	12,3	4,7	35A5
schlechter: Klimastürze		58,5	54,9	3,6	56,4	2,2	35A6
schlechter: Hitze		42,6	35,9	6,6	38,6	4,0	35A7
schlechter: Schlechte Luft		37,2	26,8	10,5	30,9	6,3	35A8
schlechter: Tabakrauch		30,9	19,7	11,1	24,2	6,7	35A9
Verbesserungen durch...							
gut: in heiterer Gesellschaft		59,6	58,5	1,1	58,9	0,7	37A
gut: bei leichter Musik		48,9	38,7	10,2	42,8	6,1	37B
gut: nach Gymnastik		47,9	36,6	11,3	41,1	6,8	37C
gut: nach dem Schlafen		43,6	40,8	2,8	42,0	1,7	37D
gut: in frischer Luft		71,3	67,6	3,7	69,1	2,2	37E
gut: nach Entspannungsübungen		42,6	33,8	8,8	37,3	5,3	37F
gut: nach dem Schwimmen		23,4	19,0	4,4	20,8	2,6	37G
Krankheitsverlauf							
		06SYM	ja, leiseres Sprechen	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Krankheitsverlauf, Symptomatik							
32 Äquivalenztyp J/N		39,4	26,1	13,3	31,4	8,0	32EQUI
32 Rigordominanztyp J/N		42,6	41,5	1,0	42,0	0,6	32RIGO
32 Tremordominanztyp J/N		18,1	32,4	-14,3	26,7	-8,6	32TREM
Beschwerden seit Diag. schlimmer?		76,6	80,3	-3,7	78,8	-2,2	33BS
Versteifung seit Diagnose besser?		26,6	19,7	6,9	22,5	4,1	33VB
Versteifung seit Diagnose schlimmer?		60,6	53,5	7,1	56,4	4,3	33VS
Zittern seit Diagnose gebessert?		39,4	22,5	16,8	29,2	10,1	33ZB
Zittern seit Diagnose zugenommen?		50,0	52,1	-2,1	63,1	-13,1	33ZS
offene Fragen							
		08OFF	ja, leiseres Sprechen	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Verweise auf Ergebnisse offener Fragen							
Anzahl Medikamente heute		2,9	3,1	-0,1	3,0	-0,1	ANZ30H
Angaben zu 31 Ärzten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ANZ31ARZ
Angaben zu 31 Behandlungen		3,0	3,5	-0,5	3,3	-0,3	ANZ31BEH
Anzahl Medikamente V31		0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	ANZ31SUM
Anzahl verschlechternde Umstände (offene Listen)		0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	ANZ36OFF
Anzahl verbessernde Umstände (offene Listen)		0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	ANZ37OFF
Anzahl erwähnenswerte Belastungen (offene Listen)		0,5	0,4	0,1	0,5	0,1	ANZ38OFF
Angaben (offen) zu Krankheitsursachen		7,3	6,7	0,6	7,0	0,3	ANZ6
Angaben zu frühsymptomen		5,8	3,0	2,8	4,1	1,7	ANZ7
Indexe							
		10NDX	ja, leiseres Sprechen	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Indexvariablen							
In gespannten Verhältnissen gelebt		4,8	4,4	0,3	4,6	0,2	21
Was früher gegessen?		1,6	1,6	0,0	1,6	0,0	23
beruflicher Aufstieg2		0,5	0,5	0,0			AUFST

beruflicher Aufstieg		0,7	0,7	0,0	0,7	0,0	UFSTEIG	
Vorlaufsymptome & Lebensalter		11 Jr ja, leiseres Sprechen			nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Zusammenhang mit Lebensalter								41
Alter: Zum Zeitpunkt der Befragung		64,4	67,0	-2,6	66,0	-1,5	LA00C	
Alter: Berufsaufgabe		56,3	55,5	0,8	55,8	0,5	LA03J	
Alter: Diagnose PK		57,7	59,4	-1,7	58,7	-1,0	LA04J	
Alter: Auftreten typ. Pk-Beschwerden		53,1	56,3	-3,2	54,9	-1,8	LA05J	
Alter: Muskelverspannungen		47,6	53,7	-6,1	50,5	-2,8	LA07AJ	
Alter: Gelenk- oder Muskelschmerzen		49,0	50,3	-1,4	49,7	-0,7	LA07BJ	
Alter: Schlafstörungen		47,1	51,4	-4,3	46,7	0,5	LA07CJ	
Alter: Kopfschmerzen im Hinterkopf		47,1	47,3	-0,3	47,2	-0,1	LA07DJ	
Alter: Nachlassen des Geruchssinns		52,4	55,5	-3,1	53,6	-1,1	LA07EJ	
Alter: Tränen der Augen		56,1	59,5	-3,4	57,0	-1,0	LA07FJ	
Alter: kleinere/unsichere Schrift		55,5	56,5	-0,9	55,4	0,2	LA07GJ	
Alter: Leiseres Sprechen		57,1			57,1	0,0	LA07HJ	
Alter: Gedrücktere Stimmung		54,6	51,5	3,1	52,4	2,3	LA07IJ	
Alter: deutlicher Anzeichen Vergeßlichkeit		53,0	53,3	-0,3	52,2	0,8	LA09J	
Alter: Beginn Spiel eines Musikinstrumentes		18,1	17,4	0,6	17,5	0,6	LA16B	
Alter: Aufgabe Spiel eines Musikinstrumentes		41,9	33,4	8,5	38,2	3,7	LA16E	
Alter: Beginn Rauchen		21,6	23,5	-1,8	18,2	3,4	LA17AJ	
Alter: Aufgabe Rauchen		45,1	47,9	-2,8	46,6	-1,5	LA17EJ	
Alter: Beginn trauriger Verstimmungen/Depris		55,6	57,2	-1,6	56,7	-1,0	LA34AJ	
Alter: Ende trauriger Verstimmungen/Depris		62,7	64,9	-2,2	63,6	-0,9	LA34EJ	
Zusammenhang mit Jahr der PK-Diagnose								42
Seit wieviel Jahren Parkinson?		6,7	7,4	-0,7	7,1	-0,4	PK03K	
Berufsaustritt/Aufgabe J		-2,5	-5,3	2,8	-4,2	1,7	PK03J	
typische PK-Beschw. (retrospektiv)		-3,7	-2,8	-0,9	-3,2	-0,5	PK05J	
Zeittl.Zus.Pk: Muskelverspannung		-8,7	-6,5	-2,3	-7,5	-1,2	PK07AJ	
Zeittl.Zus.Pk: Gelenk-/bzw. Muskelschmerzen		-9,0	-10,1	1,1	-9,4	0,4	PK07BJ	
Zeittl.Zus.Pk: Schlafstörungen x Jahre vor (-) bzw. nach(+) PK-Di		-8,8	-9,0	0,2	-11,7	2,8	PK07CJ	
Zeittl.Zus.Pk: Kopfschmerzen im Hinterkopf		-10,7	-13,6	2,9	-11,7	1,0	PK07DJ	
Zeittl.Zus.Pk: Nachlassen Geruchssinn		-5,6	-5,8	0,2	-5,4	-0,2	PK07EJ	
Zeittl.Zus.Pk: Tränen der Augen		-4,5	-3,9	-0,6	-4,3	-0,2	PK07FJ	
Zeittl.Zus.Pk: Kleinere (oder unsichere) Schrift		-1,7	-1,9	0,1	-2,2	0,5	PK07GJ	
Zeittl.Zus.Pk: Leiseres Sprechen		-0,7			-0,6	-0,1	PK07HJ	
Zeittl.Zus.Pk: Gedrückte Stimmung		-3,0	-4,9	2,0	-4,8	1,8	PK07IJ	
Zeittl.Zus.Pk: deutl. Anz. von Vergeßlichkeit		-6,0	-7,2	1,3	-7,3	1,3	PK09J	
Zeittl.Zus.Pk: Beginn Musizieren		-42,4	-39,2	-3,3	-41,3	-1,2	PK16BJ	
Zeittl.Zus.Pk: Ende Musizieren		-18,6	-23,2	4,6	-20,3	1,7	PK16EJ	
Zeittl.Zus.Pk: Beginn Rauchen		-37,3	-33,0	-4,4	-38,0	0,6	PK17AJ	
Zeittl.Zus.Pk: Aufgabe des Rauchens		-12,9	-8,0	-4,9	-12,3	-0,6	PK17EJ	
Zeittl.Zus.Pk: Depressionsbeginn		-1,2	-0,7	-0,6	-0,9	-0,3	PK34AJ	
Zeittl.Zus.Pk: Ende Depressionen		5,9	6,9	-1,0	6,3	-0,3	PK34EJ	
Dauer								43
Dauer Musizieren		23,8	16,0	7,8	19,6	4,3	DAUR16	
Dauer Rauchen		23,5	24,5	-1,0	23,3	0,2	DAUR17	
Dauer Depressionen		6,7	7,9	-1,3	7,6	-0,9	DAUR34	