

frühe Beschwerde: Anzeichen Vergeßl.

09a

allgemeine Angaben		00ALL %	ja, Anz. Von Vergeßlichkeit	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
allgemeine Fragen								0
Männerquote (Frauenquote = 100% - Männerquote)			65,5	58,0	7,4	59,3	6,2	00B
Anzahl Probanden			55,0	181,0	126,0	236,0	-181,0	thi SIGEL
Wert/Code			1,0	0,0	1,0	9,0	-8,0	Value
Lebenseinstellung		01LEB %	ja, Anz. Von Vergeßlichkeit	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Selbsteinschätzung								11
ernst			50,9	39,2	11,7	42,0	9,0	11.1
pflichtbewußt			85,5	84,5	0,9	84,8	0,7	11.2
strebsam			54,5	50,8	3,7	51,7	2,9	11.3
gründlich			60,0	54,1	5,9	55,5	4,5	11.4
Empfindsam, "dünnhäutig"			60,0	49,2	10,8	51,7	8,3	11.5
fröhlich			38,2	33,7	4,5	34,8	3,4	11.6
spontan			18,2	20,4	-2,3	19,9	-1,7	11.7
leichtlebig			1,8	3,9	-2,0	3,4	-1,6	11.8
humorvoll			27,3	28,2	-0,9	28,0	-0,7	11.9
musikalische Betätigung								12
Instrument gespielt?			25,5	22,7	2,8	27,5	-2,1	16A
psychosoziale Faktoren								13
Spannungen: im Beruf			40,0	26,5	13,5	29,7	10,3	21BER
Spannungen: in der Familie			63,6	42,5	21,1	47,5	16,2	21FAM
Spannungen: im Freundes/Bekanntkreis			3,6	5,0	-1,3	4,7	-1,0	21FREU
Neigung eigene Gefühle zu unterdrücken			76,4	62,4	13,9	65,7	10,7	22
Depressionsquote			50,9	28,2	22,7	64,4	-13,5	34JN
Ernährung, Verdauung, Genußmittel		02ERN %	ja, Anz. Von Vergeßlichkeit	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Ernährung allgemein								20
Viel Obst und Rohkost im Jahr. vor Erkrankung			63,6	52,5	11,2	55,1	8,6	24
Gerne süße Speisen/Cola/Limo			76,4	80,7	-4,3	79,7	-3,3	26A
Heißhunger auf Süßes			49,1	50,3	-1,2	50,0	-0,9	26B
Konnte Mahlzeit auslassen			60,0	66,9	-6,9	65,3	-5,3	27A
Aß Kleinigkeit zwischen Mahlzeiten			40,0	38,1	1,9	38,6	1,4	27B
Nahrungsgewohnheiten geändert			47,3	30,4	16,9	34,3	13,0	35
Verdauungsbeschwerden								22
Verdauungsbeschwerde Blähungen			47,3	31,5	15,8	35,2	12,1	28BLAE
Verdauungsbeschwerde Durchfall			12,7	3,3	9,4	5,5	7,2	28DURC
Verdauungsbeschwerde Verstopfung			54,5	37,6	17,0	41,5	13,0	28VERS
Kaffee/Tee								25
Kaffeetrinker			72,7	66,3	6,4	69,9	2,8	20KAF
Teetrinker			49,1	48,6	0,5	52,0	-2,9	20TEE
Anzahl Tassen Kaffee/Tag			2,5	2,4	0,1	2,4	0,1	20KTA
Anzahl Tassen Tee/Tag			1,3	1,3	0,0	1,3	0,0	20TTA
Alkohol								26
Alkohol Verträglichkeitsquote			63,6	64,1	-0,5	68,0	-4,4	19
Wein vertragen			38,2	28,7	9,5	30,9	7,3	19C1
Sekt vertragen			20,0	19,9	0,1	19,9	0,1	19C2
Bier vertragen			41,8	31,5	10,3	33,9	7,9	19C3
Branntwein vertragen			7,3	8,8	-1,6	8,5	-1,2	19C4
Likör vertragen			9,1	13,3	-4,2	12,3	-3,2	19C5
Rauchen								27
Wie stark geraucht?			36,4	29,8	6,5	0,4	36,0	17S
Konstitution		03KON %	ja, Anz. Von Vergeßlichkeit	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Belastung und Belastbarkeit								32
Erblichkeitsquotient			10,9	13,3	-2,4	12,7	-1,8	10

Wie belastbar früher?						78,2	79,6	-1,4	79,2	-1,1	12A	
Wie belastet im Jahrz. vor Parkinson?						61,8	66,9	-5,0	65,7	-3,9	12B	
Konstitution, Schlaf												
Wie groß war Schlafbedarf?						58,2	51,4	6,8	53,0	5,2	13	
Ich ging gerne früh schlafen.						50,9	44,2	6,7	45,8	5,1	13B	
War früh schlafen möglich?						50,9	50,8	0,1	50,9	0,1	13C	
Konstitution, sportliche Betätigung												
Sport, Jogging, Gymn. (Jahrz. vor PK)						50,9	38,7	12,2	41,5	9,4	15A	
Wie häufig Gymnastik (Jahrz. vor PK)						34,5	19,9	14,7	23,3	11,2	15GYM	
Wie häufig Jogging (Jahrz. vor PK)						18,2	5,0	13,2	8,1	10,1	15JOG	
Wie oft Sport (Jahrz. vor PK)						36,4	23,2	13,2	26,3	10,1	15SPO	
Einflußfaktoren auf Symptomatik												
						05COP %	ja, Anz. Von Vergeßlichkeit	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Verschlechterungen durch ...												
schlechter: Überanstrengung						61,8	65,2	-3,4	64,4	-2,6	36A1	
schlechter Aufregung,Sorge						81,8	75,1	6,7	76,7	5,1	36A2	
schlechter: Hetze						67,3	66,3	1,0	66,5	0,7	36A3	
schlechter: Zu wenig Schlaf						41,8	31,5	10,3	33,9	7,9	36A4	
schlechter: Zu wenig Trinken						10,9	12,7	-1,8	12,3	-1,4	36A5	
schlechter: Klimastürze						56,4	56,4	0,0	56,4	0,0	36A6	
schlechter: Hitze						41,8	37,6	4,2	38,6	3,3	36A7	
schlechter: Schlechte Luft						34,5	29,8	4,7	30,9	3,6	36A8	
schlechter: Tabakrauch						27,3	23,2	4,1	24,2	3,1	36A9	
Verbesserungen durch...												
gut: in heiterer Gesellschaft						58,2	59,1	-0,9	58,9	-0,7	37A	
gut: bei leichter Musik						49,1	40,9	8,2	42,8	6,3	37B	
gut: nach Gymnastik						38,2	42,0	-3,8	41,1	-2,9	37C	
gut: nach dem Schlafen						34,5	44,2	-9,7	42,0	-7,4	37D	
gut: in frischer Luft						69,1	69,1	0,0	69,1	0,0	37E	
gut: nach Entspannungsübungen						34,5	38,1	-3,6	37,3	-2,7	37F	
gut: nach dem Schwimmen						21,8	20,4	1,4	20,8	1,1	37G	
Krankheitsverlauf												
						06SYM %	ja, Anz. Von Vergeßlichkeit	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Krankheitsverlauf, Symptomatik												
32 Äquivalenztyp J/N						38,2	29,3	8,9	31,4	6,8	32EQUI	
32 Rigordominanztyp J/N						41,8	42,0	-0,2	42,0	-0,1	32RIGO	
32 Tremordominanztyp J/N						20,0	28,7	-8,7	26,7	-6,7	32TREM	
Beschwerden seit Diag. schlimmer?						72,7	80,7	-7,9	78,8	-6,1	33BS	
Versteifung seit Diagnose besser?						36,4	18,2	18,1	22,5	13,9	33VB	
Versteifung seit Diagnose schlimmer?						52,7	57,5	-4,7	56,4	-3,6	33VS	
Zittern seit Diagnose gebessert?						32,7	28,2	4,6	29,2	3,5	33ZB	
Zittern seit Diagnose zugenommen?						47,3	52,5	-5,2	63,1	-15,9	33ZS	
offene Fragen												
						08OFF Anzahl	ja, Anz. Von Vergeßlichkeit	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Verweise auf Ergebnisse offener Fragen												
Anzahl Medikamente heute						2,6	3,1	-0,5	3,0	-0,4	ANZ30H	
Angaben zu 31 Ärzten						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ANZ31ARZ	
Angaben zu 31 Behandlungen						3,2	3,4	-0,2	3,3	-0,1	ANZ31BEH	
Anzahl Medikamente V31						0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	ANZ31SUM	
Anzahl verschlechternde Umstände (offene Listen)						0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	ANZ36OFF	
Anzahl verbessernde Umstände (offene Listen)						0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	ANZ37OFF	
Anzahl erwähnenswerte Belastungen (offene Listen)						0,4	0,5	0,0	0,5	0,0	ANZ38OFF	
Angaben (offen) zu Krankheitsursachen						7,4	6,8	0,6	7,0	0,4	ANZ6	
Angaben zu frühsymptomen						5,6	3,7	1,9	4,1	1,5	ANZ7	
Indexe												
						10NDX Index!	ja, Anz. Von Vergeßlichkeit	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Indexvariablen												
In gespannten Verhältnissen gelebt						3,7	4,8	-1,1	4,6	-0,9	21	
Was früher gegessen?						1,6	1,6	0,0	1,6	0,0	23	
beruflicher Aufstieg2						0,4	0,5	-0,1			AUFST	

beruflicher Aufstieg			0,6	0,8	-0,1	0,7	-0,1	UFSTEIG
Vorlaufsymptome & Lebensalter		11 Jr Jahre	ja, Anz. Von Vergeßlichkeit	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Zusammenhang mit Lebensalter								41
Alter: Zum Zeitpunkt der Befragung			64,2	66,5	-2,3	66,0	-1,7	LA00C
Alter: Berufsaufgabe			55,0	56,0	-1,0	55,8	-0,8	LA03J
Alter: Diagnose PK			58,9	58,6	0,3	58,7	0,2	LA04J
Alter: Auftreten typ. Pk-Beschwerden			54,5	55,0	-0,6	54,9	-0,4	LA05J
Alter: Muskelverspannungen			50,7	50,3	0,4	50,5	0,3	LA07AJ
Alter: Gelenk- oder Muskelschmerzen			51,2	48,6	2,6	49,7	1,6	LA07BJ
Alter: Schlafstörungen			49,9	48,9	1,0	46,7	3,3	LA07CJ
Alter: Kopfschmerzen im Hinterkopf			43,7	49,0	-5,3	47,2	-3,5	LA07DJ
Alter: Nachlassen des Geruchssinns			55,8	52,6	3,2	53,6	2,2	LA07EJ
Alter: Tränen der Augen			54,3	58,3	-4,0	57,0	-2,7	LA07FJ
Alter: kleinere/unsichere Schrift			53,8	56,7	-2,8	55,4	-1,5	LA07GJ
Alter: Leiseres Sprechen			57,3	57,0	0,3	57,1	0,2	LA07HJ
Alter: Gedrücktere Stimmung			51,4	54,4	-3,0	52,4	-1,0	LA07IJ
Alter: deutlicher Anzeichen Vergeßlichkeit			53,1			52,2	0,9	LA09J
Alter: Beginn Spiel eines Musikinstrumentes			22,3	16,2	6,1	17,5	4,8	LA16B
Alter: Aufgabe Spiel eines Musikinstrumentes			33,1	38,7	-5,7	38,2	-5,2	LA16E
Alter: Beginn Rauchen			23,9	22,1	1,8	18,2	5,7	LA17AJ
Alter: Aufgabe Rauchen			48,9	45,7	3,1	46,6	2,3	LA17EJ
Alter: Beginn trauriger Verstimmungen/Depris			55,3	57,1	-1,7	56,7	-1,3	LA34AJ
Alter: Ende trauriger Verstimmungen/Depris			63,8	63,8	0,0	63,6	0,2	LA34EJ
Zusammenhang mit Jahr der PK-Diagnose								42
Seit wieviel Jahren Parkinson?			5,0	7,7	-2,7	7,1	-2,1	PK03J
Berufsaustritt/Aufgabe J			-5,4	-3,8	-1,6	-4,2	-1,3	PK05J
typische PK-Beschw. (retrospektiv)			-3,8	-3,0	-0,8	-3,2	-0,6	PK07AJ
Zeitl.Zus.Pk: Muskelverspannung			-8,3	-7,4	-0,9	-7,5	-0,8	PK07BJ
Zeitl.Zus.Pk: Gelenk-/bzw. Muskelschmerzen			-8,3	-10,3	1,9	-9,4	1,1	PK07CJ
Zeitl.Zus.Pk: Schlafstörungen x Jahre vor (-) bzw. nach(+) PK-Di			-8,9	-8,9	0,0	-11,7	2,8	PK07DJ
Zeitl.Zus.Pk: Kopfschmerzen im Hinterkopf			-14,4	-10,7	-3,7	-11,7	-2,7	PK07EJ
Zeitl.Zus.Pk: Nachlassen Geruchssinn			-6,4	-5,3	-1,1	-5,4	-1,0	PK07FJ
Zeitl.Zus.Pk: Tränen der Augen			-4,4	-4,3	-0,1	-4,3	-0,1	PK07GJ
Zeitl.Zus.Pk: Kleinere (oder unsichere) Schrift			-3,5	-1,0	-2,5	-2,2	-1,4	PK07HJ
Zeitl.Zus.Pk: Leiseres Sprechen			-1,4	-0,3	-1,1	-0,6	-0,8	PK07IJ
Zeitl.Zus.Pk: Gedrückte Stimmung			-6,6	-2,4	-4,2	-4,8	-1,8	PK09J
Zeitl.Zus.Pk: deutl. Anz. von Vergeßlichkeit			-6,5			-7,3	0,7	PK16BJ
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Musizieren			-34,0	-42,9	8,9	-41,3	7,3	PK16EJ
Zeitl.Zus.Pk: Ende Musizieren			-23,2	-20,4	-2,8	-20,3	-2,9	PK17AJ
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Rauchen			-31,4	-36,4	5,1	-38,0	6,6	PK17EJ
Zeitl.Zus.Pk: Aufgabe des Rauchens			-7,2	-11,6	4,4	-12,3	5,1	PK34AJ
Zeitl.Zus.Pk: Depressionsbeginn			-2,6	-0,1	-2,5	-0,9	-1,7	PK34EJ
Zeitl.Zus.Pk: Ende Depressionen			6,0	6,6	-0,6	6,3	-0,3	
Dauer								43
Dauer Musizieren			10,8	22,6	-11,8	19,6	-8,8	DAUR16
Dauer Rauchen			25,0	23,6	1,3	23,3	1,6	DAUR17
Dauer Depressionen			8,3	6,8	1,6	7,6	0,8	DAUR34