

Jugend geschickt: Rollschuh

14A

allgemeine Angaben		00ALL %	ja, geschickt im Rollschuhfahren	nicht geschickt/nik ht	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
allgemeine Fragen								0
Männerquote (Frauenquote = 100% - Männerquote)			72,4	55,6	16,8	59,3	13,1	00B
Anzahl Probanden			58,0	178,0	120,0	236,0	-178,0	thl SIGEL
Wert/Code			1,0	0,0	1,0	9,0	-8,0	Value
Lebenseinstellung		01LEB %	ja, geschickt im Rollschuhfahren	nicht geschickt/nik ht	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Selbsteinschätzung								11
ernst			46,6	40,4	6,1	42,0	4,6	11.1
pflichtbewußt			86,2	84,3	1,9	84,8	1,5	11.2
strebsam			51,7	51,7	0,0	51,7	0,0	11.3
gründlich			65,5	52,2	13,3	55,5	10,0	11.4
Empfindsam, "dünnhäutig"			53,4	51,1	2,3	51,7	1,8	11.5
fröhlich			51,7	29,2	22,5	34,8	17,0	11.6
spontan			25,9	18,0	7,9	19,9	5,9	11.7
leichtlebig			5,2	2,8	2,4	3,4	1,8	11.8
humorvoll			31,0	27,0	4,1	28,0	3,1	11.9
musikalische Betätigung								12
Instrument gespielt?			36,2	19,1	17,1	27,5	8,7	16A
psychosoziale Faktoren								13
Spannungen: im Beruf			39,7	26,4	13,3	29,7	10,0	21BER
Spannungen: in der Familie			50,0	46,6	3,4	47,5	2,5	21FAM
Spannungen: im Freundes/Bekanntkreis			5,2	4,5	0,7	4,7	0,5	21FREU
Neigung eigene Gefühle zu unterdrücken			63,8	66,3	-2,5	65,7	-1,9	22
Depressionsquote			43,1	30,3	12,8	64,4	-21,3	34JN
Ernährung, Verdauung, Genußmittel		02ERN %	ja, geschickt im Rollschuhfahren	nicht geschickt/nik ht	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Ernährung allgemein								20
Viel Obst und Rohkost im Jahr. vor Erkrankung			58,6	53,9	4,7	55,1	3,5	24
Gerne süße Speisen/Cola/Limo			81,0	79,2	1,8	79,7	1,4	26A
Heißhunger auf Süßes			58,6	47,2	11,4	50,0	8,6	26B
Konnte Mahlzeit auslassen			63,8	65,7	-1,9	65,3	-1,5	27A
Aß Kleinigkeit zwischen Mahlzeiten			43,1	37,1	6,0	38,6	4,5	27B
Nahrungsgewohnheiten geändert			43,1	31,5	11,6	34,3	8,8	35
Verdauungsbeschwerden								22
Verdauungsbeschwerde Blähungen			37,9	34,3	3,7	35,2	2,8	28BLAE
Verdauungsbeschwerde Durchfall			1,7	6,7	-5,0	5,5	-3,8	28DURC
Verdauungsbeschwerde Verstopfung			37,9	42,7	-4,8	41,5	-3,6	28VERS
Kaffee/Tee								25
Kaffeetrinker			70,7	66,9	3,8	69,9	0,8	20KAF
Teetrinker			53,4	47,2	6,3	52,0	1,4	20TEE
Anzahl Tassen Kaffee/Tag			2,6	2,3	0,3	2,4	0,2	20KTA
Anzahl Tassen Tee/Tag			1,4	1,3	0,2	1,3	0,1	20TTA
Alkohol								26
Alkohol Verträglichkeitsquote			81,0	58,4	22,6	68,0	13,0	19
Wein vertragen			34,5	29,8	4,7	30,9	3,6	19C1
Sekt vertragen			25,9	18,0	7,9	19,9	5,9	19C2
Bier vertragen			39,7	32,0	7,6	33,9	5,8	19C3
Branntwein vertragen			13,8	6,7	7,1	8,5	5,3	19C4
Likör vertragen			10,3	12,9	-2,6	12,3	-1,9	19C5
Rauchen								27
Wie stark geraucht?			48,3	25,8	22,4	0,4	47,9	17S
Konstitution		03KON %	ja, geschickt im Rollschuhfahren	nicht geschickt/nik ht	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Belastung und Belastbarkeit								32
Erblichkeitsquotient			12,1	12,9	-0,9	12,7	-0,6	10

Wie belastbar früher?					82,8	78,1	4,7	79,2	3,5	12A	
Wie belastet im Jahrz. vor Parkinson?					79,3	61,2	18,1	65,7	13,6	12B	
Konstitution, Schlaf											
Wie groß war Schlafbedarf?					50,0	53,9	-3,9	53,0	-3,0	13	
Ich ging gerne früh schlafen.					36,2	48,9	-12,7	45,8	-9,6	13B	
War früh schlafen möglich?					48,3	51,7	-3,4	50,9	-2,6	13C	
Konstitution, sportliche Betätigung											
Sport, Jogging, Gymn. (Jahrz. vor PK)					44,8	40,4	4,4	41,5	3,3	15A	
Wie häufig Gymnastik (Jahrz. vor PK)					22,4	23,6	-1,2	23,3	-0,9	15GYM	
Wie häufig Jogging (Jahrz. vor PK)					5,2	9,0	-3,8	8,1	-2,9	15JOG	
Wie oft Sport (Jahrz. vor PK)					31,0	24,7	6,3	26,3	4,8	15SPO	
Einflußfaktoren auf Symptomatik											
					05 COP %	ja, geschickt im Rollschuhfahren	nicht geschickt/nik w	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Verschlechterungen durch ...											
schlechter: Überanstrengung					70,7	62,4	8,3	64,4	6,3	36A1	
schlechter Aufregung,Sorge					75,9	77,0	-1,1	76,7	-0,8	36A2	
schlechter: Hetze					74,1	64,0	10,1	66,5	7,6	36A3	
schlechter: Zu wenig Schlaf					39,7	32,0	7,6	33,9	5,8	36A4	
schlechter: Zu wenig Trinken					8,6	13,5	-4,9	12,3	-3,7	36A5	
schlechter: Klimastürze					65,5	53,4	12,1	56,4	9,2	36A6	
schlechter: Hitze					32,8	40,4	-7,7	38,6	-5,8	36A7	
schlechter: Schlechte Luft					27,6	32,0	-4,4	30,9	-3,3	36A8	
schlechter: Tabakrauch					31,0	21,9	9,1	24,2	6,9	36A9	
Verbesserungen durch...											
gut: in heiterer Gesellschaft					58,6	59,0	-0,4	58,9	-0,3	37A	
gut: bei leichter Musik					46,6	41,6	5,0	42,8	3,8	37B	
gut: nach Gymnastik					53,4	37,1	16,4	41,1	12,3	37C	
gut: nach dem Schlafen					51,7	38,8	13,0	42,0	9,8	37D	
gut: in frischer Luft					69,0	69,1	-0,1	69,1	-0,1	37E	
gut: nach Entspannungsübungen					37,9	37,1	0,9	37,3	0,6	37F	
gut: nach dem Schwimmen					32,8	16,9	15,9	20,8	12,0	37G	
Krankheitsverlauf											
					06SYM %	ja, geschickt im Rollschuhfahren	nicht geschickt/nik w	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Krankheitsverlauf, Symptomatik											
32 Äquivalenztyp J/N					24,1	33,7	-9,6	31,4	-7,2	32EQUI	
32 Rigordominanztyp J/N					46,6	40,4	6,1	42,0	4,6	32RIGO	
32 Tremordominanztyp J/N					29,3	25,8	3,5	26,7	2,6	32TREM	
Beschwerden seit Diag. schlimmer?					67,2	82,6	-15,3	78,8	-11,6	33BS	
Versteifung seit Diagnose besser?					32,8	19,1	13,7	22,5	10,3	33VB	
Versteifung seit Diagnose schlimmer?					50,0	58,4	-8,4	56,4	-6,4	33VS	
Zittern seit Diagnose gebessert?					27,6	29,8	-2,2	29,2	-1,7	33ZB	
Zittern seit Diagnose zugenommen?					44,8	53,4	-8,5	63,1	-18,3	33ZS	
offene Fragen											
					08OFF Anzahl	ja, geschickt im Rollschuhfahren	nicht geschickt/nik w	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Verweise auf Ergebnisse offener Fragen											
Anzahl Medikamente heute					3,1	3,0	0,1	3,0	0,1	ANZ30H	
Angaben zu 31 Ärzten					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	NZ31ARZ	
Angaben zu 31 Behandlungen					3,7	3,2	0,5	3,3	0,4	NZ31BEH	
Anzahl Medikamente V31					0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	I31SUM	
Anzahl verschlechternde Umstände (offene Listen)					0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	NZ36OFF	
Anzahl verbessernde Umstände (offene Listen)					0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	NZ37OFF	
Anzahl erwähnenswerte Belastungen (offene Listen)					0,4	0,5	-0,1	0,5	0,0	NZ38OFF	
Angaben (offen) zu Krankheitsursachen					7,2	6,9	0,3	7,0	0,2	ANZ6	
Angaben zu frühsymptomen					4,1	4,2	-0,1	4,1	0,0	ANZ7	
Indexe											
					10NDX Index!	ja, geschickt im Rollschuhfahren	nicht geschickt/nik w	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Indexvariablen											
In gespannten Verhältnissen gelebt					4,9	4,5	0,5	4,6	0,3	21	
Was früher gegessen?					1,6	1,6	-0,1	1,6	0,0	23	
beruflicher Aufstieg2					0,5	0,4	0,1			AUFST	

beruflicher Aufstieg			0,8	0,7	0,1	0,7	0,1	UFSTEIG
Vorlaufsymptome & Lebensalter		11 Jr Jahre	ja, geschickt im Rollschuhfahren	nicht geschickt/nikw	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Zusammenhang mit Lebensalter								41
Alter: Zum Zeitpunkt der Befragung			64,9	66,3	-1,4	66,0	-1,1	LA00C
Alter: Berufsaufgabe			57,6	55,2	2,4	55,8	1,8	LA03J
Alter: Diagnose PK			58,7	58,7	0,0	58,7	0,0	LA04J
Alter: Auftreten typ. Pk-Beschwerden			54,7	54,9	-0,3	54,9	-0,2	LA05J
Alter: Muskelverspannungen			49,5	50,8	-1,3	50,5	-1,0	LA07AJ
Alter: Gelenk- oder Muskelschmerzen			48,7	50,0	-1,4	49,7	-1,0	LA07BJ
Alter: Schlafstörungen			48,6	49,4	-0,8	46,7	1,9	LA07CJ
Alter: Kopfschmerzen im Hinterkopf			46,9	47,3	-0,4	47,2	-0,3	LA07DJ
Alter: Nachlassen des Geruchssinns			56,4	52,4	4,0	53,6	2,8	LA07EJ
Alter: Tränen der Augen			52,4	58,0	-5,6	57,0	-4,6	LA07FJ
Alter: kleinere/unsichere Schrift			56,3	55,6	0,7	55,4	1,0	LA07GJ
Alter: Leiseres Sprechen			55,7	57,6	-1,9	57,1	-1,4	LA07HJ
Alter: Gedrücktere Stimmung			52,1	53,8	-1,7	52,4	-0,2	LA07IJ
Alter: deutlicher Anzeichen Vergeßlichkeit			51,1	53,9	-2,9	52,2	-1,1	LA09J
Alter: Beginn Spiel eines Musikinstrumentes			17,0	18,2	-1,2	17,5	-0,5	LA16B
Alter: Aufgabe Spiel eines Musikinstrumentes			34,3	39,1	-4,9	38,2	-3,9	LA16E
Alter: Beginn Rauchen			20,7	23,7	-3,1	18,2	2,5	LA17AJ
Alter: Aufgabe Rauchen			42,9	48,8	-5,9	46,6	-3,7	LA17EJ
Alter: Beginn trauriger Verstimmungen/Depris			51,6	58,7	-7,1	56,7	-5,0	LA34AJ
Alter: Ende trauriger Verstimmungen/Depris			60,4	65,4	-5,1	63,6	-3,3	LA34EJ
Zusammenhang mit Jahr der PK-Diagnose								42
Seit wieviel Jahren Parkinson?			6,0	7,5	-1,4	7,1	-1,1	PK03J
Berufsaustritt/Aufgabe J			-2,5	-4,7	2,2	-4,2	1,6	PK05J
typische PK-Beschw. (retrospektiv)			-3,2	-3,2	0,0	-3,2	0,0	PK07AJ
Zeitl.Zus.Pk: Muskelverspannung			-9,4	-7,1	-2,2	-7,5	-1,9	PK07BJ
Zeitl.Zus.Pk: Gelenk-/bzw. Muskelschmerzen			-8,7	-9,8	1,1	-9,4	0,7	PK07CJ
Zeitl.Zus.Pk: Schlafstörungen x Jahre vor (-) bzw. nach(+) PK-Di			-9,8	-8,6	-1,2	-11,7	1,9	PK07DJ
Zeitl.Zus.Pk: Kopfschmerzen im Hinterkopf			-9,9	-12,6	2,6	-11,7	1,8	PK07EJ
Zeitl.Zus.Pk: Nachlassen Geruchssinn			-4,5	-6,1	1,6	-5,4	0,9	PK07FJ
Zeitl.Zus.Pk: Tränen der Augen			-8,2	-3,5	-4,7	-4,3	-3,9	PK07GJ
Zeitl.Zus.Pk: Kleinere (oder unsicherere) Schrift			-1,6	-1,8	0,2	-2,2	0,6	PK07HJ
Zeitl.Zus.Pk: Leiseres Sprechen			-1,6	-0,3	-1,3	-0,6	-1,0	PK07IJ
Zeitl.Zus.Pk: Gedrückte Stimmung			-4,3	-3,5	-0,7	-4,8	0,5	PK09J
Zeitl.Zus.Pk: deutl. Anz. von Vergeßlichkeit			-5,9	-6,8	0,9	-7,3	1,4	PK16BJ
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Musizieren			-40,6	-40,7	0,1	-41,3	0,7	PK16EJ
Zeitl.Zus.Pk: Ende Musizieren			-23,3	-19,7	-3,6	-20,3	-3,0	PK17AJ
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Rauchen			-36,7	-34,1	-2,6	-38,0	1,2	PK17EJ
Zeitl.Zus.Pk: Aufgabe des Rauchens			-14,5	-7,9	-6,6	-12,3	-2,2	PK34AJ
Zeitl.Zus.Pk: Depressionsbeginn			-4,3	0,6	-4,9	-0,9	-3,4	PK34EJ
Zeitl.Zus.Pk: Ende Depressionen			4,7	7,2	-2,5	6,3	-1,6	
Dauer								43
Dauer Musizieren			17,3	21,0	-3,7	19,6	-2,3	DAUR16
Dauer Rauchen			22,2	25,1	-2,9	23,3	-1,1	DAUR17
Dauer Depressionen			8,0	7,0	1,1	7,6	0,5	DAUR34