

Jugend geschickt: Tanz

14C

allgemeine Angaben		00ALL %	geschickt im Tanz	Nicht geschickt/nik ht	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
allgemeine Fragen								0
Männerquote (Frauenquote = 100% - Männerquote)			50,4	68,9	-18,5	59,3	-8,9	00B
Anzahl Probanden			117,0	119,0	-2,0	236,0	-119,0	01 SIGEL
Wert/Code			1,0	0,0	1,0	9,0	-8,0	Value
Lebenseinstellung		01LEB %	geschickt im Tanz	Nicht geschickt/nik ht	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Selbsteinschätzung								11
ernst			39,3	44,5	-5,2	42,0	-2,6	11.1
pflichtbewußt			83,8	85,7	-2,0	84,8	-1,0	11.2
strebsam			53,0	50,4	2,6	51,7	1,3	11.3
gründlich			56,4	54,6	1,8	55,5	0,9	11.4
Empfindsam, "dünnhäutig"			53,0	50,4	2,6	51,7	1,3	11.5
fröhlich			42,7	26,9	15,8	34,8	8,0	11.6
spontan			23,9	16,0	8,0	19,9	4,0	11.7
leichtlebig			3,4	3,4	0,1	3,4	0,0	11.8
humorvoll			31,6	24,4	7,3	28,0	3,7	11.9
musikalische Betätigung								12
Instrument gespielt?			24,8	21,8	2,9	27,5	-2,8	16A
psychosoziale Faktoren								13
Spannungen: im Beruf			26,5	32,8	-6,3	29,7	-3,2	21BER
Spannungen: in der Familie			52,1	42,9	9,3	47,5	4,7	21FAM
Spannungen: im Freundes/Bekanntkreis			2,6	6,7	-4,2	4,7	-2,1	21FREU
Neigung eigene Gefühle zu unterdrücken			66,7	64,7	2,0	65,7	1,0	22
Depressionsquote			29,1	37,8	-8,8	64,4	-35,3	34JN
Ernährung, Verdauung, Genußmittel		02ERN %	geschickt im Tanz	Nicht geschickt/nik ht	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Ernährung allgemein								20
Viel Obst und Rohkost im Jahr. vor Erkrankung			53,8	56,3	-2,5	55,1	-1,2	24
Gerne süße Speisen/Cola/Limo			82,9	76,5	6,4	79,7	3,2	26A
Heißhunger auf Süßes			50,4	49,6	0,8	50,0	0,4	26B
Konnte Mahlzeit auslassen			66,7	63,9	2,8	65,3	1,4	27A
Aß Kleinigkeit zwischen Mahlzeiten			37,6	39,5	-1,9	38,6	-1,0	27B
Nahrungsgewohnheiten geändert			36,8	31,9	4,8	34,3	2,4	35
Verdauungsbeschwerden								22
Verdauungsbeschwerde Blähungen			31,6	38,7	-7,0	35,2	-3,5	28BLAE
Verdauungsbeschwerde Durchfall			7,7	3,4	4,3	5,5	2,2	28DURC
Verdauungsbeschwerde Verstopfung			40,2	42,9	-2,7	41,5	-1,4	28VERS
Kaffee/Tee								25
Kaffeetrinker			70,9	64,7	6,2	69,9	1,0	20KAF
Teetrinker			47,0	50,4	-3,4	52,0	-5,0	20TEE
Anzahl Tassen Kaffee/Tag			2,6	2,2	0,4	2,4	0,2	20KTA
Anzahl Tassen Tee/Tag			1,3	1,4	-0,1	1,3	0,0	20TTA
Alkohol								26
Alkohol Verträglichkeitsquote			65,8	62,2	3,6	68,0	-2,2	19
Wein vertragen			30,8	31,1	-0,3	30,9	-0,2	19C1
Sekt vertragen			20,5	19,3	1,2	19,9	0,6	19C2
Bier vertragen			35,0	32,8	2,3	33,9	1,1	19C3
Branntwein vertragen			8,5	8,4	0,1	8,5	0,1	19C4
Likör vertragen			12,0	12,6	-0,6	12,3	-0,3	19C5
Rauchen								27
Wie stark geraucht?			30,8	31,9	-1,2	0,4	30,4	17S
Konstitution		03KON %	geschickt im Tanz	Nicht geschickt/nik ht	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Belastung und Belastbarkeit								32
Erblichkeitsquotient			11,1	14,3	-3,2	12,7	-1,6	10

Wie belastbar früher?					78,6	79,8	-1,2	79,2	-0,6	12A	
Wie belastet im Jahrz. vor Parkinson?					66,7	64,7	2,0	65,7	1,0	12B	
Konstitution, Schlaf										33	
Wie groß war Schlafbedarf?					54,7	51,3	3,4	53,0	1,7	13	
Ich ging gerne früh schlafen.					41,9	49,6	-7,7	45,8	-3,9	13B	
War früh schlafen möglich?					51,3	50,4	0,9	50,9	0,4	13C	
Konstitution, sportliche Betätigung										34	
Sport, Jogging, Gymn. (Jahrz. vor PK)					48,7	34,5	14,3	41,5	7,2	15A	
Wie häufig Gymnastik (Jahrz. vor PK)					27,4	19,3	8,0	23,3	4,0	15GYM	
Wie häufig Jogging (Jahrz. vor PK)					6,0	10,1	-4,1	8,1	-2,1	15JOG	
Wie oft Sport (Jahrz. vor PK)					25,6	26,9	-1,2	26,3	-0,6	15SPO	
Einflußfaktoren auf Symptomatik										35	
					05COP %	geschickt im Tanz	Nicht geschickt/nik	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Verschlechterungen durch ...										35	
schlechter: Überanstrengung					65,0	63,9	1,1	64,4	0,5	36A1	
schlechter Aufregung,Sorge					74,4	79,0	-4,6	76,7	-2,3	36A2	
schlechter: Hetze					67,5	65,5	2,0	66,5	1,0	36A3	
schlechter: Zu wenig Schlaf					32,5	35,3	-2,8	33,9	-1,4	36A4	
schlechter: Zu wenig Trinken					11,1	13,4	-2,3	12,3	-1,2	36A5	
schlechter: Klimastürze					55,6	57,1	-1,6	56,4	-0,8	36A6	
schlechter: Hitze					40,2	37,0	3,2	38,6	1,6	36A7	
schlechter: Schlechte Luft					29,9	31,9	-2,0	30,9	-1,0	36A8	
schlechter: Tabakrauch					24,8	23,5	1,3	24,2	0,6	36A9	
Verbesserungen durch...										36	
gut: in heiterer Gesellschaft					64,1	53,8	10,3	58,9	5,2	37A	
gut: bei leichter Musik					49,6	36,1	13,4	42,8	6,8	37B	
gut: nach Gymnastik					46,2	36,1	10,0	41,1	5,1	37C	
gut: nach dem Schlafen					42,7	41,2	1,6	42,0	0,8	37D	
gut: in frischer Luft					71,8	66,4	5,4	69,1	2,7	37E	
gut: nach Entspannungsübungen					38,5	36,1	2,3	37,3	1,2	37F	
gut: nach dem Schwimmen					16,2	25,2	-9,0	20,8	-4,5	37G	
Krankheitsverlauf										37	
					06SYM %	geschickt im Tanz	Nicht geschickt/nik	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Krankheitsverlauf, Symptomatik										37	
32 Äquivalenztyp J/N					30,8	31,9	-1,2	31,4	-0,6	32EQUI	
32 Rigordominanztyp J/N					46,2	37,8	8,3	42,0	4,2	32RIGO	
32 Tremordominanztyp J/N					23,1	30,3	-7,2	26,7	-3,6	32TREM	
Beschwerden seit Diag. schlimmer?					70,9	86,6	-15,6	78,8	-7,9	33BS	
Versteifung seit Diagnose besser?					28,2	16,8	11,4	22,5	5,7	33VB	
Versteifung seit Diagnose schlimmer?					52,1	60,5	-8,4	56,4	-4,2	33VS	
Zittern seit Diagnose gebessert?					30,8	27,7	3,0	29,2	1,5	33ZB	
Zittern seit Diagnose zugenommen?					39,3	63,0	-23,7	63,1	-23,8	33ZS	
offene Fragen										38	
					08OFF Anzahl	geschickt im Tanz	Nicht geschickt/nik	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Verweise auf Ergebnisse offener Fragen										38	
Anzahl Medikamente heute					3,1	3,0	0,1	3,0	0,0	ANZ30H	
Angaben zu 31 Ärzten					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	NZ31ARZ	
Angaben zu 31 Behandlungen					3,5	3,2	0,3	3,3	0,2	NZ31BEH	
Anzahl Medikamente V31					0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	I31SUM	
Anzahl verschlechternde Umstände (offene Listen)					0,2	0,3	-0,1	0,2	0,0	NZ36OFF	
Anzahl verbessernde Umstände (offene Listen)					0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	NZ37OFF	
Anzahl erwähnenswerte Belastungen (offene Listen)					0,5	0,4	0,2	0,5	0,1	NZ38OFF	
Angaben (offen) zu Krankheitsursachen					6,7	7,3	-0,6	7,0	-0,3	ANZ6	
Angaben zu frühsymptomen					4,1	4,2	-0,2	4,1	0,0	ANZ7	
Indexe										39	
					10NDX Index!	geschickt im Tanz	Nicht geschickt/nik	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Indexvariablen										39	
In gespannten Verhältnissen gelebt					4,5	4,6	-0,1	4,6	0,0	21	
Was früher gegessen?					1,6	1,6	0,0	1,6	0,0	23	
beruflicher Aufstieg2					0,4	0,5	-0,1			AUFST	

beruflicher Aufstieg		0,6	0,8	-0,2	0,7	-0,1	UFSTEIG
Vorlaufsymptome & Lebensalter		11 Jr	geschickt im Tanz	Nicht geschickt/nik	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
		Jahre		W			
Zusammenhang mit Lebensalter							41
Alter: Zum Zeitpunkt der Befragung		65,0	66,8	-1,8	66,0	-0,9	LA00C
Alter: Berufsaufgabe		55,2	56,3	-1,0	55,8	-0,6	LA03J
Alter: Diagnose PK		58,2	59,2	-1,1	58,7	-0,5	LA04J
Alter: Auftreten typ. Pk-Beschwerden		54,5	55,2	-0,7	54,9	-0,3	LA05J
Alter: Muskelverspannungen		49,8	51,2	-1,4	50,5	-0,7	LA07AJ
Alter: Gelenk- oder Muskelschmerzen		48,3	51,0	-2,6	49,7	-1,3	LA07BJ
Alter: Schlafstörungen		48,3	50,0	-1,7	46,7	1,6	LA07CJ
Alter: Kopfschmerzen im Hinterkopf		42,0	51,4	-9,3	47,2	-5,2	LA07DJ
Alter: Nachlassen des Geruchssinns		51,5	56,1	-4,6	53,6	-2,1	LA07EJ
Alter: Tränen der Augen		56,6	57,3	-0,7	57,0	-0,4	LA07FJ
Alter: kleinere/unsichere Schrift		55,9	55,8	0,1	55,4	0,5	LA07GJ
Alter: Leiseres Sprechen		56,9	57,4	-0,5	57,1	-0,3	LA07HJ
Alter: Gedrücktere Stimmung		53,3	53,4	-0,1	52,4	1,0	LA07IJ
Alter: deutlicher Anzeichen Vergeßlichkeit		55,6	50,9	4,8	52,2	3,5	LA09J
Alter: Beginn Spiel eines Musikinstrumentes		18,4	16,9	1,5	17,5	0,9	LA16B
Alter: Aufgabe Spiel eines Musikinstrumentes		36,0	38,8	-2,8	38,2	-2,3	LA16E
Alter: Beginn Rauchen		23,9	21,3	2,6	18,2	5,7	LA17AJ
Alter: Aufgabe Rauchen		45,9	47,2	-1,3	46,6	-0,7	LA17EJ
Alter: Beginn trauriger Verstimmungen/Depris		52,5	59,3	-6,7	56,7	-4,1	LA34AJ
Alter: Ende trauriger Verstimmungen/Depris		60,4	66,3	-5,8	63,6	-3,2	LA34EJ
Zusammenhang mit Jahr der PK-Diagnose							42
Seit wieviel Jahren Parkinson?		6,7	7,5	-0,8	7,1	-0,4	PK03K
Berufsaustritt/Aufgabe J		-3,6	-4,7	1,2	-4,2	0,6	PK03J
typische PK-Beschw. (retrospektiv)		-2,9	-3,5	0,6	-3,2	0,3	PK05J
Zeittl.Zus.Pk: Muskelverspannung		-7,9	-7,5	-0,3	-7,5	-0,4	PK07AJ
Zeittl.Zus.Pk: Gelenk-/bzw. Muskelschmerzen		-9,4	-9,6	0,2	-9,4	0,0	PK07BJ
Zeittl.Zus.Pk: Schlafstörungen x Jahre vor (-) bzw. nach(+) PK-Di		-9,2	-8,6	-0,6	-11,7	2,4	PK07CJ
Zeittl.Zus.Pk: Kopfschmerzen im Hinterkopf		-15,0	-9,4	-5,6	-11,7	-3,3	PK07DJ
Zeittl.Zus.Pk: Nachlassen Geruchssinn		-5,9	-5,3	-0,7	-5,4	-0,6	PK07EJ
Zeittl.Zus.Pk: Tränen der Augen		-2,8	-5,6	2,8	-4,3	1,5	PK07FJ
Zeittl.Zus.Pk: Kleinere (oder unsicherere) Schrift		-1,7	-1,8	0,1	-2,2	0,5	PK07GJ
Zeittl.Zus.Pk: Leiseres Sprechen		-0,8	-0,5	-0,3	-0,6	-0,2	PK07HJ
Zeittl.Zus.Pk: Gedrückte Stimmung		-3,8	-3,7	-0,1	-4,8	1,0	PK07IJ
Zeittl.Zus.Pk: deutl. Anz. von Vergeßlichkeit		-4,1	-8,6	4,4	-7,3	3,1	PK09J
Zeittl.Zus.Pk: Beginn Musizieren		-40,3	-41,0	0,7	-41,3	0,9	PK16BJ
Zeittl.Zus.Pk: Ende Musizieren		-22,8	-19,2	-3,7	-20,3	-2,5	PK16EJ
Zeittl.Zus.Pk: Beginn Rauchen		-31,5	-38,5	7,0	-38,0	6,5	PK17AJ
Zeittl.Zus.Pk: Aufgabe des Rauchens		-9,0	-11,7	2,7	-12,3	3,3	PK17EJ
Zeittl.Zus.Pk: Depressionsbeginn		-2,7	0,3	-2,9	-0,9	-1,7	PK34AJ
Zeittl.Zus.Pk: Ende Depressionen		5,1	7,3	-2,2	6,3	-1,1	PK34EJ
Dauer							43
Dauer Musizieren		17,5	21,8	-4,3	19,6	-2,0	DAUR16
Dauer Rauchen		22,0	25,9	-3,9	23,3	-1,3	DAUR17
Dauer Depressionen		7,8	7,0	0,8	7,6	0,2	DAUR34