

Wie stark geraucht?

17S

allgemeine Angaben		00ALL %	Raucher	Nichtrauche	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
allgemeine Fragen								0
Männerquote (Frauenquote = 100% - Männerquote)			78,4	51,2	27,1	59,3	19,1	00B
Anzahl Probanden			74,0	162,0	-88,0	236,0	-162,0	th SIGEL
Wert/Code			1,0	0,0	1,0	9,0	-8,0	Value
Lebenseinstellung		01LEB %	Raucher	Nichtrauche	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Selbsteinschätzung								11
ernst			43,2	41,4	1,9	42,0	1,3	11.1
pflichtbewußt			87,8	83,3	4,5	84,8	3,1	11.2
strebsam			51,4	51,9	-0,5	51,7	-0,3	11.3
gründlich			59,5	53,7	5,8	55,5	3,9	11.4
Empfindsam, "dünnhäutig"			56,8	49,4	7,4	51,7	5,1	11.5
fröhlich			41,9	31,5	10,4	34,8	7,1	11.6
spontan			18,9	20,4	-1,5	19,9	-1,0	11.7
leichtlebig			4,1	3,1	1,0	3,4	0,7	11.8
humorvoll			39,2	22,8	16,3	28,0	11,2	11.9
musikalische Betätigung								12
Instrument gespielt?			33,8	18,5	15,3	27,5	6,2	16A
psychosoziale Faktoren								13
Spannungen: im Beruf			35,1	27,2	8,0	29,7	5,5	21BER
Spannungen: in der Familie			48,6	46,9	1,7	47,5	1,2	21FAM
Spannungen: im Freundes/Bekanntekreis			4,1	4,9	-0,9	4,7	-0,6	21FREU
Neigung eigene Gefühle zu unterdrücken			73,0	62,3	10,6	65,7	7,3	22
Depressionsquote			44,6	28,4	16,2	64,4	-19,8	34JN
Ernährung, Verdauung, Genußmittel		02ERN %	Raucher	Nichtrauche	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Ernährung allgemein								20
Viel Obst und Rohkost im Jahr. vor Erkrankung			56,8	54,3	2,4	55,1	1,7	24
Gerne süße Speisen/Cola/Limo			71,6	83,3	-11,7	79,7	-8,0	26A
Heißhunger auf Süßes			51,4	49,4	2,0	50,0	1,4	26B
Konnte Mahlzeit auslassen			71,6	62,3	9,3	65,3	6,4	27A
Aß Kleinigkeit zwischen Mahlzeiten			31,1	42,0	-10,9	38,6	-7,5	27B
Nahrungsgewohnheiten geändert			37,8	32,7	5,1	34,3	3,5	35
Verdauungsbeschwerden								22
Verdauungsbeschwerde Blähungen			23,0	40,7	-17,8	35,2	-12,2	28BLAE
Verdauungsbeschwerde Durchfall			5,4	5,6	-0,2	5,5	-0,1	28DURC
Verdauungsbeschwerde Verstopfung			39,2	42,6	-3,4	41,5	-2,3	28VERS
Kaffee/Tee								25
Kaffeetrinker			75,7	64,2	11,5	69,9	5,8	20KAF
Teetrinker			48,6	48,8	-0,1	52,0	-3,4	20TEE
Anzahl Tassen Kaffee/Tag			2,8	2,2	0,5	2,4	0,4	20KTA
Anzahl Tassen Tee/Tag			1,3	1,3	0,0	1,3	0,0	20TTA
Alkohol								26
Alkohol Verträglichkeitsquote			75,7	58,6	17,0	68,0	7,7	19
Wein vertragen			36,5	28,4	8,1	30,9	5,6	19C1
Sekt vertragen			28,4	16,0	12,3	19,9	8,5	19C2
Bier vertragen			43,2	29,6	13,6	33,9	9,3	19C3
Branntwein vertragen			12,2	6,8	5,4	8,5	3,7	19C4
Likör vertragen			14,9	11,1	3,8	12,3	2,6	19C5
Rauchen								27
Wie stark geraucht?						0,4		17S
Konstitution		03KON %	Raucher	Nichtrauche	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Belastung und Belastbarkeit								32
Erblichkeitsquotient			8,1	14,8	-6,7	12,7	-4,6	10

Wie belastbar früher?						79,7	79,0	0,7	79,2	0,5	12A	
Wie belastet im Jahrz. vor Parkinson?						74,3	61,7	12,6	65,7	8,6	12B	
Konstitution, Schlaf												
Wie groß war Schlafbedarf?						47,3	55,6	-8,3	53,0	-5,7	13	
Ich ging gerne früh schlafen.						43,2	46,9	-3,7	45,8	-2,5	13B	
War früh schlafen möglich?						47,3	52,5	-5,2	50,9	-3,6	13C	
Konstitution, sportliche Betätigung												
Sport, Jogging, Gymn. (Jahrz. vor PK)						43,2	40,7	2,5	41,5	1,7	15A	
Wie häufig Gymnastik (Jahrz. vor PK)						18,9	25,3	-6,4	23,3	-4,4	15GYM	
Wie häufig Jogging (Jahrz. vor PK)						9,5	7,4	2,1	8,1	1,4	15JOG	
Wie oft Sport (Jahrz. vor PK)						33,8	22,8	10,9	26,3	7,5	15SPO	
Einflußfaktoren auf Symptomatik												
						05COP %	Raucher	Nichtrauche	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Verschlechterungen durch ...												
schlechter: Überanstrengung						64,9	64,2	0,7	64,4	0,5	36A1	
schlechter Aufregung,Sorge						71,6	79,0	-7,4	76,7	-5,1	36A2	
schlechter: Hetze						64,9	67,3	-2,4	66,5	-1,7	36A3	
schlechter: Zu wenig Schlaf						43,2	29,6	13,6	33,9	9,3	36A4	
schlechter: Zu wenig Trinken						14,9	11,1	3,8	12,3	2,6	36A5	
schlechter: Klimastürze						67,6	51,2	16,3	56,4	11,2	36A6	
schlechter: Hitze						41,9	37,0	4,9	38,6	3,3	36A7	
schlechter: Schlechte Luft						32,4	30,2	2,2	30,9	1,5	36A8	
schlechter: Tabakrauch						21,6	25,3	-3,7	24,2	-2,5	36A9	
Verbesserungen durch...												
gut: in heiterer Gesellschaft						59,5	58,6	0,8	58,9	0,6	37A	
gut: bei leichter Musik						44,6	42,0	2,6	42,8	1,8	37B	
gut: nach Gymnastik						44,6	39,5	5,1	41,1	3,5	37C	
gut: nach dem Schlafen						52,7	37,0	15,7	42,0	10,8	37D	
gut: in frischer Luft						64,9	71,0	-6,1	69,1	-4,2	37E	
gut: nach Entspannungsübungen						35,1	38,3	-3,1	37,3	-2,2	37F	
gut: nach dem Schwimmen						25,7	18,5	7,2	20,8	4,9	37G	
Krankheitsverlauf												
						06SYM %	Raucher	Nichtrauche	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Krankheitsverlauf, Symptomatik												
32 Äquivalenztyp J/N						31,1	31,5	-0,4	31,4	-0,3	32EQUI	
32 Rigordominanztyp J/N						47,3	39,5	7,8	42,0	5,3	32RIGO	
32 Tremordominanztyp J/N						21,6	29,0	-7,4	26,7	-5,1	32TREM	
Beschwerden seit Diag. schlimmer?						79,7	78,4	1,3	78,8	0,9	33BS	
Versteifung seit Diagnose besser?						20,3	23,5	-3,2	22,5	-2,2	33VB	
Versteifung seit Diagnose schlimmer?						64,9	52,5	12,4	56,4	8,5	33VS	
Zittern seit Diagnose gebessert?						32,4	27,8	4,7	29,2	3,2	33ZB	
Zittern seit Diagnose zugenommen?						47,3	53,1	-5,8	63,1	-15,8	33ZS	
offene Fragen												
						08OFF Anzahl	Raucher	Nichtrauche	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Verweise auf Ergebnisse offener Fragen												
Anzahl Medikamente heute						3,3	2,9	0,5	3,0	0,3	ANZ30H	
Angaben zu 31 Ärzten						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ANZ31ARZ	
Angaben zu 31 Behandlungen						3,5	3,2	0,2	3,3	0,2	ANZ31BEH	
Anzahl Medikamente V31						0,1	0,2	-0,1	0,2	-0,1	ANZ31SUM	
Anzahl verschlechternde Umstände (offene Listen)						0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	ANZ36OFF	
Anzahl verbessernde Umstände (offene Listen)						0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	ANZ37OFF	
Anzahl erwähnenswerte Belastungen (offene Listen)						0,4	0,5	0,0	0,5	0,0	ANZ38OFF	
Angaben (offen) zu Krankheitsursachen						7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	ANZ6	
Angaben zu frühsymptomen						4,5	4,0	0,5	4,1	0,4	ANZ7	
Indexe												
						10NDX Index!	Raucher	Nichtrauche	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Indexvariablen												
In gespannten Verhältnissen gelebt						4,8	4,5	0,3	4,6	0,2	21	
Was früher gegessen?						1,5	1,6	-0,1	1,6	-0,1	23	
beruflicher Aufstieg2						0,5	0,5	0,0			AUFST	

beruflicher Aufstieg				0,8	0,7	0,1	0,7	0,0	UFSTEIG
Vorlaufsymptome & Lebensalter		11 Jr	Raucher	Nichtrauche	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt		
		Jahre							
Zusammenhang mit Lebensalter									
41									
Alter: Zum Zeitpunkt der Befragung				64,3	66,7	-2,4	66,0	-1,6	LA00C
Alter: Berufsaufgabe				57,5	54,9	2,6	55,8	1,7	LA03J
Alter: Diagnose PK				56,7	59,7	-3,0	58,7	-2,0	LA04J
Alter: Auftreten typ. Pk-Beschwerden				53,5	55,6	-2,0	54,9	-1,3	LA05J
Alter: Muskelverspannungen				52,4	49,4	3,0	50,5	1,9	LA07AJ
Alter: Gelenk- oder Muskelschmerzen				50,2	49,4	0,8	49,7	0,5	LA07BJ
Alter: Schlafstörungen				49,5	49,0	0,4	46,7	2,8	LA07CJ
Alter: Kopfschmerzen im Hinterkopf				47,8	46,7	1,1	47,2	0,6	LA07DJ
Alter: Nachlassen des Geruchssinns				56,8	52,4	4,4	53,6	3,2	LA07EJ
Alter: Tränen der Augen				58,8	55,7	3,1	57,0	1,8	LA07FJ
Alter: kleinere/unsichere Schrift				55,7	55,9	-0,2	55,4	0,4	LA07GJ
Alter: Leiseres Sprechen				58,4	56,3	2,0	57,1	1,3	LA07HJ
Alter: Gedrücktere Stimmung				52,6	53,9	-1,4	52,4	0,2	LA07IJ
Alter: deutlicher Anzeichen Vergeßlichkeit				51,9	53,8	-1,9	52,2	-0,3	LA09J
Alter: Beginn Spiel eines Musikinstrumentes				17,4	18,0	-0,7	17,5	-0,2	LA16B
Alter: Aufgabe Spiel eines Musikinstrumentes				34,0	40,0	-6,0	38,2	-4,2	LA16E
Alter: Beginn Rauchen				22,6			18,2	4,4	LA17AJ
Alter: Aufgabe Rauchen				46,6			46,6	0,0	LA17EJ
Alter: Beginn trauriger Verstimmungen/Depris				53,9	58,2	-4,3	56,7	-2,8	LA34AJ
Alter: Ende trauriger Verstimmungen/Depris				61,8	65,2	-3,4	63,6	-1,8	LA34EJ
Zusammenhang mit Jahr der PK-Diagnose									
42									
Seit wieviel Jahren Parkinson?				7,5	6,9	0,6	7,1	0,4	PK03J
Berufsaustritt/Aufgabe J				-0,9	-5,8	4,8	-4,2	3,2	PK05J
typische PK-Beschw. (retrospektiv)				-2,8	-3,4	0,7	-3,2	0,4	PK07AJ
Zeitl.Zus.Pk: Muskelverspannung				-5,1	-9,1	4,0	-7,5	2,4	PK07BJ
Zeitl.Zus.Pk: Gelenk-/bzw. Muskelschmerzen				-6,3	-11,2	4,9	-9,4	3,1	PK07CJ
Zeitl.Zus.Pk: Schlafstörungen x Jahre vor (-) bzw. nach(+) PK-Di				-6,8	-9,9	3,1	-11,7	4,9	PK07DJ
Zeitl.Zus.Pk: Kopfschmerzen im Hinterkopf				-10,6	-13,0	2,4	-11,7	1,1	PK07EJ
Zeitl.Zus.Pk: Nachlassen Geruchssinn				-3,1	-6,6	3,5	-5,4	2,2	PK07FJ
Zeitl.Zus.Pk: Tränen der Augen				-2,0	-6,1	4,1	-4,3	2,3	PK07GJ
Zeitl.Zus.Pk: Kleinere (oder unsichere) Schrift				-1,7	-1,8	0,1	-2,2	0,5	PK07HJ
Zeitl.Zus.Pk: Leiseres Sprechen				0,3	-1,3	1,6	-0,6	0,9	PK07IJ
Zeitl.Zus.Pk: Gedrückte Stimmung				-3,0	-4,2	1,2	-4,8	1,8	PK09J
Zeitl.Zus.Pk: deutl. Anz. von Vergeßlichkeit				-4,0	-8,0	4,0	-7,3	3,3	PK16BJ
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Musizieren				-42,0	-39,6	-2,4	-41,3	-0,7	PK16EJ
Zeitl.Zus.Pk: Ende Musizieren				-25,3	-17,6	-7,7	-20,3	-5,0	PK17AJ
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Rauchen				-35,1			-38,0	2,8	PK17EJ
Zeitl.Zus.Pk: Aufgabe des Rauchens				-10,4			-12,3	1,9	PK34AJ
Zeitl.Zus.Pk: Depressionsbeginn				-0,4	-1,3	0,9	-0,9	0,5	PK34EJ
Zeitl.Zus.Pk: Ende Depressionen				7,4	5,7	1,7	6,3	1,1	
Dauer									
43									
Dauer Musizieren				16,7	22,0	-5,3	19,6	-2,9	DAUR16
Dauer Rauchen				24,0			23,3	0,7	DAUR17
Dauer Depressionen				7,6	7,2	0,4	7,6	0,0	DAUR34