

Früher Alkohol vertragen

19

allgemeine Angaben						00ALL %	ja, Alkohol vertragen	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
allgemeine Fragen												0
Männerquote (Frauenquote = 100% - Männerquote)							72,2	37,6	34,5	59,3	12,9	00B
Anzahl Probanden							151,0	85,0	66,0	236,0	-85,0	01A
Wert/Code							1,0	0,0	1,0	9,0	-8,0	Value
Lebenseinstellung						01LEB %	ja, Alkohol vertragen	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Selbsteinschätzung												11
ernst							43,0	40,0	3,0	42,0	1,1	11.1
pflichtbewußt							82,8	88,2	-5,5	84,8	-2,0	11.2
strebsam							52,3	50,6	1,7	51,7	0,6	11.3
gründlich							50,3	64,7	-14,4	55,5	-5,2	11.4
Empfindsam, "dünnhäutig"							47,7	58,8	-11,1	51,7	-4,0	11.5
fröhlich							38,4	28,2	10,2	34,8	3,7	11.6
spontan							21,2	17,6	3,5	19,9	1,3	11.7
leichtlebig							4,6	1,2	3,5	3,4	1,2	11.8
humorvoll							31,8	21,2	10,6	28,0	3,8	11.9
musikalische Betätigung												12
Instrument gespielt?							24,5	21,2	3,3	27,5	-3,0	16A
psychosoziale Faktoren												13
Spannungen: im Beruf							32,5	24,7	7,7	29,7	2,8	21BER
Spannungen: in der Familie							43,7	54,1	-10,4	47,5	-3,8	21FAM
Spannungen: im Freundes/Bekanntenkreis							4,0	5,9	-1,9	4,7	-0,7	21FREU
Neigung eigene Gefühle zu unterdrücken							60,3	75,3	-15,0	65,7	-5,4	22
Depressionsquote							33,1	34,1	-1,0	64,4	-31,3	34JN
Ernährung, Verdauung, Genußmittel						02ERN %	ja, Alkohol vertragen	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Ernährung allgemein												20
Viel Obst und Rohkost im Jahr. vor Erkrankung							59,6	47,1	12,5	55,1	4,5	24
Gerne süße Speisen/Cola/Limo							79,5	80,0	-0,5	79,7	-0,2	26A
Heißhunger auf Süßes							50,3	49,4	0,9	50,0	0,3	26B
Konnte Mahlzeit auslassen							72,2	52,9	19,2	65,3	6,9	27A
Aß Kleinigkeit zwischen Mahlzeiten							36,4	42,4	-5,9	38,6	-2,1	27B
Nahrungsgewohnheiten geändert							31,1	40,0	-8,9	34,3	-3,2	35
Verdauungsbeschwerden												22
Verdauungsbeschwerde Blähungen							31,1	42,4	-11,2	35,2	-4,0	28BLAE
Verdauungsbeschwerde Durchfall							5,3	5,9	-0,6	5,5	-0,2	28DURC
Verdauungsbeschwerde Verstopfung							37,7	48,2	-10,5	41,5	-3,8	28VERS
Kaffee/Tee												25
Kaffeetrinker							70,2	63,5	6,7	69,9	0,3	20KAF
Teetrinker							50,3	45,9	4,4	52,0	-1,7	20TEE
Anzahl Tassen Kaffee/Tag							2,6	2,1	0,5	2,4	0,2	20KTA
Anzahl Tassen Tee/Tag							1,3	1,3	0,0	1,3	0,0	20TTA
Alkohol												26
Alkohol Verträglichkeitsquote							100,0	0,0	100,0	68,0	32,0	19
Wein vertragen							33,1	27,1	6,1	30,9	2,2	19C1
Sekt vertragen							22,5	15,3	7,2	19,9	2,6	19C2
Bier vertragen							35,8	30,6	5,2	33,9	1,9	19C3
Branntwein vertragen							11,9	2,4	9,6	8,5	3,5	19C4
Likör vertragen							11,3	14,1	-2,9	12,3	-1,0	19C5
Rauchen												27
Wie stark geraucht?							37,1	21,2	15,9	0,4	36,7	17S
Konstitution						03KON %	ja, Alkohol vertragen	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Belastung und Belastbarkeit												32
Erblichkeitsquotient							13,9	10,6	3,3	12,7	1,2	10

Wie belastbar früher?										87,4	64,7	22,7	79,2	8,2	12A
Wie belastet im Jahr. vor Parkinson?										67,5	62,4	5,2	65,7	1,9	12B
Konstitution, Schlaf															33
Wie groß war Schlafbedarf?										51,0	56,5	-5,5	53,0	-2,0	13
Ich ging gerne früh schlafen.										41,7	52,9	-11,2	45,8	-4,0	13B
War früh schlafen möglich?										52,3	48,2	4,1	50,9	1,5	13C
Konstitution, sportliche Betätigung															34
Sport, Jogging, Gymn. (Jahrz. vor PK)										41,1	42,4	-1,3	41,5	-0,5	15A
Wie häufig Gymnastik (Jahrz. vor PK)										20,5	28,2	-7,7	23,3	-2,8	15GYM
Wie häufig Jogging (Jahrz. vor PK)										8,6	7,1	1,6	8,1	0,6	15JOG
Wie oft Sport (Jahrz. vor PK)										29,1	21,2	8,0	26,3	2,9	15SPO
Einflußfaktoren auf Symptomatik										05COP %	ja, Alkohol vertragen	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Verschlechterungen durch ...															35
schlechter: Überanstrengung										61,6	69,4	-7,8	64,4	-2,8	36A1
schlechter Aufregung, Sorge										73,5	82,4	-8,8	76,7	-3,2	36A2
schlechter: Hetze										64,2	70,6	-6,3	66,5	-2,3	36A3
schlechter: Zu wenig Schlaf										33,8	34,1	-0,3	33,9	-0,1	36A4
schlechter: Zu wenig Trinken										9,9	16,5	-6,5	12,3	-2,4	36A5
schlechter: Klimastürze										55,0	58,8	-3,9	56,4	-1,4	36A6
schlechter: Hitze										37,7	40,0	-2,3	38,6	-0,8	36A7
schlechter: Schlechte Luft										31,1	30,6	0,5	30,9	0,2	36A8
schlechter: Tabakrauch										23,8	24,7	-0,9	24,2	-0,3	36A9
Verbesserungen durch...															36
gut: in heiterer Gesellschaft										60,3	56,5	3,8	58,9	1,4	37A
gut: bei leichter Musik										44,4	40,0	4,4	42,8	1,6	37B
gut: nach Gymnastik										42,4	38,8	3,6	41,1	1,3	37C
gut: nach dem Schlafen										43,0	40,0	3,0	42,0	1,1	37D
gut: in frischer Luft										70,9	65,9	5,0	69,1	1,8	37E
gut: nach Entspannungsübungen										37,7	36,5	1,3	37,3	0,5	37F
gut: nach dem Schwimmen										22,5	17,6	4,9	20,8	1,8	37G
Krankheitsverlauf										06SYM %	ja, Alkohol vertragen	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Krankheitsverlauf, Symptomatik															37
32 Äquivalenztyp J/N										30,5	32,9	-2,5	31,4	-0,9	32EQUI
32 Rigordominanztyp J/N										49,0	29,4	19,6	42,0	7,1	32RIGO
32 Tremordominanztyp J/N										20,5	37,6	-17,1	26,7	-6,2	32TREM
Beschwerden seit Diag. schlimmer?										77,5	81,2	-3,7	78,8	-1,3	33BS
Versteifung seit Diagnose besser?										23,8	20,0	3,8	22,5	1,4	33VB
Versteifung seit Diagnose schlimmer?										57,6	54,1	3,5	56,4	1,3	33VS
Zittern seit Diagnose gebessert?										29,1	29,4	-0,3	29,2	-0,1	33ZB
Zittern seit Diagnose zugenommen?										47,7	57,6	-10,0	63,1	-15,5	33ZS
offene Fragen										08OFF Anzahl	ja, Alkohol vertragen	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Verweise auf Ergebnisse offener Fragen															38
Anzahl Medikamente heute										3,3	2,6	0,7	3,0	0,3	ANZ30H
Angaben zu 31 Ärzten										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	NZ31ARZ
Angaben zu 31 Behandlungen										3,3	3,3	0,1	3,3	0,0	NZ31BEH
Anzahl Medikamente V31										0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	NZ31SUM
Anzahl verschlechternde Umstände (offene Listen)										0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	NZ36OFF
Anzahl verbessernde Umstände (offene Listen)										0,2	0,3	-0,1	0,2	0,0	NZ37OFF
Anzahl erwähnenswerte Belastungen (offene Listen)										0,5	0,4	0,1	0,5	0,0	NZ38OFF
Angaben (offen) zu Krankheitsursachen										7,0	6,9	0,1	7,0	0,0	ANZ6
Angaben zu frühsymptomen										3,9	4,5	-0,6	4,1	-0,2	ANZ7
Indexe										10NDX Index!	ja, Alkohol vertragen	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Indexvariablen															39
In gespannten Verhältnissen gelebt										4,8	4,1	0,7	4,6	0,3	21
Was früher gegessen?										1,6	1,7	-0,1	1,6	0,0	23
beruflicher Aufstieg2										0,5	0,4	0,2			AUFST

beruflicher Aufstieg						0,8	0,6	0,2	0,7	0,1	UFSTEIG
Vorlaufsymptome & Lebensalter						11 J _r Jahre	ja, Alkohol vertragen	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Zusammenhang mit Lebensalter											41
Alter: Zum Zeitpunkt der Befragung						65,8	66,1	-0,3	66,0	-0,1	LA00C
Alter: Berufsaufgabe						56,1	55,2	0,9	55,8	0,3	LA03J
Alter: Diagnose PK						58,5	59,1	-0,6	58,7	-0,2	LA04J
Alter: Auftreten typ. Pk-Beschwerden						55,0	54,6	0,4	54,9	0,2	LA05J
Alter: Muskelverspannungen						51,5	48,8	2,7	50,5	1,0	LA07AJ
Alter: Gelenk- oder Muskelschmerzen						51,3	47,2	4,1	49,7	1,6	LA07BJ
Alter: Schlafstörungen						50,1	47,5	2,6	46,7	3,4	LA07CJ
Alter: Kopfschmerzen im Hinterkopf						48,1	45,9	2,3	47,2	0,9	LA07DJ
Alter: Nachlassen des Geruchssinns						54,0	52,8	1,3	53,6	0,5	LA07EJ
Alter: Tränen der Augen						59,4	53,4	6,0	57,0	2,4	LA07FJ
Alter: kleinere/unsichere Schrift						57,1	53,7	3,4	55,4	1,7	LA07GJ
Alter: Leiseres Sprechen						57,7	56,0	1,7	57,1	0,6	LA07HJ
Alter: Gedrücktere Stimmung						53,7	52,8	0,8	52,4	1,3	LA07IJ
Alter: deutlicher Anzeichen Vergeßlichkeit						53,9	51,8	2,1	52,2	1,7	LA09J
Alter: Beginn Spiel eines Musikinstrumentes						18,1	17,0	1,1	17,5	0,6	LA16B
Alter: Aufgabe Spiel eines Musikinstrumentes						39,8	32,1	7,7	38,2	1,6	LA16E
Alter: Beginn Rauchen						21,5	26,0	-4,5	18,2	3,3	LA17AJ
Alter: Aufgabe Rauchen						46,4	47,2	-0,8	46,6	-0,2	LA17EJ
Alter: Beginn trauriger Verstimmungen/Depris						56,0	57,3	-1,3	56,7	-0,7	LA34AJ
Alter: Ende trauriger Verstimmungen/Depris						63,4	64,5	-1,2	63,6	-0,3	LA34EJ
Zusammenhang mit Jahr der PK-Diagnose											42
Seit wieviel Jahren Parkinson?						7,2	6,9	0,3	7,1	0,1	K_JAHRE
Berufsaustritt/Aufgabe J						-3,8	-4,9	1,1	-4,2	0,4	PK03J
typische PK-Beschw. (retrospektiv)						-3,1	-3,4	0,3	-3,2	0,1	PK05J
Zeitr.Zus.Pk: Muskelverspannung						-7,1	-8,6	1,5	-7,5	0,4	PK07AJ
Zeitr.Zus.Pk: Gelenk-/bzw. Muskelschmerzen						-7,8	-12,1	4,3	-9,4	1,6	PK07BJ
Zeitr.Zus.Pk: Schlafstörungen x Jahre vor (-) bzw. nach(+) PK-Di						-7,9	-10,7	2,8	-11,7	3,7	PK07CJ
Zeitr.Zus.Pk: Kopfschmerzen im Hinterkopf						-12,2	-11,4	-0,8	-11,7	-0,5	PK07DJ
Zeitr.Zus.Pk: Nachlassen Geruchssinn						-4,6	-7,6	3,1	-5,4	0,8	PK07EJ
Zeitr.Zus.Pk: Tränen der Augen						-2,8	-6,7	3,9	-4,3	1,5	PK07FJ
Zeitr.Zus.Pk: Kleinere (oder unsichere) Schrift						-1,0	-3,0	2,0	-2,2	1,2	PK07GJ
Zeitr.Zus.Pk: Leiseres Sprechen						-0,6	-0,8	0,3	-0,6	0,0	PK07HJ
Zeitr.Zus.Pk: Gedrückte Stimmung						-4,5	-2,3	-2,2	-4,8	0,3	PK07IJ
Zeitr.Zus.Pk: deutl. Anz. von Vergeßlichkeit						-7,2	-5,3	-2,0	-7,3	0,0	PK09J
Zeitr.Zus.Pk: Beginn Musizieren						-41,8	-38,4	-3,4	-41,3	-0,5	PK16BJ
Zeitr.Zus.Pk: Ende Musizieren						-20,0	-23,3	3,3	-20,3	0,3	PK16EJ
Zeitr.Zus.Pk: Beginn Rauchen						-36,4	-31,2	-5,2	-38,0	1,6	PK17AJ
Zeitr.Zus.Pk: Aufgabe des Rauchens						-11,2	-8,2	-2,9	-12,3	1,2	PK17EJ
Zeitr.Zus.Pk: Depressionsbeginn						-1,4	-0,1	-1,4	-0,9	-0,5	PK34AJ
Zeitr.Zus.Pk: Ende Depressionen						5,9	7,3	-1,4	6,3	-0,4	PK34EJ
Dauer											43
Dauer Musizieren						21,7	15,1	6,6	19,6	2,2	DAUR16
Dauer Rauchen						24,9	21,2	3,7	23,3	1,6	DAUR17
Dauer Depressionen						7,4	7,3	0,1	7,6	-0,2	DAUR34