

Wein vertragen

19C1

allgemeine Angaben		00ALL %	ja, Wein vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
allgemeine Fragen								0
Männerquote (Frauenquote = 100% - Männerquote)			65,8	57,1	8,7	59,3	6,5	00B
Anzahl Probanden			73,0	163,0	-90,0	236,0	-163,0	01SIGEL
Wert/Code			1,0	0,0	1,0	9,0	-8,0	Value
Lebenseinstellung		01LEB %	ja, Wein vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Selbsteinschätzung								11
ernst			35,6	44,8	-9,2	42,0	-6,3	11.1
pflichtbewußt			86,3	84,0	2,3	84,8	1,6	11.2
strebsam			58,9	48,5	10,4	51,7	7,2	11.3
gründlich			69,9	49,1	20,8	55,5	14,4	11.4
Empfindsam, "dünnhäutig"			49,3	52,8	-3,4	51,7	-2,4	11.5
fröhlich			41,1	31,9	9,2	34,8	6,3	11.6
spontan			19,2	20,2	-1,1	19,9	-0,7	11.7
leichtlebig			5,5	2,5	3,0	3,4	2,1	11.8
humorvoll			39,7	22,7	17,0	28,0	11,8	11.9
musikalische Betätigung								12
Instrument gespielt?			30,1	20,2	9,9	27,5	2,6	16A
psychosoziale Faktoren								13
Spannungen: im Beruf			31,5	28,8	2,7	29,7	1,8	21BER
Spannungen: in der Familie			46,6	47,9	-1,3	47,5	-0,9	21FAM
Spannungen: im Freundes/Bekanntkreis			2,7	5,5	-2,8	4,7	-1,9	21FREU
Neigung eigene Gefühle zu unterdrücken			67,1	65,0	2,1	65,7	1,4	22
Depressionsquote			37,0	31,9	5,1	64,4	-27,4	34JN
Ernährung, Verdauung, Genußmittel		02ERN %	ja, Wein vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Ernährung allgemein								20
Viel Obst und Rohkost im Jahr. vor Erkrankung			64,4	50,9	13,5	55,1	9,3	24
Gerne süße Speisen/Cola/Limo			84,9	77,3	7,6	79,7	5,3	26A
Heißhunger auf Süßes			53,4	48,5	5,0	50,0	3,4	26B
Konnte Mahlzeit auslassen			61,6	66,9	-5,2	65,3	-3,6	27A
Aß Kleinigkeit zwischen Mahlzeiten			47,9	34,4	13,6	38,6	9,4	27B
Nahrungsgewohnheiten geändert			37,0	33,1	3,9	34,3	2,7	35
Verdauungsbeschwerden								22
Verdauungsbeschwerde Blähungen			37,0	34,4	2,6	35,2	1,8	28BLAE
Verdauungsbeschwerde Durchfall			9,6	3,7	5,9	5,5	4,1	28DURC
Verdauungsbeschwerde Verstopfung			53,4	36,2	17,2	41,5	11,9	28VERS
Kaffee/Tee								25
Kaffeetrinker			74,0	65,0	8,9	69,9	4,1	20KAF
Teetrinker			68,5	39,9	28,6	52,0	16,5	20TEE
Anzahl Tassen Kaffee/Tag			2,7	2,3	0,5	2,4	0,3	20KTA
Anzahl Tassen Tee/Tag			1,8	1,1	0,6	1,3	0,4	20TTA
Alkohol								26
Alkohol Verträglichkeitsquote			68,5	62,0	6,5	68,0	0,5	19
Wein vertragen						30,9		19C1
Sekt vertragen			54,8	4,3	50,5	19,9	34,9	19C2
Bier vertragen			71,2	17,2	54,1	33,9	37,3	19C3
Branntwein vertragen			23,3	1,8	21,4	8,5	14,8	19C4
Likör vertragen			30,1	4,3	25,8	12,3	17,8	19C5
Rauchen								27
Wie stark geraucht?			37,0	28,8	8,2	0,4	36,6	17S
Konstitution		03KON %	ja, Wein vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Belastung und Belastbarkeit								32
Erblichkeitsquotient			11,0	13,5	-2,5	12,7	-1,7	10

Wie belastbar früher?						78,1	79,8	-1,7	79,2	-1,2	12A
Wie belastet im Jahrz. vor Parkinson?						76,7	60,7	16,0	65,7	11,0	12B
Konstitution, Schlaf											
Wie groß war Schlafbedarf?						52,1	53,4	-1,3	53,0	-0,9	13
Ich ging gerne früh schlafen.						49,3	44,2	5,1	45,8	3,6	13B
War früh schlafen möglich?						45,2	53,4	-8,2	50,9	-5,6	13C
Konstitution, sportliche Betätigung											
Sport, Jogging, Gymn. (Jahrz. vor PK)						46,6	39,3	7,3	41,5	5,0	15A
Wie häufig Gymnastik (Jahrz. vor PK)						21,9	23,9	-2,0	23,3	-1,4	15GYM
Wie häufig Jogging (Jahrz. vor PK)						9,6	7,4	2,2	8,1	1,5	15JOG
Wie oft Sport (Jahrz. vor PK)						31,5	23,9	7,6	26,3	5,2	15SPO
Einflußfaktoren auf Symptomatik											
						05COP %	ja, Wein vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Verschlechterungen durch ...											
schlechter: Überanstrengung						65,8	63,8	1,9	64,4	1,3	36A1
schlechter Aufregung,Sorge						76,7	76,7	0,0	76,7	0,0	36A2
schlechter: Hetze						69,9	65,0	4,8	66,5	3,3	36A3
schlechter: Zu wenig Schlaf						42,5	30,1	12,4	33,9	8,6	36A4
schlechter: Zu wenig Trinken						13,7	11,7	2,0	12,3	1,4	36A5
schlechter: Klimastürze						71,2	49,7	21,5	56,4	14,9	36A6
schlechter: Hitze						43,8	36,2	7,6	38,6	5,3	36A7
schlechter: Schlechte Luft						38,4	27,6	10,7	30,9	7,4	36A8
schlechter: Tabakrauch						30,1	21,5	8,7	24,2	6,0	36A9
Verbesserungen durch...											
gut: in heiterer Gesellschaft						56,2	60,1	-4,0	58,9	-2,7	37A
gut: bei leichter Musik						46,6	41,1	5,5	42,8	3,8	37B
gut: nach Gymnastik						35,6	43,6	-7,9	41,1	-5,5	37C
gut: nach dem Schlafen						52,1	37,4	14,6	42,0	10,1	37D
gut: in frischer Luft						68,5	69,3	-0,8	69,1	-0,6	37E
gut: nach Entspannungsübungen						38,4	36,8	1,5	37,3	1,1	37F
gut: nach dem Schwimmen						19,2	21,5	-2,3	20,8	-1,6	37G
Krankheitsverlauf											
						06SYM %	ja, Wein vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Krankheitsverlauf, Symptomatik											
32 Äquivalenztyp J/N						30,1	31,9	-1,8	31,4	-1,2	32EQUI
32 Rigordominanztyp J/N						43,8	41,1	2,7	42,0	1,9	32RIGO
32 Tremordominanztyp J/N						26,0	27,0	-1,0	26,7	-0,7	32TREM
Beschwerden seit Diag. schlimmer?						84,9	76,1	8,9	78,8	6,1	33BS
Versteifung seit Diagnose besser?						24,7	21,5	3,2	22,5	2,2	33VB
Versteifung seit Diagnose schlimmer?						65,8	52,1	13,6	56,4	9,4	33VS
Zittern seit Diagnose gebessert?						35,6	26,4	9,2	29,2	6,4	33ZB
Zittern seit Diagnose zugenommen?						50,7	51,5	-0,8	63,1	-12,5	33ZS
offene Fragen											
						08OFF Anzahl	ja, Wein vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Verweise auf Ergebnisse offener Fragen											
Anzahl Medikamente heute						3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	ANZ30H
Angaben zu 31 Ärzten						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	NZ31ARZ
Angaben zu 31 Behandlungen						3,4	3,3	0,1	3,3	0,1	NZ31BEH
Anzahl Medikamente V31						0,1	0,2	-0,1	0,2	-0,1	I31SUM
Anzahl verschlechternde Umstände (offene Listen)						0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	NZ36OFF
Anzahl verbessernde Umstände (offene Listen)						0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	NZ37OFF
Anzahl erwähnenswerte Belastungen (offene Listen)						0,4	0,5	0,0	0,5	0,0	NZ38OFF
Angaben (offen) zu Krankheitsursachen						7,1	6,9	0,2	7,0	0,1	ANZ6
Angaben zu frühsymptomen						4,1	4,2	-0,1	4,1	0,0	ANZ7
Indexe											
						10NDX Index!	ja, Wein vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Indexvariablen											
In gespannten Verhältnissen gelebt						4,9	4,4	0,5	4,6	0,3	21
Was früher gegessen?						1,5	1,6	-0,1	1,6	-0,1	23
beruflicher Aufstieg2						0,5	0,4	0,1			AUFST

beruflicher Aufstieg				0,9	0,6	0,3	0,7	0,2	UFSTEIG
Vorlaufsymptome & Lebensalter		11 Jr Jahre	ja, Wein vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt		
Zusammenhang mit Lebensalter									41
Alter: Zum Zeitpunkt der Befragung				67,1	65,5	1,6	66,0	1,1	LA00C
Alter: Berufsaufgabe				56,6	55,3	1,3	55,8	0,8	LA03J
Alter: Diagnose PK				59,6	58,3	1,3	58,7	0,9	LA04J
Alter: Auftreten typ. Pk-Beschwerden				55,0	54,8	0,2	54,9	0,2	LA05J
Alter: Muskelverspannungen				52,3	49,5	2,7	50,5	1,8	LA07AJ
Alter: Gelenk- oder Muskelschmerzen				52,1	48,5	3,6	49,7	2,4	LA07BJ
Alter: Schlafstörungen				49,2	49,2	0,0	46,7	2,5	LA07CJ
Alter: Kopfschmerzen im Hinterkopf				45,9	48,1	-2,2	47,2	-1,3	LA07DJ
Alter: Nachlassen des Geruchssinns				52,5	54,1	-1,6	53,6	-1,1	LA07EJ
Alter: Tränen der Augen				53,7	58,4	-4,7	57,0	-3,3	LA07FJ
Alter: kleinere/unsichere Schrift				57,7	55,1	2,6	55,4	2,3	LA07GJ
Alter: Leiseres Sprechen				57,5	57,0	0,5	57,1	0,4	LA07HJ
Alter: Gedrücktere Stimmung				53,2	53,5	-0,3	52,4	0,8	LA07IJ
Alter: deutlicher Anzeichen Vergeßlichkeit				53,5	52,9	0,6	52,2	1,3	LA09J
Alter: Beginn Spiel eines Musikinstrumentes				17,4	17,9	-0,5	17,5	-0,1	LA16B
Alter: Aufgabe Spiel eines Musikinstrumentes				42,5	33,8	8,8	38,2	4,3	LA16E
Alter: Beginn Rauchen				22,2	22,8	-0,6	18,2	4,0	LA17AJ
Alter: Aufgabe Rauchen				49,4	44,9	4,5	46,6	2,8	LA17EJ
Alter: Beginn trauriger Verstimmungen/Depris				56,3	56,5	-0,2	56,7	-0,3	LA34AJ
Alter: Ende trauriger Verstimmungen/Depris				66,1	62,6	3,5	63,6	2,4	LA34EJ
Zusammenhang mit Jahr der PK-Diagnose									42
Seit wieviel Jahren Parkinson?				7,4	7,0	0,3	7,1	0,2	K_JAHRE
Berufsaustritt/Aufgabe J				-3,3	-4,6	1,3	-4,2	0,9	PK03J
typische PK-Beschw. (retrospektiv)				-3,4	-3,1	-0,3	-3,2	-0,2	PK05J
Zeittl.Zus.Pk: Muskelverspannung				-6,6	-8,2	1,6	-7,5	0,9	PK07AJ
Zeittl.Zus.Pk: Gelenk-/bzw. Muskelschmerzen				-6,0	-11,1	5,1	-9,4	3,4	PK07BJ
Zeittl.Zus.Pk: Schlafstörungen x Jahre vor (-) bzw. nach(+) PK-Di				-8,4	-9,2	0,8	-11,7	3,3	PK07CJ
Zeittl.Zus.Pk: Kopfschmerzen im Hinterkopf				-13,1	-11,1	-2,1	-11,7	-1,4	PK07DJ
Zeittl.Zus.Pk: Nachlassen Geruchssinn				-4,8	-6,1	1,3	-5,4	0,6	PK07EJ
Zeittl.Zus.Pk: Tränen der Augen				-3,9	-4,5	0,6	-4,3	0,4	PK07FJ
Zeittl.Zus.Pk: Kleinere (oder unsicherere) Schrift				-0,9	-2,1	1,1	-2,2	1,3	PK07GJ
Zeittl.Zus.Pk: Leiseres Sprechen				-0,9	-0,6	-0,3	-0,6	-0,3	PK07HJ
Zeittl.Zus.Pk: Gedrückte Stimmung				-4,8	-3,2	-1,6	-4,8	-0,1	PK07IJ
Zeittl.Zus.Pk: deutl. Anz. von Vergeßlichkeit				-7,1	-6,2	-0,9	-7,3	0,1	PK09J
Zeittl.Zus.Pk: Beginn Musizieren				-40,0	-41,1	1,1	-41,3	1,3	PK16BJ
Zeittl.Zus.Pk: Ende Musizieren				-14,9	-25,2	10,4	-20,3	5,4	PK16EJ
Zeittl.Zus.Pk: Beginn Rauchen				-39,2	-32,9	-6,3	-38,0	-1,2	PK17AJ
Zeittl.Zus.Pk: Aufgabe des Rauchens				-9,9	-10,7	0,9	-12,3	2,4	PK17EJ
Zeittl.Zus.Pk: Depressionsbeginn				-2,5	-0,2	-2,3	-0,9	-1,6	PK34AJ
Zeittl.Zus.Pk: Ende Depressionen				7,2	6,0	1,2	6,3	0,9	PK34EJ
Dauer									43
Dauer Musizieren				25,1	15,8	9,3	19,6	5,6	DAUR16
Dauer Rauchen				27,2	22,1	5,1	23,3	3,9	DAUR17
Dauer Depressionen				9,7	6,1	3,6	7,6	2,1	DAUR34