

Sekt vertragen

19C2

allgemeine Angaben		00ALL %	ja, Sekt vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
allgemeine Fragen								0
Männerquote (Frauenquote = 100% - Männerquote)			66,0	58,2	7,8	59,3	6,7	00B
Anzahl Probanden			47,0	189,0	142,0	236,0	-189,0	th SIGEL
Wert/Code			1,0	0,0	1,0	9,0	-8,0	Value
Lebenseinstellung		01LEB %	ja, Sekt vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Selbsteinschätzung								11
ernst			44,7	41,3	3,4	42,0	2,7	11.1
pflichtbewußt			85,1	84,7	0,5	84,8	0,4	11.2
strebsam			57,4	50,3	7,2	51,7	5,8	11.3
gründlich			68,1	52,4	15,7	55,5	12,6	11.4
Empfindsam, "dünnhäutig"			53,2	51,3	1,9	51,7	1,5	11.5
fröhlich			36,2	34,4	1,8	34,8	1,4	11.6
spontan			23,4	19,0	4,4	19,9	3,5	11.7
leichtlebig			8,5	2,1	6,4	3,4	5,1	11.8
humorvoll			38,3	25,4	12,9	28,0	10,3	11.9
musikalische Betätigung								12
Instrument gespielt?			27,7	22,2	5,4	27,5	0,1	16A
psychosoziale Faktoren								13
Spannungen: im Beruf			38,3	27,5	10,8	29,7	8,6	21BER
Spannungen: in der Familie			40,4	49,2	-8,8	47,5	-7,0	21FAM
Spannungen: im Freundes/Bekanntkreis			4,3	4,8	-0,5	4,7	-0,4	21FREU
Neigung eigene Gefühle zu unterdrücken			68,1	65,1	3,0	65,7	2,4	22
Depressionsquote			25,5	35,4	-9,9	64,4	-38,9	34JN
Ernährung, Verdauung, Genußmittel		02ERN %	ja, Sekt vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Ernährung allgemein								20
Viel Obst und Rohkost im Jahr. vor Erkrankung			55,3	55,0	0,3	55,1	0,2	24
Gerne süße Speisen/Cola/Limo			83,0	78,8	4,1	79,7	3,3	26A
Heißhunger auf Süßes			57,4	48,1	9,3	50,0	7,4	26B
Konnte Mahlzeit auslassen			70,2	64,0	6,2	65,3	5,0	27A
Aß Kleinigkeit zwischen Mahlzeiten			48,9	36,0	13,0	38,6	10,4	27B
Nahrungsgewohnheiten geändert			25,5	36,5	-11,0	34,3	-8,8	35
Verdauungsbeschwerden								22
Verdauungsbeschwerde Blähungen			31,9	36,0	-4,1	35,2	-3,3	28BLAE
Verdauungsbeschwerde Durchfall			4,3	5,8	-1,6	5,5	-1,3	28DURC
Verdauungsbeschwerde Verstopfung			61,7	36,5	25,2	41,5	20,2	28VERS
Kaffee/Tee								25
Kaffeetrinker			78,7	65,1	13,6	69,9	8,8	20KAF
Teetrinker			55,3	47,1	8,2	52,0	3,3	20TEE
Anzahl Tassen Kaffee/Tag			3,0	2,2	0,8	2,4	0,6	20KTA
Anzahl Tassen Tee/Tag			1,5	1,3	0,2	1,3	0,1	20TTA
Alkohol								26
Alkohol Verträglichkeitsquote			72,3	61,9	10,4	68,0	4,3	19
Wein vertragen			85,1	17,5	67,6	30,9	54,2	19C1
Sekt vertragen						19,9		19C2
Bier vertragen			74,5	23,8	50,7	33,9	40,6	19C3
Branntwein vertragen			36,2	1,6	34,6	8,5	27,7	19C4
Likör vertragen			34,0	6,9	27,2	12,3	21,8	19C5
Rauchen								27
Wie stark geraucht?			44,7	28,0	16,6	0,4	44,3	17S
Konstitution		03KON %	ja, Sekt vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Belastung und Belastbarkeit								32
Erblichkeitsquotient			8,5	13,8	-5,2	12,7	-4,2	10

Wie belastbar früher?						72,3	81,0	-8,6	79,2	-6,9	12A	
Wie belastet im Jahrz. vor Parkinson?						74,5	63,5	11,0	65,7	8,8	12B	
Konstitution, Schlaf												
Wie groß war Schlafbedarf?						48,9	54,0	-5,0	53,0	-4,0	13	
Ich ging gerne früh schlafen.						44,7	46,0	-1,4	45,8	-1,1	13B	
War früh schlafen möglich?						44,7	52,4	-7,7	50,9	-6,2	13C	
Konstitution, sportliche Betätigung												
Sport, Jogging, Gymn. (Jahrz. vor PK)						48,9	39,7	9,3	41,5	7,4	15A	
Wie häufig Gymnastik (Jahrz. vor PK)						27,7	22,2	5,4	23,3	4,3	15GYM	
Wie häufig Jogging (Jahrz. vor PK)						8,5	7,9	0,6	8,1	0,5	15JOG	
Wie oft Sport (Jahrz. vor PK)						29,8	25,4	4,4	26,3	3,5	15SPO	
Einflußfaktoren auf Symptomatik												
						05COP	ja, Sekt vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Verschlechterungen durch ...												
schlechter: Überanstrengung						70,2	63,0	7,2	64,4	5,8	36A1	
schlechter Aufregung,Sorge						76,6	76,7	-0,1	76,7	-0,1	36A2	
schlechter: Hetze						66,0	66,7	-0,7	66,5	-0,6	36A3	
schlechter: Zu wenig Schlaf						40,4	32,3	8,2	33,9	6,5	36A4	
schlechter: Zu wenig Trinken						19,1	10,6	8,6	12,3	6,9	36A5	
schlechter: Klimastürze						74,5	51,9	22,6	56,4	18,1	36A6	
schlechter: Hitze						46,8	36,5	10,3	38,6	8,2	36A7	
schlechter: Schlechte Luft						42,6	28,0	14,5	30,9	11,6	36A8	
schlechter: Tabakrauch						29,8	22,8	7,0	24,2	5,6	36A9	
Verbesserungen durch...												
gut: in heiterer Gesellschaft						57,4	59,3	-1,8	58,9	-1,5	37A	
gut: bei leichter Musik						51,1	40,7	10,3	42,8	8,3	37B	
gut: nach Gymnastik						38,3	41,8	-3,5	41,1	-2,8	37C	
gut: nach dem Schlafen						51,1	39,7	11,4	42,0	9,1	37D	
gut: in frischer Luft						72,3	68,3	4,1	69,1	3,3	37E	
gut: nach Entspannungsübungen						36,2	37,6	-1,4	37,3	-1,1	37F	
gut: nach dem Schwimmen						23,4	20,1	3,3	20,8	2,6	37G	
Krankheitsverlauf												
						06SYM	ja, Sekt vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Krankheitsverlauf, Symptomatik												
32 Äquivalenztyp J/N						31,9	31,2	0,7	31,4	0,6	32EQUI	
32 Rigordominanztyp J/N						44,7	41,3	3,4	42,0	2,7	32RIGO	
32 Tremordominanztyp J/N						23,4	27,5	-4,1	26,7	-3,3	32TREM	
Beschwerden seit Diag. schlimmer?						83,0	77,8	5,2	78,8	4,2	33BS	
Versteifung seit Diagnose besser?						27,7	21,2	6,5	22,5	5,2	33VB	
Versteifung seit Diagnose schlimmer?						68,1	53,4	14,6	56,4	11,7	33VS	
Zittern seit Diagnose gebessert?						38,3	27,0	11,3	29,2	9,1	33ZB	
Zittern seit Diagnose zugenommen?						51,1	51,3	-0,3	63,1	-12,1	33ZS	
offene Fragen												
						08OFF	ja, Sekt vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Anzahl												
Verweise auf Ergebnisse offener Fragen												
Anzahl Medikamente heute						3,2	3,0	0,3	3,0	0,2	ANZ30H	
Angaben zu 31 Ärzten						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ANZ31ARZ	
Angaben zu 31 Behandlungen						3,5	3,3	0,2	3,3	0,2	ANZ31BEH	
Anzahl Medikamente V31						0,1	0,2	-0,1	0,2	-0,1	ANZ31SUM	
Anzahl verschlechternde Umstände (offene Listen)						0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	ANZ36OFF	
Anzahl verbessernde Umstände (offene Listen)						0,2	0,2	-0,1	0,2	-0,1	ANZ37OFF	
Anzahl erwähnenswerte Belastungen (offene Listen)						0,6	0,4	0,1	0,5	0,1	ANZ38OFF	
Angaben (offen) zu Krankheitsursachen						7,3	6,9	0,5	7,0	0,3	ANZ6	
Angaben zu frühsymptomen						4,2	4,1	0,0	4,1	0,1	ANZ7	
Indexe												
						10NDX	ja, Sekt vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Index!												
Indexvariablen												
In gespannten Verhältnissen gelebt						5,0	4,5	0,5	4,6	0,4	21	
Was früher gegessen?						1,6	1,6	0,0	1,6	0,0	23	
beruflicher Aufstieg2						0,5	0,5	0,0			AUFST	

beruflicher Aufstieg				0,7	0,7	0,0	0,7	0,0	UFSTEIG
Vorlaufsymptome & Lebensalter		11 Jr Jahre	ja, Sekt vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt		
Zusammenhang mit Lebensalter									41
Alter: Zum Zeitpunkt der Befragung				66,2	65,9	0,3	66,0	0,2	LA00C
Alter: Berufsaufgabe				55,3	55,9	-0,7	55,8	-0,5	LA03J
Alter: Diagnose PK				58,9	58,7	0,2	58,7	0,2	LA04J
Alter: Auftreten typ. Pk-Beschwerden				54,2	55,0	-0,8	54,9	-0,6	LA05J
Alter: Muskelverspannungen				50,6	50,4	0,2	50,5	0,1	LA07AJ
Alter: Gelenk- oder Muskelschmerzen				50,3	49,5	0,8	49,7	0,6	LA07BJ
Alter: Schlafstörungen				48,2	49,5	-1,4	46,7	1,5	LA07CJ
Alter: Kopfschmerzen im Hinterkopf				47,5	47,1	0,4	47,2	0,3	LA07DJ
Alter: Nachlassen des Geruchssinns				54,3	53,4	0,9	53,6	0,7	LA07EJ
Alter: Tränen der Augen				56,0	57,3	-1,3	57,0	-1,0	LA07FJ
Alter: kleinere/unsichere Schrift				55,3	56,0	-0,7	55,4	-0,1	LA07GJ
Alter: Leiseres Sprechen				56,8	57,2	-0,3	57,1	-0,3	LA07HJ
Alter: Gedrücktere Stimmung				52,1	53,7	-1,6	52,4	-0,3	LA07IJ
Alter: deutlicher Anzeichen Vergeßlichkeit				49,1	54,1	-5,0	52,2	-3,1	LA09J
Alter: Beginn Spiel eines Musikinstrumentes				19,8	17,1	2,8	17,5	2,3	LA16B
Alter: Aufgabe Spiel eines Musikinstrumentes				40,0	36,5	3,5	38,2	1,8	LA16E
Alter: Beginn Rauchen				23,4	22,3	1,1	18,2	5,2	LA17AJ
Alter: Aufgabe Rauchen				51,7	44,5	7,1	46,6	5,1	LA17EJ
Alter: Beginn trauriger Verstimmungen/Depris				53,4	57,0	-3,6	56,7	-3,2	LA34AJ
Alter: Ende trauriger Verstimmungen/Depris				63,2	63,9	-0,7	63,6	-0,5	LA34EJ
Zusammenhang mit Jahr der PK-Diagnose									42
Seit wieviel Jahren Parkinson?				7,2	7,1	0,1	7,1	0,1	PK01K
Berufsaustritt/Aufgabe J				-3,7	-4,3	0,6	-4,2	0,5	PK03J
typische PK-Beschw. (retrospektiv)				-3,7	-3,1	-0,6	-3,2	-0,5	PK05J
Zeittl.Zus.Pk: Muskelverspannung				-7,7	-7,7	0,0	-7,5	-0,2	PK07AJ
Zeittl.Zus.Pk: Gelenk-/bzw. Muskelschmerzen				-7,3	-10,1	2,8	-9,4	2,1	PK07BJ
Zeittl.Zus.Pk: Schlafstörungen x Jahre vor (-) bzw. nach(+) PK-Di				-7,3	-9,5	2,1	-11,7	4,3	PK07CJ
Zeittl.Zus.Pk: Kopfschmerzen im Hinterkopf				-11,1	-12,2	1,1	-11,7	0,7	PK07DJ
Zeittl.Zus.Pk: Nachlassen Geruchssinn				-5,0	-5,8	0,8	-5,4	0,4	PK07EJ
Zeittl.Zus.Pk: Tränen der Augen				-5,0	-4,2	-0,8	-4,3	-0,7	PK07FJ
Zeittl.Zus.Pk: Kleinere (oder unsicherere) Schrift				-2,6	-1,5	-1,1	-2,2	-0,5	PK07GJ
Zeittl.Zus.Pk: Leiseres Sprechen				-1,6	-0,4	-1,2	-0,6	-1,1	PK07HJ
Zeittl.Zus.Pk: Gedrückte Stimmung				-5,2	-3,4	-1,8	-4,8	-0,5	PK07IJ
Zeittl.Zus.Pk: deutl. Anz. von Vergeßlichkeit				-11,3	-5,4	-5,9	-7,3	-4,1	PK09J
Zeittl.Zus.Pk: Beginn Musizieren				-38,9	-41,2	2,3	-41,3	2,3	PK16BJ
Zeittl.Zus.Pk: Ende Musizieren				-18,8	-21,8	3,0	-20,3	1,5	PK16EJ
Zeittl.Zus.Pk: Beginn Rauchen				-36,3	-34,6	-1,7	-38,0	1,6	PK17AJ
Zeittl.Zus.Pk: Aufgabe des Rauchens				-6,5	-12,0	5,6	-12,3	5,8	PK17EJ
Zeittl.Zus.Pk: Depressionsbeginn				-2,8	-0,6	-2,1	-0,9	-1,8	PK34AJ
Zeittl.Zus.Pk: Ende Depressionen				7,0	6,3	0,7	6,3	0,7	PK34EJ
Dauer									43
Dauer Musizieren				20,2	19,4	0,8	19,6	0,6	DAUR16
Dauer Rauchen				28,3	22,3	6,0	23,3	5,0	DAUR17
Dauer Depressionen				10,3	6,8	3,5	7,6	2,7	DAUR34