

## Branntwein vertragen

19C4

allgemeine Angaben		00ALL %	ja, Branntwein vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
<b>allgemeine Fragen</b>								0
Männerquote (Frauenquote = 100% - Männerquote)			85,0	57,4	27,6	59,3	25,7	00B
Anzahl Probanden			20,0	216,0	196,0	236,0	-216,0	01SIGEL
Wert/Code			1,0	0,0	1,0	9,0	-8,0	Value
Lebenseinstellung		01LEB %	ja, Branntwein vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
<b>Selbsteinschätzung</b>								11
ernst			50,0	41,2	8,8	42,0	8,1	11.1
pflichtbewußt			80,0	85,2	-5,2	84,8	-4,8	11.2
strebsam			45,0	52,3	-7,3	51,7	-6,7	11.3
gründlich			60,0	55,1	4,9	55,5	4,5	11.4
Empfindsam, "dünnhäutig"			50,0	51,9	-1,9	51,7	-1,7	11.5
fröhlich			40,0	34,3	5,7	34,8	5,3	11.6
spontan			20,0	19,9	0,1	19,9	0,1	11.7
leichtlebig			5,0	3,2	1,8	3,4	1,6	11.8
humorvoll			25,0	28,2	-3,2	28,0	-3,0	11.9
<b>musikalische Betätigung</b>								12
Instrument gespielt?			35,0	22,2	12,8	27,5	7,5	16A
<b>psychosoziale Faktoren</b>								13
Spannungen: im Beruf			40,0	28,7	11,3	29,7	10,3	21BER
Spannungen: in der Familie			30,0	49,1	-19,1	47,5	-17,5	21FAM
Spannungen: im Freundes/Bekanntkreis			5,0	4,6	0,4	4,7	0,3	21FREU
Neigung eigene Gefühle zu unterdrücken			70,0	65,3	4,7	65,7	4,3	22
Depressionsquote			15,0	35,2	-20,2	64,4	-49,4	34JN
Ernährung, Verdauung, Genußmittel		02ERN %	ja, Branntwein vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
<b>Ernährung allgemein</b>								20
Viel Obst und Rohkost im Jahr. vor Erkrankung			50,0	55,6	-5,6	55,1	-5,1	24
Gerne süße Speisen/Cola/Limo			85,0	79,2	5,8	79,7	5,3	26A
Heißhunger auf Süßes			65,0	48,6	16,4	50,0	15,0	26B
Konnte Mahlzeit auslassen			80,0	63,9	16,1	65,3	14,8	27A
Aß Kleinigkeit zwischen Mahlzeiten			50,0	37,5	12,5	38,6	11,4	27B
Nahrungsgewohnheiten geändert			30,0	34,7	-4,7	34,3	-4,3	35
<b>Verdauungsbeschwerden</b>								22
Verdauungsbeschwerde Blähungen			25,0	36,1	-11,1	35,2	-10,2	28BLAE
Verdauungsbeschwerde Durchfall			5,0	5,6	-0,6	5,5	-0,5	28DURC
Verdauungsbeschwerde Verstopfung			60,0	39,8	20,2	41,5	18,5	28VERS
<b>Kaffee/Tee</b>								25
Kaffeetrinker			70,0	67,6	2,4	69,9	0,1	20KAF
Teetrinker			60,0	47,7	12,3	52,0	8,0	20TEE
Anzahl Tassen Kaffee/Tag			2,7	2,4	0,3	2,4	0,3	20KTA
Anzahl Tassen Tee/Tag			1,7	1,3	0,4	1,3	0,3	20TTA
<b>Alkohol</b>								26
Alkohol Verträglichkeitsquote			90,0	61,6	28,4	68,0	22,0	19
Wein vertragen			85,0	25,9	59,1	30,9	54,1	19C1
Sekt vertragen			85,0	13,9	71,1	19,9	65,1	19C2
Bier vertragen			90,0	28,7	61,3	33,9	56,1	19C3
Branntwein vertragen						8,5		19C4
Likör vertragen			65,0	7,4	57,6	12,3	52,7	19C5
<b>Rauchen</b>								27
Wie stark geraucht?			45,0	30,1	14,9	0,4	44,6	17S
Konstitution		03KON %	ja, Branntwein vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
<b>Belastung und Belastbarkeit</b>								32
Erblichkeitsquotient			5,0	13,4	-8,4	12,7	-7,7	10

Wie belastbar früher?					75,0	79,6	-4,6	79,2	-4,2	12A
Wie belastet im Jahrz. vor Parkinson?					70,0	65,3	4,7	65,7	4,3	12B
<b>Konstitution, Schlaf</b>										
Wie groß war Schlafbedarf?					60,0	52,3	7,7	53,0	7,0	13
Ich ging gerne früh schlafen.					45,0	45,8	-0,8	45,8	-0,8	13B
War früh schlafen möglich?					55,0	50,5	4,5	50,9	4,2	13C
<b>Konstitution, sportliche Betätigung</b>										
Sport, Jogging, Gymn. (Jahrz. vor PK)					35,0	42,1	-7,1	41,5	-6,5	15A
Wie häufig Gymnastik (Jahrz. vor PK)					15,0	24,1	-9,1	23,3	-8,3	15GYM
Wie häufig Jogging (Jahrz. vor PK)					5,0	8,3	-3,3	8,1	-3,1	15JOG
Wie oft Sport (Jahrz. vor PK)					20,0	26,9	-6,9	26,3	-6,3	15SPO
<b>Einflußfaktoren auf Symptomatik</b>										
					05 COP %	ja, Branntwein vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
<b>Verschlechterungen durch ...</b>										
schlechter: Überanstrengung					60,0	64,8	-4,8	64,4	-4,4	35A1
schlechter Aufregung,Sorge					70,0	77,3	-7,3	76,7	-6,7	35A2
schlechter: Hetze					60,0	67,1	-7,1	66,5	-6,5	35A3
schlechter: Zu wenig Schlaf					30,0	34,3	-4,3	33,9	-3,9	35A4
schlechter: Zu wenig Trinken					10,0	12,5	-2,5	12,3	-2,3	35A5
schlechter: Klimastürze					50,0	56,9	-6,9	56,4	-6,4	35A6
schlechter: Hitze					35,0	38,9	-3,9	38,6	-3,6	35A7
schlechter: Schlechte Luft					25,0	31,5	-6,5	30,9	-5,9	35A8
schlechter: Tabakrauch					25,0	24,1	0,9	24,2	0,9	35A9
<b>Verbesserungen durch...</b>										
gut: in heiterer Gesellschaft					65,0	58,3	6,7	58,9	6,1	35B1
gut: bei leichter Musik					55,0	41,7	13,3	42,8	12,2	35B2
gut: nach Gymnastik					50,0	40,3	9,7	41,1	8,9	35B3
gut: nach dem Schlafen					55,0	40,7	14,3	42,0	13,1	35B4
gut: in frischer Luft					75,0	68,5	6,5	69,1	5,9	35B5
gut: nach Entspannungsübungen					30,0	38,0	-8,0	37,3	-7,3	35B6
gut: nach dem Schwimmen					25,0	20,4	4,6	20,8	4,2	35B7
<b>Krankheitsverlauf</b>										
					06SYM %	ja, Branntwein vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
<b>Krankheitsverlauf, Symptomatik</b>										
32 Äquivalenztyp J/N					25,0	31,9	-6,9	31,4	-6,4	32EQUI
32 Rigordominanztyp J/N					50,0	41,2	8,8	42,0	8,1	32RIGO
32 Tremordominanztyp J/N					25,0	26,9	-1,9	26,7	-1,7	32TREM
Beschwerden seit Diag. schlimmer?					75,0	79,2	-4,2	78,8	-3,8	33BS
Versteifung seit Diagnose besser?					35,0	21,3	13,7	22,5	12,5	33VB
Versteifung seit Diagnose schlimmer?					60,0	56,0	4,0	56,4	3,6	33VS
Zittern seit Diagnose gebessert?					45,0	27,8	17,2	29,2	15,8	33ZB
Zittern seit Diagnose zugenommen?					45,0	51,9	-6,9	63,1	-18,1	33ZS
<b>offene Fragen</b>										
					08OFF Anzahl	ja, Branntwein vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
<b>Verweise auf Ergebnisse offener Fragen</b>										
Anzahl Medikamente heute					2,7	3,0	-0,3	3,0	-0,3	ANZ30H
Angaben zu 31 Ärzten					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ANZ31ARZ
Angaben zu 31 Behandlungen					3,0	3,3	-0,4	3,3	-0,4	ANZ31BEH
Anzahl Medikamente V31					0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	ANZ31SUM
Anzahl verschlechternde Umstände (offene Listen)					0,0	0,2	-0,2	0,2	-0,2	ANZ36OFF
Anzahl verbessernde Umstände (offene Listen)					0,0	0,3	-0,3	0,2	-0,2	ANZ37OFF
Anzahl erwähnenswerte Belastungen (offene Listen)					0,7	0,4	0,3	0,5	0,3	ANZ38OFF
Angaben (offen) zu Krankheitsursachen					6,8	7,0	-0,2	7,0	-0,3	ANZ6
Angaben zu frühsymptomen					3,5	4,2	-0,7	4,1	-0,6	ANZ7
<b>Indexe</b>										
					10NDX Index!	ja, Branntwein vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
<b>Indexvariablen</b>										
In gespannten Verhältnissen gelebt					4,9	4,5	0,4	4,6	0,3	21
Was früher gegessen?					1,6	1,6	-0,1	1,6	-0,1	23
beruflicher Aufstieg2					0,6	0,4	0,1			AUFST

beruflicher Aufstieg				0,8	0,7	0,1	0,7	0,1	UFSTEIG
Vorlaufsymptome & Lebensalter		11 Jr Jahre	ja, Branntwein vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt		
<b>Zusammenhang mit Lebensalter</b>									
Alter: Zum Zeitpunkt der Befragung				70,2	65,6	4,6	66,0	4,2	LA00C
Alter: Berufsaufgabe				59,6	55,4	4,2	55,8	3,8	LA03J
Alter: Diagnose PK				65,2	58,1	7,0	58,7	6,5	LA04J
Alter: Auftreten typ. Pk-Beschwerden				62,2	54,4	7,8	54,9	7,3	LA05J
Alter: Muskelverspannungen				64,3	49,5	14,8	50,5	13,8	LA07AJ
Alter: Gelenk- oder Muskelschmerzen				64,2	48,9	15,3	49,7	14,5	LA07BJ
Alter: Schlafstörungen				60,6	48,3	12,3	46,7	14,0	LA07CJ
Alter: Kopfschmerzen im Hinterkopf				61,8	46,1	15,7	47,2	14,6	LA07DJ
Alter: Nachlassen des Geruchssinns				63,4	52,7	10,7	53,6	9,8	LA07EJ
Alter: Tränen der Augen				64,3	56,4	7,9	57,0	7,2	LA07FJ
Alter: kleinere/unsichere Schrift				66,8	54,8	12,0	55,4	11,5	LA07GJ
Alter: Leiseres Sprechen				68,2	55,9	12,3	57,1	11,1	LA07HJ
Alter: Gedrücktere Stimmung				60,1	52,5	7,6	52,4	7,7	LA07IJ
Alter: deutlicher Anzeichen Vergeßlichkeit				58,3	52,7	5,5	52,2	6,1	LA09J
Alter: Beginn Spiel eines Musikinstrumentes				18,9	17,6	1,3	17,5	1,3	LA16B
Alter: Aufgabe Spiel eines Musikinstrumentes				39,9	36,9	2,9	38,2	1,6	LA16E
Alter: Beginn Rauchen				19,6	23,0	-3,4	18,2	1,4	LA17AJ
Alter: Aufgabe Rauchen				55,1	45,4	9,7	46,6	8,5	LA17EJ
Alter: Beginn trauriger Verstimmungen/Depris				69,0	55,9	13,1	56,7	12,3	LA34AJ
Alter: Ende trauriger Verstimmungen/Depris				74,3	63,4	11,0	63,6	10,7	LA34EJ
<b>Zusammenhang mit Jahr der PK-Diagnose</b>									
Seit wieviel Jahren Parkinson?				4,9	7,3	-2,4	7,1	-2,2	PK03J
Berufsaustritt/Aufgabe J				-4,9	-4,1	-0,9	-4,2	-0,8	PK05J
typische PK-Beschw. (retrospektiv)				-3,7	-3,2	-0,6	-3,2	-0,5	PK07AJ
Zeitl.Zus.Pk: Muskelverspannung				-3,5	-8,0	4,5	-7,5	4,0	PK07BJ
Zeitl.Zus.Pk: Gelenk-/bzw. Muskelschmerzen				-5,8	-9,7	3,9	-9,4	3,6	PK07CJ
Zeitl.Zus.Pk: Schlafstörungen x Jahre vor (-) bzw. nach(+) PK-Di				-9,2	-8,9	-0,3	-11,7	2,5	PK07DJ
Zeitl.Zus.Pk: Kopfschmerzen im Hinterkopf				-11,0	-12,0	1,0	-11,7	0,7	PK07EJ
Zeitl.Zus.Pk: Nachlassen Geruchssinn				-5,0	-5,7	0,7	-5,4	0,4	PK07FJ
Zeitl.Zus.Pk: Tränen der Augen				-2,3	-4,5	2,3	-4,3	2,0	PK07GJ
Zeitl.Zus.Pk: Kleinere (oder unsicherere) Schrift				-0,5	-1,9	1,4	-2,2	1,7	PK07HJ
Zeitl.Zus.Pk: Leiseres Sprechen				0,2	-0,8	1,0	-0,6	0,8	PK07IJ
Zeitl.Zus.Pk: Gedrückte Stimmung				-4,9	-3,6	-1,3	-4,8	-0,2	PK09J
Zeitl.Zus.Pk: deutl. Anz. von Vergeßlichkeit				-9,3	-6,3	-3,0	-7,3	-2,0	PK16BJ
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Musizieren				-47,9	-39,6	-8,3	-41,3	-6,6	PK16EJ
Zeitl.Zus.Pk: Ende Musizieren				-26,9	-20,3	-6,6	-20,3	-6,6	PK17AJ
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Rauchen				-45,8	-33,6	-12,2	-38,0	-7,8	PK17EJ
Zeitl.Zus.Pk: Aufgabe des Rauchens				-10,2	-10,5	0,2	-12,3	2,1	PK34AJ
Zeitl.Zus.Pk: Depressionsbeginn				-0,3	-1,0	0,7	-0,9	0,6	PK34EJ
Zeitl.Zus.Pk: Ende Depressionen				5,0	6,5	-1,5	6,3	-1,3	
<b>Dauer</b>									
Dauer Musizieren				21,0	19,4	1,6	19,6	1,4	DAUR16
Dauer Rauchen				35,6	22,4	13,2	23,3	12,2	DAUR17
Dauer Depressionen				7,3	7,3	0,0	7,6	-0,2	DAUR34