

## Likör vertragen

19C5

allgemeine Angaben		00ALL %	ja, Likör vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
<b>allgemeine Fragen</b>								0
Männerquote (Frauenquote = 100% - Männerquote)			58,6	59,9	-1,3	59,3	-0,7	00B
Anzahl Probanden			29,0	207,0	178,0	236,0	-207,0	01SIGEL
Wert/Code			1,0	0,0	1,0	9,0	-8,0	Value
<b>Lebenseinstellung</b>		01LEB %	ja, Likör vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
<b>Selbsteinschätzung</b>								11
ernst			41,4	42,0	-0,6	42,0	-0,6	11.1
pflichtbewußt			86,2	84,5	1,7	84,8	1,5	11.2
strebsam			58,6	50,7	7,9	51,7	6,9	11.3
gründlich			62,1	54,6	7,5	55,5	6,6	11.4
Empfindsam, "dünnhäutig"			65,5	49,8	15,8	51,7	13,8	11.5
fröhlich			41,4	33,8	7,6	34,8	6,6	11.6
spontan			24,1	19,3	4,8	19,9	4,2	11.7
leichtlebig			3,4	3,4	0,1	3,4	0,1	11.8
humorvoll			24,1	28,5	-4,4	28,0	-3,8	11.9
<b>musikalische Betätigung</b>								12
Instrument gespielt?			34,5	21,7	12,7	27,5	6,9	16A
<b>psychosoziale Faktoren</b>								13
Spannungen: im Beruf			27,6	30,0	-2,4	29,7	-2,1	21BER
Spannungen: in der Familie			62,1	45,4	16,7	47,5	14,6	21FAM
Spannungen: im Freundes/Bekanntkreis			3,4	4,8	-1,4	4,7	-1,2	21FREU
Neigung eigene Gefühle zu unterdrücken			72,4	64,7	7,7	65,7	6,7	22
Depressionsquote			31,0	33,8	-2,8	64,4	-33,4	34JN
<b>Ernährung, Verdauung, Genußmittel</b>		02ERN %	ja, Likör vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
<b>Ernährung allgemein</b>								20
Viel Obst und Rohkost im Jahr. vor Erkrankung			48,3	56,0	-7,8	55,1	-6,8	24
Gerne süße Speisen/Cola/Limo			82,8	79,2	3,5	79,7	3,1	26A
Heißhunger auf Süßes			58,6	48,8	9,8	50,0	8,6	26B
Konnte Mahlzeit auslassen			69,0	64,7	4,2	65,3	3,7	27A
Aß Kleinigkeit zwischen Mahlzeiten			55,2	36,2	18,9	38,6	16,6	27B
Nahrungsgewohnheiten geändert			41,4	33,3	8,0	34,3	7,1	35
<b>Verdauungsbeschwerden</b>								22
Verdauungsbeschwerde Blähungen			34,5	35,3	-0,8	35,2	-0,7	28BLAE
Verdauungsbeschwerde Durchfall			6,9	5,3	1,6	5,5	1,4	28DURC
Verdauungsbeschwerde Verstopfung			62,1	38,6	23,4	41,5	20,5	28VERS
<b>Kaffee/Tee</b>								25
Kaffeetrinker			75,9	66,7	9,2	69,9	6,0	20KAF
Teetrinker			65,5	46,4	19,1	52,0	13,5	20TEE
Anzahl Tassen Kaffee/Tag			2,7	2,4	0,3	2,4	0,3	20KTA
Anzahl Tassen Tee/Tag			1,7	1,3	0,4	1,3	0,4	20TTA
<b>Alkohol</b>								26
Alkohol Verträglichkeitsquote			58,6	64,7	-6,1	68,0	-9,4	19
Wein vertragen			75,9	24,6	51,2	30,9	44,9	19C1
Sekt vertragen			55,2	15,0	40,2	19,9	35,3	19C2
Bier vertragen			51,7	31,4	20,3	33,9	17,8	19C3
Branntwein vertragen			44,8	3,4	41,4	8,5	36,4	19C4
Likör vertragen						12,3		19C5
<b>Rauchen</b>								27
Wie stark geraucht?			37,9	30,4	7,5	0,4	37,6	17S
<b>Konstitution</b>		03KON %	ja, Likör vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
<b>Belastung und Belastbarkeit</b>								32
Erblichkeitsquotient			10,3	13,0	-2,7	12,7	-2,4	10

Wie belastbar früher?					69,0	80,7	-11,7	79,2	-10,3	12A
Wie belastet im Jahrz. vor Parkinson?					65,5	65,7	-0,2	65,7	-0,2	12B
<b>Konstitution, Schlaf</b>										33
Wie groß war Schlafbedarf?					51,7	53,1	-1,4	53,0	-1,2	13
Ich ging gerne früh schlafen.					55,2	44,4	10,7	45,8	9,4	13B
War früh schlafen möglich?					51,7	50,7	1,0	50,9	0,9	13C
<b>Konstitution, sportliche Betätigung</b>										34
Sport, Jogging, Gymn. (Jahrz. vor PK)					34,5	42,5	-8,0	41,5	-7,0	15A
Wie häufig Gymnastik (Jahrz. vor PK)					17,2	24,2	-6,9	23,3	-6,1	15GYM
Wie häufig Jogging (Jahrz. vor PK)					6,9	8,2	-1,3	8,1	-1,2	15JOG
Wie oft Sport (Jahrz. vor PK)					27,6	26,1	1,5	26,3	1,3	15SPO
<b>Einflußfaktoren auf Symptomatik</b>										
					05COP %	ja, Likör vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
<b>Verschlechterungen durch ...</b>										35
schlechter: Überanstrengung					79,3	62,3	17,0	64,4	14,9	36A1
schlechter Aufregung,Sorge					79,3	76,3	3,0	76,7	2,6	36A2
schlechter: Hetze					69,0	66,2	2,8	66,5	2,4	36A3
schlechter: Zu wenig Schlaf					34,5	33,8	0,7	33,9	0,6	36A4
schlechter: Zu wenig Trinken					24,1	10,6	13,5	12,3	11,8	36A5
schlechter: Klimastürze					65,5	55,1	10,4	56,4	9,2	36A6
schlechter: Hitze					48,3	37,2	11,1	38,6	9,7	36A7
schlechter: Schlechte Luft					51,7	28,0	23,7	30,9	20,8	36A8
schlechter: Tabakrauch					41,4	21,7	19,6	24,2	17,2	36A9
<b>Verbesserungen durch...</b>										36
gut: in heiterer Gesellschaft					75,9	56,5	19,3	58,9	17,0	37A
gut: bei leichter Musik					58,6	40,6	18,0	42,8	15,8	37B
gut: nach Gymnastik					41,4	41,1	0,3	41,1	0,3	37C
gut: nach dem Schlafen					55,2	40,1	15,1	42,0	13,2	37D
gut: in frischer Luft					72,4	68,6	3,8	69,1	3,3	37E
gut: nach Entspannungsübungen					51,7	35,3	16,5	37,3	14,4	37F
gut: nach dem Schwimmen					31,0	19,3	11,7	20,8	10,3	37G
<b>Krankheitsverlauf</b>										
					06SYM %	ja, Likör vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
<b>Krankheitsverlauf, Symptomatik</b>										37
32 Äquivalenztyp J/N					27,6	31,9	-4,3	31,4	-3,8	32EQUI
32 Rigordominanztyp J/N					31,0	43,5	-12,4	42,0	-10,9	32RIGO
32 Tremordominanztyp J/N					41,4	24,6	16,7	26,7	14,7	32TREM
Beschwerden seit Diag. schlimmer?					79,3	78,7	0,6	78,8	0,5	33BS
Versteifung seit Diagnose besser?					17,2	23,2	-5,9	22,5	-5,2	33VB
Versteifung seit Diagnose schlimmer?					58,6	56,0	2,6	56,4	2,3	33VS
Zittern seit Diagnose gebessert?					37,9	28,0	9,9	29,2	8,7	33ZB
Zittern seit Diagnose zugenommen?					62,1	49,8	12,3	63,1	-1,1	33ZS
<b>offene Fragen</b>										
					08OFF Anzahl	ja, Likör vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
<b>Verweise auf Ergebnisse offener Fragen</b>										38
Anzahl Medikamente heute					2,8	3,0	-0,3	3,0	-0,3	ANZ30H
Angaben zu 31 Ärzten					0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	NZ31ARZ
Angaben zu 31 Behandlungen					3,3	3,3	0,0	3,3	0,0	NZ31BEH
Anzahl Medikamente V31					0,1	0,2	-0,1	0,2	-0,1	NZ31SUM
Anzahl verschlechternde Umstände (offene Listen)					0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	NZ36OFF
Anzahl verbessernde Umstände (offene Listen)					0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	NZ37OFF
Anzahl erwähnenswerte Belastungen (offene Listen)					0,7	0,4	0,2	0,5	0,2	NZ38OFF
Angaben (offen) zu Krankheitsursachen					6,6	7,0	-0,4	7,0	-0,4	ANZ6
Angaben zu frühsymptomen					3,9	4,2	-0,2	4,1	-0,2	ANZ7
<b>Indexe</b>										
					10NDX Index!	ja, Likör vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
<b>Indexvariablen</b>										39
In gespannten Verhältnissen gelebt					3,8	4,7	-0,9	4,6	-0,8	21
Was früher gegessen?					1,5	1,6	-0,1	1,6	-0,1	23
beruflicher Aufstieg2					0,4	0,5	-0,1			AUFST

beruflicher Aufstieg		0,8	0,7	0,1	0,7	0,1	UFSTEIG	
Vorlaufsymptome & Lebensalter		11 Jr Jahre		ja, Likör vertragen	nein (bzw. k.A.)	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
<b>Zusammenhang mit Lebensalter</b>								41
Alter: Zum Zeitpunkt der Befragung		68,5	65,6	2,8	66,0	2,5	LA00C	
Alter: Berufsaufgabe		56,4	55,7	0,7	55,8	0,6	LA03J	
Alter: Diagnose PK		61,3	58,4	3,0	58,7	2,6	LA04J	
Alter: Auftreten typ. Pk-Beschwerden		58,3	54,4	3,8	54,9	3,4	LA05J	
Alter: Muskelverspannungen		51,6	50,3	1,3	50,5	1,2	LA07AJ	
Alter: Gelenk- oder Muskelschmerzen		51,2	49,5	1,7	49,7	1,6	LA07BJ	
Alter: Schlafstörungen		50,8	49,0	1,8	46,7	4,1	LA07CJ	
Alter: Kopfschmerzen im Hinterkopf		54,9	45,7	9,2	47,2	7,7	LA07DJ	
Alter: Nachlassen des Geruchssinns		58,5	53,0	5,5	53,6	4,9	LA07EJ	
Alter: Tränen der Augen		61,4	56,5	4,9	57,0	4,4	LA07FJ	
Alter: kleinere/unsichere Schrift		60,9	55,0	5,9	55,4	5,6	LA07GJ	
Alter: Leiseres Sprechen		63,1	56,4	6,7	57,1	6,0	LA07HJ	
Alter: Gedrücktere Stimmung		57,8	52,8	5,0	52,4	5,4	LA07IJ	
Alter: deutlicher Anzeichen Vergeßlichkeit		50,6	53,4	-2,8	52,2	-1,6	LA09J	
Alter: Beginn Spiel eines Musikinstrumentes		18,3	17,6	0,7	17,5	0,8	LA16B	
Alter: Aufgabe Spiel eines Musikinstrumentes		43,1	36,0	7,1	38,2	4,9	LA16E	
Alter: Beginn Rauchen		26,0	22,0	4,0	18,2	7,8	LA17AJ	
Alter: Aufgabe Rauchen		53,3	45,4	7,9	46,6	6,7	LA17EJ	
Alter: Beginn trauriger Verstimmungen/Depris		56,9	56,4	0,5	56,7	0,2	LA34AJ	
Alter: Ende trauriger Verstimmungen/Depris		62,8	63,9	-1,2	63,6	-0,9	LA34EJ	
<b>Zusammenhang mit Jahr der PK-Diagnose</b>								42
Seit wieviel Jahren Parkinson?		6,9	7,1	-0,2	7,1	-0,2	PK03J	
Berufsaustritt/Aufgabe J		-5,0	-4,1	-0,9	-4,2	-0,8	PK05J	
typische PK-Beschw. (retrospektiv)		-2,2	-3,3	1,2	-3,2	1,1	PK07AJ	
Zeittl.Zus.Pk: Muskelverspannung		-7,1	-7,8	0,7	-7,5	0,4	PK07BJ	
Zeittl.Zus.Pk: Gelenk-/bzw. Muskelschmerzen		-9,6	-9,5	0,0	-9,4	-0,2	PK07CJ	
Zeittl.Zus.Pk: Schlafstörungen x Jahre vor (-) bzw. nach(+) PK-Di		-8,9	-8,9	0,0	-11,7	2,8	PK07DJ	
Zeittl.Zus.Pk: Kopfschmerzen im Hinterkopf		-7,4	-12,8	5,3	-11,7	4,3	PK07EJ	
Zeittl.Zus.Pk: Nachlassen Geruchssinn		-6,3	-5,6	-0,8	-5,4	-1,0	PK07FJ	
Zeittl.Zus.Pk: Tränen der Augen		-2,0	-4,6	2,6	-4,3	2,3	PK07GJ	
Zeittl.Zus.Pk: Kleinere (oder unsicherere) Schrift		0,4	-2,1	2,6	-2,2	2,6	PK07HJ	
Zeittl.Zus.Pk: Leiseres Sprechen		0,8	-0,8	1,6	-0,6	1,4	PK07IJ	
Zeittl.Zus.Pk: Gedrückte Stimmung		-1,8	-4,0	2,3	-4,8	3,0	PK09J	
Zeittl.Zus.Pk: deutl. Anz. von Vergeßlichkeit		-8,0	-6,4	-1,6	-7,3	-0,8	PK16BJ	
Zeittl.Zus.Pk: Beginn Musizieren		-45,7	-39,5	-6,2	-41,3	-4,4	PK16EJ	
Zeittl.Zus.Pk: Ende Musizieren		-20,9	-21,1	0,2	-20,3	-0,6	PK17AJ	
Zeittl.Zus.Pk: Beginn Rauchen		-36,2	-34,9	-1,2	-38,0	1,8	PK17EJ	
Zeittl.Zus.Pk: Aufgabe des Rauchens		-8,9	-10,7	1,8	-12,3	3,4	PK34AJ	
Zeittl.Zus.Pk: Depressionsbeginn		1,6	-1,3	2,9	-0,9	2,6	PK34EJ	
Zeittl.Zus.Pk: Ende Depressionen		7,5	6,3	1,2	6,3	1,2		
<b>Dauer</b>								43
Dauer Musizieren		24,8	18,4	6,4	19,6	5,2	DAUR16	
Dauer Rauchen		27,3	23,4	3,9	23,3	4,0	DAUR17	
Dauer Depressionen		6,6	7,4	-0,8	7,6	-0,9	DAUR34	