

Kaffeetrinker

20KAF

allgemeine Angaben		00ALL %	Kaffeetrinker	kein Kaffeetrinker / / A n	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
allgemeine Fragen								0
Männerquote (Frauenquote = 100% - Männerquote)			56,3	67,1	-10,9	59,3	-3,1	00B
Anzahl Probanden			160,0	76,0	84,0	236,0	-76,0	th SIGEL
Wert/Code			1,0	0,0	1,0	9,0	-8,0	Value
Lebenseinstellung		01LEB %	Kaffeetrinker	kein Kaffeetrinker / / A n	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Selbsteinschätzung								11
ernst			44,4	36,8	7,5	42,0	2,4	11.1
pflichtbewußt			83,1	88,2	-5,0	84,8	-1,6	11.2
strebsam			55,6	43,4	12,2	51,7	3,9	11.3
gründlich			58,8	48,7	10,1	55,5	3,2	11.4
Empfindsam, "dünnhäutig"			51,9	51,3	0,6	51,7	0,2	11.5
fröhlich			36,9	30,3	6,6	34,8	2,1	11.6
spontan			21,3	17,1	4,1	19,9	1,3	11.7
leichtlebig			5,0	0,0	5,0	3,4	1,6	11.8
humorvoll			28,1	27,6	0,5	28,0	0,2	11.9
musikalische Betätigung								12
Instrument gespielt?			20,6	28,9	-8,3	27,5	-6,9	16A
psychosoziale Faktoren								13
Spannungen: im Beruf			25,6	38,2	-12,5	29,7	-4,0	21BER
Spannungen: in der Familie			47,5	47,4	0,1	47,5	0,0	21FAM
Spannungen: im Freundes/Bekanntenkreis			2,5	9,2	-6,7	4,7	-2,2	21FREU
Neigung eigene Gefühle zu unterdrücken			66,9	63,2	3,7	65,7	1,2	22
Depressionsquote			33,1	34,2	-1,1	64,4	-31,3	34JN
Ernährung, Verdauung, Genußmittel		02ERN %	Kaffeetrinker	kein Kaffeetrinker / / A n	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Ernährung allgemein								20
Viel Obst und Rohkost im Jahr. vor Erkrankung			53,8	57,9	-4,1	55,1	-1,3	24
Gerne süße Speisen/Cola/Limo			80,0	78,9	1,1	79,7	0,3	26A
Heißhunger auf Süßes			53,8	42,1	11,6	50,0	3,8	26B
Konnte Mahlzeit auslassen			65,0	65,8	-0,8	65,3	-0,3	27A
Aß Kleinigkeit zwischen Mahlzeiten			37,5	40,8	-3,3	38,6	-1,1	27B
Nahrungsgewohnheiten geändert			35,0	32,9	2,1	34,3	0,7	35
Verdauungsbeschwerden								22
Verdauungsbeschwerde Blähungen			33,1	39,5	-6,3	35,2	-2,0	28BLAE
Verdauungsbeschwerde Durchfall			4,4	7,9	-3,5	5,5	-1,1	28DURC
Verdauungsbeschwerde Verstopfung			44,4	35,5	8,8	41,5	2,8	28VERS
Kaffee/Tee								25
Kaffeetrinker						69,9		20KAF
Teetrinker			50,0	46,1	3,9	52,0	-2,0	20TEE
Anzahl Tassen Kaffee/Tag			3,5	0,0	3,5	2,4	1,1	20KTA
Anzahl Tassen Tee/Tag			1,2	1,6	-0,5	1,3	-0,2	20TTA
Alkohol								26
Alkohol Verträglichkeitsquote			66,3	59,2	7,0	68,0	-1,8	19
Wein vertragen			33,8	25,0	8,8	30,9	2,8	19C1
Sekt vertragen			23,1	13,2	10,0	19,9	3,2	19C2
Bier vertragen			33,8	34,2	-0,5	33,9	-0,1	19C3
Branntwein vertragen			8,8	7,9	0,9	8,5	0,3	19C4
Likör vertragen			13,8	9,2	4,5	12,3	1,5	19C5
Rauchen								27
Wie stark geraucht?			35,0	23,7	11,3	0,4	34,6	17S
Konstitution		03KON %	Kaffeetrinker	kein Kaffeetrinker / / A n	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Belastung und Belastbarkeit								32
Erblichkeitsquotient			13,8	10,5	3,2	12,7	1,1	10

Wie belastbar früher?		81,9	73,7	8,2	79,2	2,6	12A
Wie belastet im Jahrz. vor Parkinson?		70,6	55,3	15,4	65,7	4,9	12B
Konstitution, Schlaf							
Wie groß war Schlafbedarf?		49,4	60,5	-11,2	53,0	-3,6	13
Ich ging gerne früh schlafen.		46,3	44,7	1,5	45,8	0,5	13B
War früh schlafen möglich?		53,8	44,7	9,0	50,9	2,9	13C
Konstitution, sportliche Betätigung							
Sport, Jogging, Gymn. (Jahrz. vor PK)		42,5	39,5	3,0	41,5	1,0	15A
Wie häufig Gymnastik (Jahrz. vor PK)		26,3	17,1	9,1	23,3	2,9	15GYM
Wie häufig Jogging (Jahrz. vor PK)		6,9	10,5	-3,7	8,1	-1,2	15JOG
Wie oft Sport (Jahrz. vor PK)		24,4	30,3	-5,9	26,3	-1,9	15SPO
Einflußfaktoren auf Symptomatik							
	05 COP %	Kaffeetrinker	kein Kaffeetrinker	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Verschlechterungen durch ...							
schlechter: Überanstrengung		62,5	68,4	-5,9	64,4	-1,9	36A1
schlechter Aufregung,Sorge		75,0	80,3	-5,3	76,7	-1,7	36A2
schlechter: Hetze		65,0	69,7	-4,7	66,5	-1,5	36A3
schlechter: Zu wenig Schlaf		32,5	36,8	-4,3	33,9	-1,4	36A4
schlechter: Zu wenig Trinken		10,0	17,1	-7,1	12,3	-2,3	36A5
schlechter: Klimastürze		56,3	56,6	-0,3	56,4	-0,1	36A6
schlechter: Hitze		34,4	47,4	-13,0	38,6	-4,2	36A7
schlechter: Schlechte Luft		28,1	36,8	-8,7	30,9	-2,8	36A8
schlechter: Tabakrauch		23,8	25,0	-1,3	24,2	-0,4	36A9
Verbesserungen durch...							
gut: in heiterer Gesellschaft		59,4	57,9	1,5	58,9	0,5	37A
gut: bei leichter Musik		41,9	44,7	-2,9	42,8	-0,9	37B
gut: nach Gymnastik		41,3	40,8	0,5	41,1	0,1	37C
gut: nach dem Schlafen		40,6	44,7	-4,1	42,0	-1,3	37D
gut: in frischer Luft		67,5	72,4	-4,9	69,1	-1,6	37E
gut: nach Entspannungsübungen		37,5	36,8	0,7	37,3	0,2	37F
gut: nach dem Schwimmen		19,4	23,7	-4,3	20,8	-1,4	37G
Krankheitsverlauf							
	06SYM %	Kaffeetrinker	kein Kaffeetrinker	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Krankheitsverlauf, Symptomatik							
32 Äquivalenztyp J/N		35,0	23,7	11,3	31,4	3,6	32EQUI
32 Rigordominanztyp J/N		40,0	46,1	-6,1	42,0	-2,0	32RIGO
32 Tremordominanztyp J/N		25,0	30,3	-5,3	26,7	-1,7	32TREM
Beschwerden seit Diag. schlimmer?		76,3	84,2	-8,0	78,8	-2,6	33BS
Versteifung seit Diagnose besser?		19,4	28,9	-9,6	22,5	-3,1	33VB
Versteifung seit Diagnose schlimmer?		54,4	60,5	-6,2	56,4	-2,0	33VS
Zittern seit Diagnose gebessert?		24,4	39,5	-15,1	29,2	-4,9	33ZB
Zittern seit Diagnose zugenommen?		49,4	55,3	-5,9	63,1	-13,8	33ZS
offene Fragen							
	08OFF Anzahl	Kaffeetrinker	kein Kaffeetrinker	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Verweise auf Ergebnisse offener Fragen							
Anzahl Medikamente heute		3,0	3,1	-0,1	3,0	0,0	ANZ30H
Angaben zu 31 Ärzten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ANZ31ARZ
Angaben zu 31 Behandlungen		3,4	3,1	0,3	3,3	0,1	ANZ31BEH
Anzahl Medikamente V31		0,2	0,3	-0,1	0,2	0,0	ANZ31SUM
Anzahl verschlechternde Umstände (offene Listen)		0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	ANZ36OFF
Anzahl verbessernde Umstände (offene Listen)		0,3	0,2	0,1	0,2	0,0	ANZ37OFF
Anzahl erwähnenswerte Belastungen (offene Listen)		0,5	0,4	0,1	0,5	0,0	ANZ38OFF
Angaben (offen) zu Krankheitsursachen		6,8	7,3	-0,4	7,0	-0,2	ANZ6
Angaben zu frühsymptomen		4,1	4,3	-0,3	4,1	0,0	ANZ7
Indexe							
	10NDX Index!	Kaffeetrinker	kein Kaffeetrinker	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Indexvariablen							
In gespannten Verhältnissen gelebt		4,6	4,6	0,0	4,6	0,0	21
Was früher gegessen?		1,6	1,7	-0,1	1,6	0,0	23
beruflicher Aufstieg2		0,5	0,5	0,0			AUFST

beruflicher Aufstieg		0,7	0,7	0,1	0,7	0,0	UFSTEIG
Vorlaufsymptome & Lebensalter		11 Jr Jahre	Kaffeetrinker	kein Kaffeetrinker	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Zusammenhang mit Lebensalter							
41							
Alter: Zum Zeitpunkt der Befragung		66,0	65,8	0,2	66,0	0,1	LA00C
Alter: Berufsaufgabe		55,8	55,8	0,0	55,8	0,0	LA03J
Alter: Diagnose PK		58,5	59,1	-0,5	58,7	-0,2	LA04J
Alter: Auftreten typ. Pk-Beschwerden		55,6	53,2	2,4	54,9	0,8	LA05J
Alter: Muskelverspannungen		50,2	51,0	-0,9	50,5	-0,3	LA07AJ
Alter: Gelenk- oder Muskelschmerzen		48,9	51,4	-2,5	49,7	-0,7	LA07BJ
Alter: Schlafstörungen		51,3	45,0	6,4	46,7	4,7	LA07CJ
Alter: Kopfschmerzen im Hinterkopf		47,6	46,5	1,2	47,2	0,4	LA07DJ
Alter: Nachlassen des Geruchssinns		54,8	51,0	3,8	53,6	1,2	LA07EJ
Alter: Tränen der Augen		56,3	58,4	-2,0	57,0	-0,7	LA07FJ
Alter: kleinere/unsichere Schrift		55,4	56,5	-1,0	55,4	0,1	LA07GJ
Alter: Leiseres Sprechen		56,1	58,7	-2,7	57,1	-1,1	LA07HJ
Alter: Gedrücktere Stimmung		54,0	52,4	1,7	52,4	1,7	LA07IJ
Alter: deutlicher Anzeichen Vergeßlichkeit		54,3	50,1	4,2	52,2	2,1	LA09J
Alter: Beginn Spiel eines Musikinstrumentes		17,6	18,0	-0,4	17,5	0,1	LA16B
Alter: Aufgabe Spiel eines Musikinstrumentes		37,5	36,9	0,6	38,2	-0,7	LA16E
Alter: Beginn Rauchen		22,6	22,6	0,0	18,2	4,4	LA17AJ
Alter: Aufgabe Rauchen		47,4	43,9	3,5	46,6	0,8	LA17EJ
Alter: Beginn trauriger Verstimmungen/Depris		57,2	54,9	2,3	56,7	0,5	LA34AJ
Alter: Ende trauriger Verstimmungen/Depris		64,2	63,1	1,1	63,6	0,5	LA34EJ
Zusammenhang mit Jahr der PK-Diagnose							
42							
Seit wieviel Jahren Parkinson?		7,3	6,7	0,7	7,1	0,2	K_JAHRE
Berufsaustritt/Aufgabe J		-4,4	-3,7	-0,6	-4,2	-0,2	PK03J
typische PK-Beschw. (retrospektiv)		-3,2	-3,3	0,1	-3,2	0,0	PK05J
Zeittl.Zus.Pk: Muskelverspannung		-8,1	-7,0	-1,1	-7,5	-0,6	PK07AJ
Zeittl.Zus.Pk: Gelenk-/bzw. Muskelschmerzen		-10,0	-8,4	-1,7	-9,4	-0,6	PK07BJ
Zeittl.Zus.Pk: Schlafstörungen x Jahre vor (-) bzw. nach(+) PK-Di		-7,0	-12,6	5,6	-11,7	4,7	PK07CJ
Zeittl.Zus.Pk: Kopfschmerzen im Hinterkopf		-11,1	-13,1	2,1	-11,7	0,6	PK07DJ
Zeittl.Zus.Pk: Nachlassen Geruchssinn		-5,3	-6,4	1,1	-5,4	0,1	PK07EJ
Zeittl.Zus.Pk: Tränen der Augen		-5,2	-2,6	-2,6	-4,3	-1,0	PK07FJ
Zeittl.Zus.Pk: Kleinere (oder unsicherere) Schrift		-1,9	-1,5	-0,5	-2,2	0,2	PK07GJ
Zeittl.Zus.Pk: Leiseres Sprechen		-1,2	0,2	-1,4	-0,6	-0,6	PK07HJ
Zeittl.Zus.Pk: Gedrückte Stimmung		-3,6	-4,0	0,4	-4,8	1,2	PK07IJ
Zeittl.Zus.Pk: deutl. Anz. von Vergeßlichkeit		-5,9	-7,9	2,0	-7,3	1,3	PK09J
Zeittl.Zus.Pk: Beginn Musizieren		-40,7	-40,6	0,0	-41,3	0,6	PK16BJ
Zeittl.Zus.Pk: Ende Musizieren		-20,7	-21,7	1,0	-20,3	-0,4	PK16EJ
Zeittl.Zus.Pk: Beginn Rauchen		-33,5	-40,0	6,5	-38,0	4,4	PK17AJ
Zeittl.Zus.Pk: Aufgabe des Rauchens		-9,0	-14,9	5,9	-12,3	3,3	PK17EJ
Zeittl.Zus.Pk: Depressionsbeginn		-0,4	-2,0	1,5	-0,9	0,5	PK34AJ
Zeittl.Zus.Pk: Ende Depressionen		6,5	6,2	0,3	6,3	0,3	PK34EJ
Dauer							
43							
Dauer Musizieren		20,0	19,0	1,0	19,6	0,4	DAUR16
Dauer Rauchen		24,8	21,4	3,4	23,3	1,5	DAUR17
Dauer Depressionen		6,8	8,3	-1,5	7,6	-0,8	DAUR34