

V20B Teetrinker dichotom

20TEE

allgemeine Angaben		00ALL %	Teetrinker	kein Teetrinker/k	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
allgemeine Fragen								0
Männerquote (Frauenquote = 100% - Männerquote)			58,3	61,2	-2,9	59,3	-1,0	00B
Anzahl Probanden			115,0	121,0	-6,0	236,0	-121,0	01SIGEL
Wert/Code			1,0	0,0	1,0	9,0	-8,0	Value
Lebenseinstellung		01LEB %	Teetrinker	kein Teetrinker/k	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Selbsteinschätzung								11
ernst			39,1	44,6	-5,5	42,0	-2,8	11.1
pflichtbewußt			86,1	83,5	2,6	84,8	1,3	11.2
strebsam			54,8	48,8	6,0	51,7	3,1	11.3
gründlich			60,0	51,2	8,8	55,5	4,5	11.4
Empfindsam, "dünnhäutig"			53,9	49,6	4,3	51,7	2,2	11.5
fröhlich			33,0	36,4	-3,3	34,8	-1,7	11.6
spontan			19,1	20,7	-1,5	19,9	-0,8	11.7
leichtlebig			5,2	1,7	3,6	3,4	1,8	11.8
humorvoll			29,6	26,4	3,1	28,0	1,6	11.9
musikalische Betätigung								12
Instrument gespielt?			27,0	19,8	7,1	27,5	-0,6	16A
psychosoziale Faktoren								13
Spannungen: im Beruf			30,4	28,9	1,5	29,7	0,8	21BER
Spannungen: in der Familie			51,3	43,8	7,5	47,5	3,8	21FAM
Spannungen: im Freundes/Bekanntkreis			7,8	1,7	6,2	4,7	3,2	21FREU
Neigung eigene Gefühle zu unterdrücken			64,3	66,9	-2,6	65,7	-1,3	22
Depressionsquote			31,3	35,5	-4,2	64,4	-33,1	34JN
Ernährung, Verdauung, Genußmittel		02ERN %	Teetrinker	kein Teetrinker/k	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Ernährung allgemein								20
Viel Obst und Rohkost im Jahr. vor Erkrankung			63,5	47,1	16,4	55,1	8,4	24
Gerne süße Speisen/Cola/Limo			80,0	79,3	0,7	79,7	0,3	26A
Heißhunger auf Süßes			47,8	52,1	-4,2	50,0	-2,2	26B
Konnte Mahlzeit auslassen			63,5	66,9	-3,5	65,3	-1,8	27A
Aß Kleinigkeit zwischen Mahlzeiten			40,9	36,4	4,5	38,6	2,3	27B
Nahrungsgewohnheiten geändert			39,1	29,8	9,4	34,3	4,8	35
Verdauungsbeschwerden								22
Verdauungsbeschwerde Blähungen			32,2	38,0	-5,8	35,2	-3,0	28BLAE
Verdauungsbeschwerde Durchfall			5,2	5,8	-0,6	5,5	-0,3	28DURC
Verdauungsbeschwerde Verstopfung			43,5	39,7	3,8	41,5	1,9	28VERS
Kaffee/Tee								25
Kaffeetrinker			69,6	66,1	3,4	69,9	-0,3	20KAF
Teetrinker						52,0		20TEE
Anzahl Tassen Kaffee/Tag			2,3	2,5	-0,2	2,4	-0,1	20KTA
Anzahl Tassen Tee/Tag			2,7	0,0	2,7	1,3	1,4	20TTA
Alkohol								26
Alkohol Verträglichkeitsquote			66,1	62,0	4,1	68,0	-1,9	19
Wein vertragen			43,5	19,0	24,5	30,9	12,5	19C1
Sekt vertragen			22,6	17,4	5,3	19,9	2,7	19C2
Bier vertragen			39,1	28,9	10,2	33,9	5,2	19C3
Branntwein vertragen			10,4	6,6	3,8	8,5	2,0	19C4
Likör vertragen			16,5	8,3	8,3	12,3	4,2	19C5
Rauchen								27
Wie stark geraucht?			31,3	31,4	-0,1	0,4	30,9	17S
Konstitution		03KON %	Teetrinker	kein Teetrinker/k	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Belastung und Belastbarkeit								32
Erblichkeitsquotient			10,4	14,9	-4,4	12,7	-2,3	10

Wie belastbar früher?						77,4	81,0	-3,6	79,2	-1,8	12A	
Wie belastet im Jahrz. vor Parkinson?						66,1	65,3	0,8	65,7	0,4	12B	
Konstitution, Schlaf												
Wie groß war Schlafbedarf?						50,4	55,4	-4,9	53,0	-2,5	13	
Ich ging gerne früh schlafen.						43,5	47,9	-4,5	45,8	-2,3	13B	
War früh schlafen möglich?						53,0	48,8	4,3	50,9	2,2	13C	
Konstitution, sportliche Betätigung												
Sport, Jogging, Gymn. (Jahrz. vor PK)						38,3	44,6	-6,4	41,5	-3,3	15A	
Wie häufig Gymnastik (Jahrz. vor PK)						18,3	28,1	-9,8	23,3	-5,0	15GYM	
Wie häufig Jogging (Jahrz. vor PK)						8,7	7,4	1,3	8,1	0,6	15JOG	
Wie oft Sport (Jahrz. vor PK)						23,5	28,9	-5,4	26,3	-2,8	15SPO	
Einflußfaktoren auf Symptomatik												
						05 COP %	Teetrinker	kein Teetrinker/k A	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Verschlechterungen durch ...												
schlechter: Überanstrengung						60,0	68,6	-8,6	64,4	-4,4	36A1	
schlechter Aufregung,Sorge						75,7	77,7	-2,0	76,7	-1,0	36A2	
schlechter: Hetze						61,7	71,1	-9,3	66,5	-4,8	36A3	
schlechter: Zu wenig Schlaf						32,2	35,5	-3,4	33,9	-1,7	36A4	
schlechter: Zu wenig Trinken						13,9	10,7	3,2	12,3	1,6	36A5	
schlechter: Klimastürze						56,5	56,2	0,3	56,4	0,2	36A6	
schlechter: Hitze						33,0	43,8	-10,8	38,6	-5,5	36A7	
schlechter: Schlechte Luft						35,7	26,4	9,2	30,9	4,7	36A8	
schlechter: Tabakrauch						25,2	23,1	2,1	24,2	1,1	36A9	
Verbesserungen durch...												
gut: in heiterer Gesellschaft						58,3	59,5	-1,2	58,9	-0,6	37A	
gut: bei leichter Musik						42,6	43,0	-0,4	42,8	-0,2	37B	
gut: nach Gymnastik						42,6	39,7	2,9	41,1	1,5	37C	
gut: nach dem Schlafen						39,1	44,6	-5,5	42,0	-2,8	37D	
gut: in frischer Luft						66,1	71,9	-5,8	69,1	-3,0	37E	
gut: nach Entspannungsübungen						37,4	37,2	0,2	37,3	0,1	37F	
gut: nach dem Schwimmen						18,3	23,1	-4,9	20,8	-2,5	37G	
Krankheitsverlauf												
						06SYM %	Teetrinker	kein Teetrinker/k A	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Krankheitsverlauf, Symptomatik												
32 Äquivalenztyp J/N						31,3	31,4	-0,1	31,4	-0,1	32EQUI	
32 Rigordominanztyp J/N						42,6	41,3	1,3	42,0	0,7	32RIGO	
32 Tremordominanztyp J/N						26,1	27,3	-1,2	26,7	-0,6	32TREM	
Beschwerden seit Diag. schlimmer?						80,0	77,7	2,3	78,8	1,2	33BS	
Versteifung seit Diagnose besser?						22,6	22,3	0,3	22,5	0,1	33VB	
Versteifung seit Diagnose schlimmer?						56,5	56,2	0,3	56,4	0,2	33VS	
Zittern seit Diagnose gebessert?						34,8	24,0	10,8	29,2	5,5	33ZB	
Zittern seit Diagnose zugenommen?						53,9	48,8	5,2	63,1	-9,2	33ZS	
offene Fragen												
						08OFF Anzahl	Teetrinker	kein Teetrinker/k A	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Verweise auf Ergebnisse offener Fragen												
Anzahl Medikamente heute						3,0	3,0	0,1	3,0	0,0	ANZ30H	
Angaben zu 31 Ärzten						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ANZ31ARZ	
Angaben zu 31 Behandlungen						3,3	3,3	0,0	3,3	0,0	ANZ31BEH	
Anzahl Medikamente V31						0,1	0,3	-0,1	0,2	-0,1	ANZ31SUM	
Anzahl verschlechternde Umstände (offene Listen)						0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	ANZ36OFF	
Anzahl verbessernde Umstände (offene Listen)						0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	ANZ37OFF	
Anzahl erwähnenswerte Belastungen (offene Listen)						0,5	0,4	0,1	0,5	0,1	ANZ38OFF	
Angaben (offen) zu Krankheitsursachen						7,0	6,9	0,1	7,0	0,0	ANZ6	
Angaben zu frühsymptomen						4,2	4,1	0,1	4,1	0,1	ANZ7	
Indexe												
						10NDX Index!	Teetrinker	kein Teetrinker/k A	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Indexvariablen												
In gespannten Verhältnissen gelebt						4,4	4,7	-0,3	4,6	-0,2	21	
Was früher gegessen?						1,6	1,6	-0,1	1,6	0,0	23	
beruflicher Aufstieg2						0,5	0,4	0,1			AUFST	

beruflicher Aufstieg				0,8	0,6	0,2	0,7	0,1	UFSTEIG
Vorlaufsymptome & Lebensalter		11 Jr Jahre	Teetrinker	kein Teetrinker/k	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt		
Zusammenhang mit Lebensalter									41
Alter: Zum Zeitpunkt der Befragung			66,2	65,8	0,4	66,0	0,2		LA00C
Alter: Berufsaufgabe			54,9	56,6	-1,7	55,8	-0,8		LA03J
Alter: Diagnose PK			59,3	58,2	1,2	58,7	0,6		LA04J
Alter: Auftreten typ. Pk-Beschwerden			55,1	54,7	0,4	54,9	0,2		LA05J
Alter: Muskelverspannungen			50,8	50,1	0,6	50,5	0,3		LA07AJ
Alter: Gelenk- oder Muskelschmerzen			47,7	51,2	-3,5	49,7	-2,0		LA07BJ
Alter: Schlafstörungen			49,3	49,0	0,3	46,7	2,7		LA07CJ
Alter: Kopfschmerzen im Hinterkopf			47,1	47,3	-0,1	47,2	-0,1		LA07DJ
Alter: Nachlassen des Geruchssinns			54,4	52,9	1,5	53,6	0,9		LA07EJ
Alter: Tränen der Augen			55,3	58,4	-3,0	57,0	-1,7		LA07FJ
Alter: kleinere/unsichere Schrift			56,3	55,4	0,9	55,4	1,0		LA07GJ
Alter: Leiseres Sprechen			57,7	56,6	1,2	57,1	0,6		LA07HJ
Alter: Gedrücktere Stimmung			52,5	54,3	-1,8	52,4	0,2		LA07IJ
Alter: deutlicher Anzeichen Vergeßlichkeit			51,5	54,7	-3,2	52,2	-0,7		LA09J
Alter: Beginn Spiel eines Musikinstrumentes			19,0	16,0	3,0	17,5	1,5		LA16B
Alter: Aufgabe Spiel eines Musikinstrumentes			43,5	29,3	14,3	38,2	5,3		LA16E
Alter: Beginn Rauchen			22,1	23,0	-0,9	18,2	3,9		LA17AJ
Alter: Aufgabe Rauchen			44,6	48,4	-3,9	46,6	-2,0		LA17EJ
Alter: Beginn trauriger Verstimmungen/Depris			56,4	56,5	-0,1	56,7	-0,3		LA34AJ
Alter: Ende trauriger Verstimmungen/Depris			65,5	62,4	3,1	63,6	1,8		LA34EJ
Zusammenhang mit Jahr der PK-Diagnose									42
Seit wieviel Jahren Parkinson?			6,7	7,5	-0,8	7,1	-0,4		PK03K
Berufsaustritt/Aufgabe J			-5,1	-3,2	-1,9	-4,2	-0,9		PK03J
typische PK-Beschw. (retrospektiv)			-3,0	-3,3	0,3	-3,2	0,2		PK05J
Zeitl.Zus.Pk: Muskelverspannung			-8,1	-7,3	-0,7	-7,5	-0,6		PK07AJ
Zeitl.Zus.Pk: Gelenk-/bzw. Muskelschmerzen			-10,4	-8,9	-1,5	-9,4	-1,0		PK07BJ
Zeitl.Zus.Pk: Schlafstörungen x Jahre vor (-) bzw. nach(+) PK-Di			-9,1	-8,7	-0,4	-11,7	2,6		PK07CJ
Zeitl.Zus.Pk: Kopfschmerzen im Hinterkopf			-13,2	-10,6	-2,6	-11,7	-1,5		PK07DJ
Zeitl.Zus.Pk: Nachlassen Geruchssinn			-5,3	-5,9	0,6	-5,4	0,1		PK07EJ
Zeitl.Zus.Pk: Tränen der Augen			-6,2	-2,9	-3,3	-4,3	-1,9		PK07FJ
Zeitl.Zus.Pk: Kleinere (oder unsicherere) Schrift			-1,3	-2,1	0,8	-2,2	0,8		PK07GJ
Zeitl.Zus.Pk: Leiseres Sprechen			-0,3	-1,0	0,7	-0,6	0,3		PK07HJ
Zeitl.Zus.Pk: Gedrückte Stimmung			-3,8	-3,7	-0,2	-4,8	0,9		PK07IJ
Zeitl.Zus.Pk: deutl. Anz. von Vergeßlichkeit			-8,3	-4,9	-3,4	-7,3	-1,0		PK09J
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Musizieren			-40,5	-40,9	0,4	-41,3	0,8		PK16BJ
Zeitl.Zus.Pk: Ende Musizieren			-16,0	-27,7	11,7	-20,3	4,3		PK16EJ
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Rauchen			-35,3	-35,0	-0,3	-38,0	2,7		PK17AJ
Zeitl.Zus.Pk: Aufgabe des Rauchens			-12,3	-8,7	-3,7	-12,3	0,0		PK17EJ
Zeitl.Zus.Pk: Depressionsbeginn			-2,7	0,5	-3,2	-0,9	-1,8		PK34AJ
Zeitl.Zus.Pk: Ende Depressionen			6,5	6,3	0,2	6,3	0,2		PK34EJ
Dauer									43
Dauer Musizieren			24,5	13,2	11,3	19,6	4,9		DAUR16
Dauer Rauchen			22,4	25,4	-3,0	23,3	-0,9		DAUR17
Dauer Depressionen			8,8	6,1	2,7	7,6	1,2		DAUR34