

Gerne süße Speisen/Cola/Limo

26A

allgemeine Angaben		00ALL %	ja gerne süße Speisen u. Getränke	nein bzw. k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
allgemeine Fragen								0
Männerquote (Frauenquote = 100% - Männerquote)			59,0	62,5	-3,5	59,3	-0,3	00B
Anzahl Probanden			188,0	48,0	140,0	236,0	-48,0	01 SIGEL
Wert/Code			1,0	0,0	1,0	9,0	-8,0	Value
Lebenseinstellung		01LEB %	ja gerne süße Speisen u. Getränke	nein bzw. k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Selbsteinschätzung								11
ernst			43,6	35,4	8,2	42,0	1,7	11.1
pflichtbewußt			85,6	81,3	4,4	84,8	0,9	11.2
strebsam			52,7	47,9	4,7	51,7	1,0	11.3
gründlich			55,3	56,3	-0,9	55,5	-0,2	11.4
Empfindsam, "dünnhäutig"			54,3	41,7	12,6	51,7	2,6	11.5
fröhlich			33,0	41,7	-8,7	34,8	-1,8	11.6
spontan			22,3	10,4	11,9	19,9	2,4	11.7
leichtlebig			3,7	2,1	1,6	3,4	0,3	11.8
humorvoll			26,1	35,4	-9,4	28,0	-1,9	11.9
musikalische Betätigung								12
Instrument gespielt?			22,3	27,1	-4,7	27,5	-5,2	16A
psychosoziale Faktoren								13
Spannungen: im Beruf			31,4	22,9	8,5	29,7	1,7	21BER
Spannungen: in der Familie			50,5	35,4	15,1	47,5	3,1	21FAM
Spannungen: im Freundes/Bekanntkreis			4,3	6,3	-2,0	4,7	-0,4	21FREU
Neigung eigene Gefühle zu unterdrücken			67,6	58,3	9,2	65,7	1,9	22
Depressionsquote			33,5	33,3	0,2	64,4	-30,9	34JN
Ernährung, Verdauung, Genußmittel		02ERN %	ja gerne süße Speisen u. Getränke	nein bzw. k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Ernährung allgemein								20
Viel Obst und Rohkost im Jahr. vor Erkrankung			56,4	50,0	6,4	55,1	1,3	24
Gerne süße Speisen/Cola/Limo						79,7		26A
Heißhunger auf Süßes			60,1	10,4	49,7	50,0	10,1	26B
Konnte Mahlzeit auslassen			67,0	58,3	8,7	65,3	1,8	27A
Aß Kleinigkeit zwischen Mahlzeiten			42,0	25,0	17,0	38,6	3,5	27B
Nahrungsgewohnheiten geändert			34,0	35,4	-1,4	34,3	-0,3	35
Verdauungsbeschwerden								22
Verdauungsbeschwerde Blähungen			37,2	27,1	10,2	35,2	2,1	28BLAE
Verdauungsbeschwerde Durchfall			4,8	8,3	-3,5	5,5	-0,7	28DURC
Verdauungsbeschwerde Verstopfung			44,7	29,2	15,5	41,5	3,2	28VERS
Kaffee/Tee								25
Kaffeetrinker			68,1	66,7	1,4	69,9	-1,8	20KAF
Teetrinker			48,9	47,9	1,0	52,0	-3,1	20TEE
Anzahl Tassen Kaffee/Tag			2,4	2,5	-0,1	2,4	0,0	20KTA
Anzahl Tassen Tee/Tag			1,3	1,4	-0,1	1,3	0,0	20TTA
Alkohol								26
Alkohol Verträglichkeitsquote			63,8	64,6	-0,8	68,0	-4,2	19
Wein vertragen			33,0	22,9	10,1	30,9	2,0	19C1
Sekt vertragen			20,7	16,7	4,1	19,9	0,8	19C2
Bier vertragen			34,6	31,3	3,3	33,9	0,7	19C3
Branntwein vertragen			9,0	6,3	2,8	8,5	0,6	19C4
Likör vertragen			12,8	10,4	2,3	12,3	0,5	19C5
Rauchen								27
Wie stark geraucht?			28,2	43,8	-15,6	0,4	27,8	17S
Konstitution		03KON %	ja gerne süße Speisen u. Getränke	nein bzw. k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Belastung und Belastbarkeit								32
Erblichkeitsquotient			12,8	12,5	0,3	12,7	0,1	10

Wie belastbar früher?		79,3	79,2	0,1	79,2	0,0	12A
Wie belastet im Jahrz. vor Parkinson?		68,6	54,2	14,5	65,7	2,9	12B
Konstitution, Schlaf							
Wie groß war Schlafbedarf?		55,3	43,8	11,6	53,0	2,3	13
Ich ging gerne früh schlafen.		45,7	45,8	-0,1	45,8	0,0	13B
War früh schlafen möglich?		50,0	54,2	-4,2	50,9	-0,9	13C
Konstitution, sportliche Betätigung							
Sport, Jogging, Gymn. (Jahrz. vor PK)		42,0	39,6	2,4	41,5	0,5	15A
Wie häufig Gymnastik (Jahrz. vor PK)		24,5	18,8	5,7	23,3	1,2	15GYM
Wie häufig Jogging (Jahrz. vor PK)		8,0	8,3	-0,4	8,1	-0,1	15JOG
Wie oft Sport (Jahrz. vor PK)		26,6	25,0	1,6	26,3	0,3	15SPO
Einflußfaktoren auf Symptomatik							
	05COP %	ja gerne süße Speisen u. Getränke	nein bzw. k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Verschlechterungen durch ...							
schlechter: Überanstrengung		66,0	58,3	7,6	64,4	1,5	36A1
schlechter Aufregung,Sorge		73,9	87,5	-13,6	76,7	-2,8	36A2
schlechter: Hetze		67,6	62,5	5,1	66,5	1,0	36A3
schlechter: Zu wenig Schlaf		33,0	37,5	-4,5	33,9	-0,9	36A4
schlechter: Zu wenig Trinken		12,8	10,4	2,3	12,3	0,5	36A5
schlechter: Klimastürze		55,9	58,3	-2,5	56,4	-0,5	36A6
schlechter: Hitze		38,3	39,6	-1,3	38,6	-0,3	36A7
schlechter: Schlechte Luft		30,9	31,3	-0,4	30,9	-0,1	36A8
schlechter: Tabakrauch		26,6	14,6	12,0	24,2	2,4	36A9
Verbesserungen durch...							
gut: in heiterer Gesellschaft		60,1	54,2	5,9	58,9	1,2	37A
gut: bei leichter Musik		42,6	43,8	-1,2	42,8	-0,2	37B
gut: nach Gymnastik		38,8	50,0	-11,2	41,1	-2,3	37C
gut: nach dem Schlafen		44,1	33,3	10,8	42,0	2,2	37D
gut: in frischer Luft		68,6	70,8	-2,2	69,1	-0,5	37E
gut: nach Entspannungsübungen		35,1	45,8	-10,7	37,3	-2,2	37F
gut: nach dem Schwimmen		20,7	20,8	-0,1	20,8	0,0	37G
Krankheitsverlauf							
	06SYM %	ja gerne süße Speisen u. Getränke	nein bzw. k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Krankheitsverlauf, Symptomatik							
32 Äquivalenztyp J/N		28,7	41,7	-12,9	31,4	-2,6	32EQUI
32 Rigordominanztyp J/N		46,3	25,0	21,3	42,0	4,3	32RIGO
32 Tremordominanztyp J/N		25,0	33,3	-8,3	26,7	-1,7	32TREM
Beschwerden seit Diag. schlimmer?		78,7	79,2	-0,4	78,8	-0,1	33BS
Versteifung seit Diagnose besser?		21,3	27,1	-5,8	22,5	-1,2	33VB
Versteifung seit Diagnose schlimmer?		56,9	54,2	2,7	56,4	0,6	33VS
Zittern seit Diagnose gebessert?		28,7	31,3	-2,5	29,2	-0,5	33ZB
Zittern seit Diagnose zugenommen?		46,8	68,8	-21,9	63,1	-16,3	33ZS
offene Fragen							
	08OFF Anzahl	ja gerne süße Speisen u. Getränke	nein bzw. k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Verweise auf Ergebnisse offener Fragen							
Anzahl Medikamente heute		3,0	2,9	0,1	3,0	0,0	ANZ30H
Angaben zu 31 Ärzten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ANZ31ARZ
Angaben zu 31 Behandlungen		3,3	3,2	0,1	3,3	0,0	ANZ31BEH
Anzahl Medikamente V31		0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	ANZ31SUM
Anzahl verschlechternde Umstände (offene Listen)		0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	ANZ36OFF
Anzahl verbessernde Umstände (offene Listen)		0,3	0,1	0,1	0,2	0,0	ANZ37OFF
Anzahl erwähnenswerte Belastungen (offene Listen)		0,4	0,5	-0,1	0,5	0,0	ANZ38OFF
Angaben (offen) zu Krankheitsursachen		7,2	6,3	0,9	7,0	0,2	ANZ6
Angaben zu frühsymptomen		4,1	4,5	-0,4	4,1	0,0	ANZ7
Indexe							
	10NDX Index!	ja gerne süße Speisen u. Getränke	nein bzw. k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Indexvariablen							
In gespannten Verhältnissen gelebt		4,6	4,6	-0,1	4,6	0,0	21
Was früher gegessen?		1,6	1,5	0,2	1,6	0,0	23
beruflicher Aufstieg2		0,4	0,5	-0,1			AUFST

beruflicher Aufstieg		0,7	1,0	-0,3	0,7	-0,1	UFSTEIG	
Vorlaufsymptome & Lebensalter		11 Jr Jahre	ja gerne süße Speisen u. Getränke	nein bzw. k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Zusammenhang mit Lebensalter								41
Alter: Zum Zeitpunkt der Befragung		65,8	66,4	-0,6	66,0	-0,1	LA00C	
Alter: Berufsaufgabe		55,3	57,9	-2,7	55,8	-0,5	LA03J	
Alter: Diagnose PK		58,5	59,5	-1,0	58,7	-0,2	LA04J	
Alter: Auftreten typ. Pk-Beschwerden		54,7	55,5	-0,8	54,9	-0,1	LA05J	
Alter: Muskelverspannungen		49,2	57,4	-8,2	50,5	-1,3	LA07AJ	
Alter: Gelenk- oder Muskelschmerzen		49,6	50,2	-0,6	49,7	-0,1	LA07BJ	
Alter: Schlafstörungen		49,3	48,9	0,4	46,7	2,6	LA07CJ	
Alter: Kopfschmerzen im Hinterkopf		47,2	47,4	-0,2	47,2	0,0	LA07DJ	
Alter: Nachlassen des Geruchssinns		53,2	55,4	-2,2	53,6	-0,4	LA07EJ	
Alter: Tränen der Augen		55,9	60,5	-4,6	57,0	-1,1	LA07FJ	
Alter: kleinere/unsichere Schrift		55,2	58,2	-2,9	55,4	-0,1	LA07GJ	
Alter: Leiseres Sprechen		55,9	61,7	-5,7	57,1	-1,2	LA07HJ	
Alter: Gedrücktere Stimmung		54,1	50,3	3,8	52,4	1,8	LA07IJ	
Alter: deutlicher Anzeichen Vergeßlichkeit		52,9	53,7	-0,8	52,2	0,8	LA09J	
Alter: Beginn Spiel eines Musikinstrumentes		18,1	16,4	1,8	17,5	0,6	LA16B	
Alter: Aufgabe Spiel eines Musikinstrumentes		38,5	33,5	4,9	38,2	0,2	LA16E	
Alter: Beginn Rauchen		23,7	19,7	4,0	18,2	5,5	LA17AJ	
Alter: Aufgabe Rauchen		46,5	46,7	-0,2	46,6	-0,1	LA17EJ	
Alter: Beginn trauriger Verstimmungen/Depris		56,4	56,6	-0,2	56,7	-0,3	LA34AJ	
Alter: Ende trauriger Verstimmungen/Depris		63,9	63,3	0,7	63,6	0,3	LA34EJ	
Zusammenhang mit Jahr der PK-Diagnose								42
Seit wieviel Jahren Parkinson?		7,2	6,9	0,3	7,1	0,1	PK03J	
Berufsaustritt/Aufgabe J		-4,3	-3,7	-0,6	-4,2	-0,1	PK05J	
typische PK-Beschw. (retrospektiv)		-3,2	-3,1	-0,1	-3,2	0,0	PK07AJ	
Zeitl.Zus.Pk: Muskelverspannung		-8,5	-3,3	-5,2	-7,5	-1,0	PK07BJ	
Zeitl.Zus.Pk: Gelenk-/bzw. Muskelschmerzen		-10,0	-7,5	-2,4	-9,4	-0,6	PK07CJ	
Zeitl.Zus.Pk: Schlafstörungen x Jahre vor (-) bzw. nach(+) PK-Di		-9,2	-8,0	-1,2	-11,7	2,5	PK07DJ	
Zeitl.Zus.Pk: Kopfschmerzen im Hinterkopf		-11,8	-12,1	0,3	-11,7	-0,1	PK07EJ	
Zeitl.Zus.Pk: Nachlassen Geruchssinn		-5,5	-6,4	0,9	-5,4	-0,1	PK07FJ	
Zeitl.Zus.Pk: Tränen der Augen		-4,7	-3,3	-1,4	-4,3	-0,4	PK07GJ	
Zeitl.Zus.Pk: Kleinere (oder unsicherere) Schrift		-1,8	-1,6	-0,3	-2,2	0,4	PK07HJ	
Zeitl.Zus.Pk: Leiseres Sprechen		-1,2	1,5	-2,7	-0,6	-0,6	PK07IJ	
Zeitl.Zus.Pk: Gedrückte Stimmung		-3,3	-5,4	2,1	-4,8	1,4	PK09J	
Zeitl.Zus.Pk: deutl. Anz. von Vergeßlichkeit		-6,0	-8,1	2,1	-7,3	1,3	PK16BJ	
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Musizieren		-39,5	-44,5	5,0	-41,3	1,8	PK16EJ	
Zeitl.Zus.Pk: Ende Musizieren		-19,2	-27,3	8,1	-20,3	1,1	PK17AJ	
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Rauchen		-34,0	-37,9	3,8	-38,0	3,9	PK17EJ	
Zeitl.Zus.Pk: Aufgabe des Rauchens		-10,3	-10,9	0,6	-12,3	2,1	PK34AJ	
Zeitl.Zus.Pk: Depressionsbeginn		-1,2	-0,3	-0,9	-0,9	-0,2	PK34EJ	
Zeitl.Zus.Pk: Ende Depressionen		6,4	6,4	0,0	6,3	0,2		
Dauer								43
Dauer Musizieren		20,3	17,2	3,2	19,6	0,7	DAUR16	
Dauer Rauchen		22,8	27,0	-4,2	23,3	-0,5	DAUR17	
Dauer Depressionen		7,6	6,1	1,6	7,6	0,1	DAUR34	