

Heißhunger auf Süßes

26B

allgemeine Angaben		00ALL %	ja, Heißhunger auf Süßes	nein / k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
allgemeine Fragen								0
Männerquote (Frauenquote = 100% - Männerquote)			60,2	59,3	0,8	59,3	0,9	00B
Anzahl Probanden			118,0	118,0	0,0	236,0	-118,0	01SIGEL
Wert/Code			1,0	0,0	1,0	9,0	-8,0	Value
Lebenseinstellung		01LEB %	ja, Heißhunger auf Süßes	nein / k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Selbsteinschätzung								11
ernst			41,5	42,4	-0,8	42,0	-0,4	11.1
pflichtbewußt			82,2	87,3	-5,1	84,8	-2,5	11.2
strebsam			51,7	51,7	0,0	51,7	0,0	11.3
gründlich			61,9	49,2	12,7	55,5	6,4	11.4
Empfindsam, "dünnhäutig"			61,9	41,5	20,3	51,7	10,2	11.5
fröhlich			39,0	30,5	8,5	34,8	4,2	11.6
spontan			22,9	16,9	5,9	19,9	3,0	11.7
leichtlebig			5,9	0,8	5,1	3,4	2,5	11.8
humorvoll			30,5	25,4	5,1	28,0	2,5	11.9
musikalische Betätigung								12
Instrument gespielt?			23,7	22,9	0,8	27,5	-3,8	16A
psychosoziale Faktoren								13
Spannungen: im Beruf			33,9	25,4	8,5	29,7	4,2	21BER
Spannungen: in der Familie			55,1	39,8	15,3	47,5	7,6	21FAM
Spannungen: im Freundes/Bekanntkreis			4,2	5,1	-0,8	4,7	-0,4	21FREU
Neigung eigene Gefühle zu unterdrücken			71,2	60,2	11,0	65,7	5,5	22
Depressionsquote			33,9	33,1	0,8	64,4	-30,5	34JN
Ernährung, Verdauung, Genußmittel		02ERN %	ja, Heißhunger auf Süßes	nein / k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Ernährung allgemein								20
Viel Obst und Rohkost im Jahr. vor Erkrankung			54,2	55,9	-1,7	55,1	-0,8	24
Gerne süße Speisen/Cola/Limo			95,8	63,6	32,2	79,7	16,1	26A
Heißhunger auf Süßes						50,0		26B
Konnte Mahlzeit auslassen			69,5	61,0	8,5	65,3	4,2	27A
Aß Kleinigkeit zwischen Mahlzeiten			50,0	27,1	22,9	38,6	11,4	27B
Nahrungsgewohnheiten geändert			33,9	34,7	-0,8	34,3	-0,4	35
Verdauungsbeschwerden								22
Verdauungsbeschwerde Blähungen			36,4	33,9	2,5	35,2	1,3	28BLAE
Verdauungsbeschwerde Durchfall			4,2	6,8	-2,5	5,5	-1,3	28DURC
Verdauungsbeschwerde Verstopfung			47,5	35,6	11,9	41,5	5,9	28VERS
Kaffee/Tee								25
Kaffeetrinker			72,9	62,7	10,2	69,9	3,0	20KAF
Teetrinker			46,6	50,8	-4,2	52,0	-5,4	20TEE
Anzahl Tassen Kaffee/Tag			2,6	2,2	0,4	2,4	0,2	20KTA
Anzahl Tassen Tee/Tag			1,2	1,4	-0,2	1,3	-0,1	20TTA
Alkohol								26
Alkohol Verträglichkeitsquote			64,4	63,6	0,8	68,0	-3,6	19
Wein vertragen			33,1	28,8	4,2	30,9	2,1	19C1
Sekt vertragen			22,9	16,9	5,9	19,9	3,0	19C2
Bier vertragen			36,4	31,4	5,1	33,9	2,5	19C3
Branntwein vertragen			11,0	5,9	5,1	8,5	2,5	19C4
Likör vertragen			14,4	10,2	4,2	12,3	2,1	19C5
Rauchen								27
Wie stark geraucht?			32,2	30,5	1,7	0,4	31,8	17S
Konstitution		03KON %	ja, Heißhunger auf Süßes	nein / k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Belastung und Belastbarkeit								32
Erblichkeitsquotient			15,3	10,2	5,1	12,7	2,6	10

Wie belastbar früher?						76,3	82,2	-5,9	79,2	-3,0	12A	
Wie belastet im Jahrz. vor Parkinson?						72,0	59,3	12,7	65,7	6,4	12B	
Konstitution, Schlaf											33	
Wie groß war Schlafbedarf?						55,9	50,0	5,9	53,0	3,0	13	
Ich ging gerne früh schlafen.						44,9	46,6	-1,7	45,8	-0,8	13B	
War früh schlafen möglich?						49,2	52,5	-3,4	50,9	-1,7	13C	
Konstitution, sportliche Betätigung											34	
Sport, Jogging, Gymn. (Jahrz. vor PK)						39,0	44,1	-5,1	41,5	-2,5	15A	
Wie häufig Gymnastik (Jahrz. vor PK)						25,4	21,2	4,2	23,3	2,1	15GYM	
Wie häufig Jogging (Jahrz. vor PK)						6,8	9,3	-2,5	8,1	-1,3	15JOG	
Wie oft Sport (Jahrz. vor PK)						26,3	26,3	0,0	26,3	0,0	15SPO	
Einflußfaktoren auf Symptomatik												
						05COP %	ja, Heißhunger auf Süßes	nein / k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Verschlechterungen durch ...											35	
schlechter: Überanstrengung						66,1	62,7	3,4	64,4	1,7	36A1	
schlechter Aufregung,Sorge						77,1	76,3	0,8	76,7	0,4	36A2	
schlechter: Hetze						66,1	66,9	-0,8	66,5	-0,4	36A3	
schlechter: Zu wenig Schlaf						32,2	35,6	-3,4	33,9	-1,7	36A4	
schlechter: Zu wenig Trinken						12,7	11,9	0,8	12,3	0,4	36A5	
schlechter: Klimastürze						59,3	53,4	5,9	56,4	3,0	36A6	
schlechter: Hitze						37,3	39,8	-2,5	38,6	-1,3	36A7	
schlechter: Schlechte Luft						28,0	33,9	-5,9	30,9	-3,0	36A8	
schlechter: Tabakrauch						27,1	21,2	5,9	24,2	3,0	36A9	
Verbesserungen durch...											36	
gut: in heiterer Gesellschaft						63,6	54,2	9,3	58,9	4,7	37A	
gut: bei leichter Musik						43,2	42,4	0,8	42,8	0,4	37B	
gut: nach Gymnastik						39,8	42,4	-2,5	41,1	-1,3	37C	
gut: nach dem Schlafen						43,2	40,7	2,5	42,0	1,3	37D	
gut: in frischer Luft						68,6	69,5	-0,8	69,1	-0,4	37E	
gut: nach Entspannungsübungen						32,2	42,4	-10,2	37,3	-5,1	37F	
gut: nach dem Schwimmen						22,9	18,6	4,2	20,8	2,1	37G	
Krankheitsverlauf												
						06SYM %	ja, Heißhunger auf Süßes	nein / k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Krankheitsverlauf, Symptomatik											37	
32 Äquivalenztyp J/N						30,5	32,2	-1,7	31,4	-0,9	32EQUI	
32 Rigordominanztyp J/N						48,3	35,6	12,7	42,0	6,4	32RIGO	
32 Tremordominanztyp J/N						21,2	32,2	-11,0	26,7	-5,5	32TREM	
Beschwerden seit Diag. schlimmer?						75,4	82,2	-6,8	78,8	-3,4	33BS	
Versteifung seit Diagnose besser?						18,6	26,3	-7,6	22,5	-3,8	33VB	
Versteifung seit Diagnose schlimmer?						56,8	55,9	0,8	56,4	0,4	33VS	
Zittern seit Diagnose gebessert?						24,6	33,9	-9,3	29,2	-4,7	33ZB	
Zittern seit Diagnose zugenommen?						42,4	60,2	-17,8	63,1	-20,8	33ZS	
offene Fragen												
						08OFF Anzahl	ja, Heißhunger auf Süßes	nein / k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Verweise auf Ergebnisse offener Fragen											38	
Anzahl Medikamente heute						3,1	2,9	0,2	3,0	0,1	ANZ30H	
Angaben zu 31 Ärzten						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ANZ31ARZ	
Angaben zu 31 Behandlungen						3,5	3,2	0,3	3,3	0,2	ANZ31BEH	
Anzahl Medikamente V31						0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	ANZ31SUM	
Anzahl verschlechternde Umstände (offene Listen)						0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	ANZ36OFF	
Anzahl verbessernde Umstände (offene Listen)						0,3	0,2	0,1	0,2	0,0	ANZ37OFF	
Anzahl erwähnenswerte Belastungen (offene Listen)						0,4	0,5	-0,1	0,5	0,0	ANZ38OFF	
Angaben (offen) zu Krankheitsursachen						7,4	6,6	0,8	7,0	0,4	ANZ6	
Angaben zu frühsymptomen						4,2	4,1	0,2	4,1	0,1	ANZ7	
Indexe												
						10NDX Index!	ja, Heißhunger auf Süßes	nein / k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Indexvariablen											39	
In gespannten Verhältnissen gelebt						4,4	4,7	-0,2	4,6	-0,1	21	
Was früher gegessen?						1,6	1,6	0,0	1,6	0,0	23	
beruflicher Aufstieg2						0,4	0,5	-0,1			AUFST	

beruflicher Aufstieg				0,6	0,8	-0,2	0,7	-0,1	UFSTEIG
Vorlaufsymptome & Lebensalter		11 Jr	ja, Heißhunger auf Süßes	nein / k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt		
Zusammenhang mit Lebensalter									41
Alter: Zum Zeitpunkt der Befragung				65,1	66,8	-1,7	66,0	-0,8	LA00C
Alter: Berufsaufgabe				55,5	56,1	-0,6	55,8	-0,3	LA03J
Alter: Diagnose PK				58,1	59,3	-1,2	58,7	-0,6	LA04J
Alter: Auftreten typ. Pk-Beschwerden				55,1	54,6	0,4	54,9	0,2	LA05J
Alter: Muskelverspannungen				47,6	53,7	-6,1	50,5	-2,9	LA07AJ
Alter: Gelenk- oder Muskelschmerzen				47,2	52,7	-5,5	49,7	-2,5	LA07BJ
Alter: Schlafstörungen				48,8	49,5	-0,7	46,7	2,2	LA07CJ
Alter: Kopfschmerzen im Hinterkopf				47,0	47,4	-0,4	47,2	-0,2	LA07DJ
Alter: Nachlassen des Geruchssinns				51,9	55,4	-3,5	53,6	-1,6	LA07EJ
Alter: Tränen der Augen				56,0	57,9	-1,9	57,0	-1,0	LA07FJ
Alter: kleinere/unsichere Schrift				52,9	58,8	-5,9	55,4	-2,4	LA07GJ
Alter: Leiseres Sprechen				55,1	59,5	-4,3	57,1	-2,0	LA07HJ
Alter: Gedrücktere Stimmung				53,7	53,0	0,7	52,4	1,3	LA07IJ
Alter: deutlicher Anzeichen Vergeßlichkeit				53,3	52,9	0,4	52,2	1,1	LA09J
Alter: Beginn Spiel eines Musikinstrumentes				16,8	18,7	-1,9	17,5	-0,7	LA16B
Alter: Aufgabe Spiel eines Musikinstrumentes				34,8	39,9	-5,0	38,2	-3,4	LA16E
Alter: Beginn Rauchen				22,9	22,2	0,8	18,2	4,8	LA17AJ
Alter: Aufgabe Rauchen				45,4	47,8	-2,4	46,6	-1,2	LA17EJ
Alter: Beginn trauriger Verstimmungen/Depris				55,9	57,0	-1,1	56,7	-0,8	LA34AJ
Alter: Ende trauriger Verstimmungen/Depris				62,3	65,3	-3,0	63,6	-1,3	LA34EJ
Zusammenhang mit Jahr der PK-Diagnose									42
Seit wieviel Jahren Parkinson?				6,9	7,3	-0,3	7,1	-0,2	PK03K
Berufsaustritt/Aufgabe J				-3,5	-4,9	1,4	-4,2	0,7	PK03J
typische PK-Beschw. (retrospektiv)				-3,1	-3,3	0,3	-3,2	0,1	PK05J
Zeittl.Zus.Pk: Muskelverspannung				-9,6	-5,5	-4,1	-7,5	-2,1	PK07AJ
Zeittl.Zus.Pk: Gelenk-/bzw. Muskelschmerzen				-11,2	-7,5	-3,7	-9,4	-1,8	PK07BJ
Zeittl.Zus.Pk: Schlafstörungen x Jahre vor (-) bzw. nach(+) PK-Di				-9,1	-8,7	-0,4	-11,7	2,5	PK07CJ
Zeittl.Zus.Pk: Kopfschmerzen im Hinterkopf				-11,1	-13,0	2,0	-11,7	0,6	PK07DJ
Zeittl.Zus.Pk: Nachlassen Geruchssinn				-6,7	-4,4	-2,3	-5,4	-1,4	PK07EJ
Zeittl.Zus.Pk: Tränen der Augen				-6,0	-2,8	-3,2	-4,3	-1,8	PK07FJ
Zeittl.Zus.Pk: Kleinere (oder unsicherere) Schrift				-2,3	-1,2	-1,2	-2,2	-0,2	PK07GJ
Zeittl.Zus.Pk: Leiseres Sprechen				-1,3	0,1	-1,3	-0,6	-0,7	PK07HJ
Zeittl.Zus.Pk: Gedrückte Stimmung				-2,8	-5,0	2,2	-4,8	2,0	PK07IJ
Zeittl.Zus.Pk: deutl. Anz. von Vergeßlichkeit				-5,4	-7,7	2,3	-7,3	1,9	PK09J
Zeittl.Zus.Pk: Beginn Musizieren				-38,0	-43,4	5,4	-41,3	3,3	PK16BJ
Zeittl.Zus.Pk: Ende Musizieren				-20,0	-22,3	2,3	-20,3	0,3	PK16EJ
Zeittl.Zus.Pk: Beginn Rauchen				-33,5	-36,9	3,4	-38,0	4,5	PK17AJ
Zeittl.Zus.Pk: Aufgabe des Rauchens				-10,1	-10,8	0,6	-12,3	2,2	PK17EJ
Zeittl.Zus.Pk: Depressionsbeginn				-0,3	-1,6	1,3	-0,9	0,6	PK34AJ
Zeittl.Zus.Pk: Ende Depressionen				6,2	6,6	-0,4	6,3	-0,1	PK34EJ
Dauer									43
Dauer Musizieren				18,0	21,1	-3,1	19,6	-1,5	DAUR16
Dauer Rauchen				22,5	25,6	-3,1	23,3	-0,8	DAUR17
Dauer Depressionen				6,6	8,1	-1,4	7,6	-0,9	DAUR34