

schwererDurchfall

28DURC

allgemeine Angaben		00ALL %	Durchfall	kein Durchfall	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
allgemeine Fragen								0
Männerquote (Frauenquote = 100% - Männerquote)			69,2	59,2	10,0	59,3	9,9	00B
Anzahl Probanden			13,0	223,0	210,0	236,0	-223,0	01 SIGEL
Wert/Code			1,0	0,0	1,0	9,0	-8,0	Value
Lebenseinstellung		01LEB %	Durchfall	kein Durchfall	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Selbsteinschätzung								11
ernst			53,8	41,3	12,6	42,0	11,9	11.1
pflichtbewußt			76,9	85,2	-8,3	84,8	-7,8	11.2
strebsam			69,2	50,7	18,6	51,7	17,5	11.3
gründlich			69,2	54,7	14,5	55,5	13,7	11.4
Empfindsam, "dünnhäutig"			69,2	50,7	18,6	51,7	17,5	11.5
fröhlich			23,1	35,4	-12,3	34,8	-11,7	11.6
spontan			23,1	19,7	3,3	19,9	3,2	11.7
leichtlebig			0,0	3,6	-3,6	3,4	-3,4	11.8
humorvoll			23,1	28,3	-5,2	28,0	-4,9	11.9
musikalische Betätigung								12
Instrument gespielt?			7,7	24,2	-16,5	27,5	-19,8	16A
psychosoziale Faktoren								13
Spannungen: im Beruf			53,8	28,3	25,6	29,7	24,2	21BER
Spannungen: in der Familie			61,5	46,6	14,9	47,5	14,1	21FAM
Spannungen: im Freundes/Bekanntekreis			7,7	4,5	3,2	4,7	3,0	21FREU
Neigung eigene Gefühle zu unterdrücken			84,6	64,6	20,0	65,7	18,9	22
Depressionsquote			53,8	32,3	21,6	64,4	-10,6	34JN
Ernährung, Verdauung, Genußmittel		02ERN %	Durchfall	kein Durchfall	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Ernährung allgemein								20
Viel Obst und Rohkost im Jahr. vor Erkrankung			53,8	55,2	-1,3	55,1	-1,2	24
Gerne süße Speisen/Cola/Limo			69,2	80,3	-11,0	79,7	-10,4	26A
Heißhunger auf Süßes			38,5	50,7	-12,2	50,0	-11,5	26B
Konnte Mahlzeit auslassen			38,5	66,8	-28,4	65,3	-26,8	27A
Aß Kleinigkeit zwischen Mahlzeiten			38,5	38,6	-0,1	38,6	-0,1	27B
Nahrungsgewohnheiten geändert			30,8	34,5	-3,8	34,3	-3,6	35
Verdauungsbeschwerden								22
Verdauungsbeschwerde Blähungen			38,5	35,0	3,5	35,2	3,3	28BLAE
Verdauungsbeschwerde Durchfall						5,5		28DURC
Verdauungsbeschwerde Verstopfung			53,8	40,8	13,0	41,5	12,3	28VERS
Kaffee/Tee								25
Kaffeetrinker			53,8	68,6	-14,8	69,9	-16,1	20KAF
Teetrinker			46,2	48,9	-2,7	52,0	-5,8	20TEE
Anzahl Tassen Kaffee/Tag			1,8	2,4	-0,6	2,4	-0,6	20KTA
Anzahl Tassen Tee/Tag			1,0	1,3	-0,3	1,3	-0,3	20TTA
Alkohol								26
Alkohol Verträglichkeitsquote			61,5	64,1	-2,6	68,0	-6,5	19
Wein vertragen			53,8	29,6	24,2	30,9	22,9	19C1
Sekt vertragen			15,4	20,2	-4,8	19,9	-4,5	19C2
Bier vertragen			38,5	33,6	4,8	33,9	4,6	19C3
Branntwein vertragen			7,7	8,5	-0,8	8,5	-0,8	19C4
Likör vertragen			15,4	12,1	3,3	12,3	3,1	19C5
Rauchen								27
Wie stark geraucht?			30,8	31,4	-0,6	0,4	30,4	17S
Konstitution		03KON %	Durchfall	kein Durchfall	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Belastung und Belastbarkeit								32
Erblichkeitsquotient			23,1	12,1	11,0	12,7	10,4	10

Wie belastbar früher?						84,6	78,9	5,7	79,2	5,4	12A	
Wie belastet im Jahrz. vor Parkinson?						61,5	65,9	-4,4	65,7	-4,1	12B	
Konstitution, Schlaf												
Wie groß war Schlafbedarf?						46,2	53,4	-7,2	53,0	-6,8	13	
Ich ging gerne früh schlafen.						53,8	45,3	8,6	45,8	8,1	13B	
War früh schlafen möglich?						38,5	51,6	-13,1	50,9	-12,4	13C	
Konstitution, sportliche Betätigung												
Sport, Jogging, Gymn. (Jahrz. vor PK)						46,2	41,3	4,9	41,5	4,6	15A	
Wie häufig Gymnastik (Jahrz. vor PK)						7,7	24,2	-16,5	23,3	-15,6	15GYM	
Wie häufig Jogging (Jahrz. vor PK)						15,4	7,6	7,8	8,1	7,3	15JOG	
Wie oft Sport (Jahrz. vor PK)						23,1	26,5	-3,4	26,3	-3,2	15SPO	
Einflußfaktoren auf Symptomatik												
						05COP	Durchfall	kein Durchfall	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Verschlechterungen durch ...												
schlechter: Überanstrengung						76,9	63,7	13,2	64,4	12,5	36A1	
schlechter Aufregung,Sorge						84,6	76,2	8,4	76,7	7,9	36A2	
schlechter: Hetze						76,9	65,9	11,0	66,5	10,4	36A3	
schlechter: Zu wenig Schlaf						53,8	32,7	21,1	33,9	19,9	36A4	
schlechter: Zu wenig Trinken						15,4	12,1	3,3	12,3	3,1	36A5	
schlechter: Klimastürze						61,5	56,1	5,5	56,4	5,2	36A6	
schlechter: Hitze						61,5	37,2	24,3	38,6	23,0	36A7	
schlechter: Schlechte Luft						46,2	30,0	16,1	30,9	15,2	36A8	
schlechter: Tabakrauch						46,2	22,9	23,3	24,2	22,0	36A9	
Verbesserungen durch...												
gut: in heiterer Gesellschaft						61,5	58,7	2,8	58,9	2,6	37A	
gut: bei leichter Musik						61,5	41,7	19,8	42,8	18,7	37B	
gut: nach Gymnastik						15,4	42,6	-27,2	41,1	-25,7	37C	
gut: nach dem Schlafen						38,5	42,2	-3,7	42,0	-3,5	37D	
gut: in frischer Luft						100,0	67,3	32,7	69,1	30,9	37E	
gut: nach Entspannungsübungen						46,2	36,8	9,4	37,3	8,9	37F	
gut: nach dem Schwimmen						23,1	20,6	2,4	20,8	2,3	37G	
Krankheitsverlauf												
						06SYM	Durchfall	kein Durchfall	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Krankheitsverlauf, Symptomatik												
32 Äquivalenztyp J/N						46,2	30,5	15,7	31,4	14,8	32EQUI	
32 Rigordominanztyp J/N						38,5	42,2	-3,7	42,0	-3,5	32RIGO	
32 Tremordominanztyp J/N						15,4	27,4	-12,0	26,7	-11,3	32TREM	
Beschwerden seit Diag. schlimmer?						84,6	78,5	6,1	78,8	5,8	33BS	
Versteifung seit Diagnose besser?						15,4	22,9	-7,5	22,5	-7,1	33VB	
Versteifung seit Diagnose schlimmer?						53,8	56,5	-2,7	56,4	-2,5	33VS	
Zittern seit Diagnose gebessert?						38,5	28,7	9,8	29,2	9,2	33ZB	
Zittern seit Diagnose zugenommen?						69,2	50,2	19,0	63,1	6,1	33ZS	
offene Fragen												
						08OFF	Anzahl	kein Durchfall	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Verweise auf Ergebnisse offener Fragen												
Anzahl Medikamente heute						2,4	3,0	-0,7	3,0	-0,6	ANZ30H	
Angaben zu 31 Ärzten						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	NZ31ARZ	
Angaben zu 31 Behandlungen						3,0	3,3	-0,3	3,3	-0,3	NZ31BEH	
Anzahl Medikamente V31						0,1	0,2	-0,1	0,2	-0,1	NZ31SUM	
Anzahl verschlechternde Umstände (offene Listen)						0,0	0,2	-0,2	0,2	-0,2	NZ36OFF	
Anzahl verbessernde Umstände (offene Listen)						0,1	0,2	-0,2	0,2	-0,2	NZ37OFF	
Anzahl erwähnenswerte Belastungen (offene Listen)						0,7	0,4	0,3	0,5	0,2	NZ38OFF	
Angaben (offen) zu Krankheitsursachen						7,4	7,0	0,4	7,0	0,4	ANZ6	
Angaben zu frühsymptomen						4,4	4,1	0,3	4,1	0,3	ANZ7	
Indexe												
						10NDX	Index!	kein Durchfall	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Indexvariablen												
In gespannten Verhältnissen gelebt						4,1	4,6	-0,5	4,6	-0,5	21	
Was früher gegessen?						1,8	1,6	0,2	1,6	0,2	23	
beruflicher Aufstieg2						0,5	0,5	0,0			AUFST	

beruflicher Aufstieg			0,6	0,7	-0,1	0,7	-0,1	UFSTEIG
Vorlaufsymptome & Lebensalter		11 Jr Jahre	Durchfall	kein Durchfall	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Zusammenhang mit Lebensalter								41
Alter: Zum Zeitpunkt der Befragung			64,2	66,1	-1,8	66,0	-1,7	LA00C
Alter: Berufsaufgabe			59,5	55,6	3,9	55,8	3,7	LA03J
Alter: Diagnose PK			57,4	58,8	-1,4	58,7	-1,3	LA04J
Alter: Auftreten typ. Pk-Beschwerden			49,4	55,1	-5,8	54,9	-5,5	LA05J
Alter: Muskelverspannungen			44,0	50,9	-6,9	50,5	-6,5	LA07AJ
Alter: Gelenk- oder Muskelschmerzen			52,2	49,5	2,7	49,7	2,5	LA07BJ
Alter: Schlafstörungen			40,6	49,8	-9,2	46,7	-6,1	LA07CJ
Alter: Kopfschmerzen im Hinterkopf			39,6	47,9	-8,3	47,2	-7,6	LA07DJ
Alter: Nachlassen des Geruchssinns			51,3	53,7	-2,4	53,6	-2,2	LA07EJ
Alter: Tränen der Augen			54,3	57,3	-3,0	57,0	-2,8	LA07FJ
Alter: kleinere/unsichere Schrift			53,6	56,0	-2,4	55,4	-1,8	LA07GJ
Alter: Leiseres Sprechen			50,1	57,7	-7,5	57,1	-7,0	LA07HJ
Alter: Gedrücktere Stimmung			45,7	54,2	-8,5	52,4	-6,7	LA07IJ
Alter: deutlicher Anzeichen Vergesslichkeit			46,7	54,0	-7,3	52,2	-5,4	LA09J
Alter: Beginn Spiel eines Musikinstrumentes			44,0	17,2	26,8	17,5	26,5	LA16B
Alter: Aufgabe Spiel eines Musikinstrumentes			45,0	37,1	7,9	38,2	6,8	LA16E
Alter: Beginn Rauchen			18,5	22,8	-4,3	18,2	0,3	LA17AJ
Alter: Aufgabe Rauchen			39,8	47,0	-7,2	46,6	-6,9	LA17EJ
Alter: Beginn trauriger Verstimmungen/Depris			55,6	56,5	-0,9	56,7	-1,1	LA34AJ
Alter: Ende trauriger Verstimmungen/Depris			62,7	63,9	-1,2	63,6	-0,9	LA34EJ
Zusammenhang mit Jahr der PK-Diagnose								42
Seit wieviel Jahren Parkinson?			6,8	7,1	-0,3	7,1	-0,3	PK03K_JAHRE
Berufsaustritt/Aufgabe J			0,0	-4,4	4,4	-4,2	4,2	PK03J
typische PK-Beschw. (retrospektiv)			-7,0	-3,0	-4,0	-3,2	-3,8	PK05J
Zeitl.Zus.Pk: Muskelverspannung			-9,0	-7,6	-1,4	-7,5	-1,5	PK07AJ
Zeitl.Zus.Pk: Gelenk-/bzw. Muskelschmerzen			-2,0	-10,0	8,0	-9,4	7,4	PK07BJ
Zeitl.Zus.Pk: Schlafstörungen x Jahre vor (-) bzw. nach(+) PK-Di			-14,6	-8,5	-6,1	-11,7	-2,9	PK07CJ
Zeitl.Zus.Pk: Kopfschmerzen im Hinterkopf			-11,6	-11,9	0,3	-11,7	0,1	PK07DJ
Zeitl.Zus.Pk: Nachlassen Geruchssinn			-2,3	-5,8	3,5	-5,4	3,0	PK07EJ
Zeitl.Zus.Pk: Tränen der Augen			-0,3	-4,7	4,5	-4,3	4,0	PK07FJ
Zeitl.Zus.Pk: Kleinere (oder unsichere) Schrift			0,1	-1,9	2,0	-2,2	2,3	PK07GJ
Zeitl.Zus.Pk: Leiseres Sprechen			-3,3	-0,4	-2,8	-0,6	-2,7	PK07HJ
Zeitl.Zus.Pk: Gedrückte Stimmung			-8,6	-3,3	-5,3	-4,8	-3,8	PK07IJ
Zeitl.Zus.Pk: deutl. Anz. von Vergesslichkeit			-11,6	-5,7	-5,8	-7,3	-4,3	PK09J
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Musizieren			0,0	-41,4	41,4	-41,3	41,3	PK16BJ
Zeitl.Zus.Pk: Ende Musizieren			1,0	-21,5	22,5	-20,3	21,3	PK16EJ
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Rauchen			-33,8	-35,2	1,5	-38,0	4,2	PK17AJ
Zeitl.Zus.Pk: Aufgabe des Rauchens			-12,5	-10,3	-2,2	-12,3	-0,2	PK17EJ
Zeitl.Zus.Pk: Depressionsbeginn			0,6	-1,1	1,7	-0,9	1,5	PK34AJ
Zeitl.Zus.Pk: Ende Depressionen			7,7	6,3	1,4	6,3	1,5	PK34EJ
Dauer								43
Dauer Musizieren			1,0	19,9	-18,9	19,6	-18,6	DAUR16
Dauer Rauchen			21,3	24,1	-2,9	23,3	-2,1	DAUR17
Dauer Depressionen			7,1	7,3	-0,2	7,6	-0,4	DAUR34