

häufig Verstopfung

28VERS

allgemeine Angaben		00ALL %	Verstopfung	keine Verstopfung	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
allgemeine Fragen								0
Männerquote (Frauenquote = 100% - Männerquote)			52,0	65,2	-13,2	59,3	-7,3	00B
Anzahl Probanden			98,0	138,0	-40,0	236,0	-138,0	th SIGEL
Wert/Code			1,0	0,0	1,0	9,0	-8,0	Value
Lebenseinstellung		01LEB %	Verstopfung	keine Verstopfung	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Selbsteinschätzung								11
ernst			45,9	39,1	6,8	42,0	4,0	11.1
pflichtbewußt			88,8	81,9	6,9	84,8	4,0	11.2
strebsam			58,2	47,1	11,1	51,7	6,5	11.3
gründlich			61,2	51,4	9,8	55,5	5,7	11.4
Empfindsam, "dünnhäutig"			59,2	46,4	12,8	51,7	7,5	11.5
fröhlich			32,7	36,2	-3,6	34,8	-2,1	11.6
spontan			22,4	18,1	4,3	19,9	2,5	11.7
leichtlebig			4,1	2,9	1,2	3,4	0,7	11.8
humorvoll			24,5	30,4	-5,9	28,0	-3,5	11.9
musikalische Betätigung								12
Instrument gespielt?			23,5	23,2	0,3	27,5	-4,1	16A
psychosoziale Faktoren								13
Spannungen: im Beruf			31,6	28,3	3,4	29,7	2,0	21BER
Spannungen: in der Familie			52,0	44,2	7,8	47,5	4,6	21FAM
Spannungen: im Freundes/Bekanntkreis			7,1	2,9	4,2	4,7	2,5	21FREU
Neigung eigene Gefühle zu unterdrücken			77,6	57,2	20,3	65,7	11,9	22
Depressionsquote			39,8	29,0	10,8	64,4	-24,6	34JN
Ernährung, Verdauung, Genußmittel		02ERN %	Verstopfung	keine Verstopfung	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Ernährung allgemein								20
Viel Obst und Rohkost im Jahr. vor Erkrankung			51,0	58,0	-7,0	55,1	-4,1	24
Gerne süße Speisen/Cola/Limo			85,7	75,4	10,4	79,7	6,1	26A
Heißhunger auf Süßes			57,1	44,9	12,2	50,0	7,1	26B
Konnte Mahlzeit auslassen			68,4	63,0	5,3	65,3	3,1	27A
Aß Kleinigkeit zwischen Mahlzeiten			46,9	32,6	14,3	38,6	8,4	27B
Nahrungsgewohnheiten geändert			34,7	34,1	0,6	34,3	0,4	35
Verdauungsbeschwerden								22
Verdauungsbeschwerde Blähungen			52,0	23,2	28,9	35,2	16,9	28BLAE
Verdauungsbeschwerde Durchfall			7,1	4,3	2,8	5,5	1,6	28DURC
Verdauungsbeschwerde Verstopfung						41,5		28VERS
Kaffee/Tee								25
Kaffeetrinker			72,4	64,5	8,0	69,9	2,5	20KAF
Teetrinker			51,0	47,1	3,9	52,0	-1,0	20TEE
Anzahl Tassen Kaffee/Tag			2,4	2,4	0,1	2,4	0,0	20KTA
Anzahl Tassen Tee/Tag			1,5	1,2	0,2	1,3	0,1	20TTA
Alkohol								26
Alkohol Verträglichkeitsquote			58,2	68,1	-10,0	68,0	-9,8	19
Wein vertragen			39,8	24,6	15,2	30,9	8,9	19C1
Sekt vertragen			29,6	13,0	16,5	19,9	9,7	19C2
Bier vertragen			41,8	28,3	13,6	33,9	7,9	19C3
Branntwein vertragen			12,2	5,8	6,4	8,5	3,8	19C4
Likör vertragen			18,4	8,0	10,4	12,3	6,1	19C5
Rauchen								27
Wie stark geraucht?			29,6	32,6	-3,0	0,4	29,2	17S
Konstitution		03KON %	Verstopfung	keine Verstopfung	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Belastung und Belastbarkeit								32
Erblichkeitsquotient			9,2	15,2	-6,0	12,7	-3,5	10

Wie belastbar früher?						74,5	82,6	-8,1	79,2	-4,8	12A
Wie belastet im Jahrz. vor Parkinson?						71,4	61,6	9,8	65,7	5,7	12B
Konstitution, Schlaf											
Wie groß war Schlafbedarf?						51,0	54,3	-3,3	53,0	-1,9	13
Ich ging gerne früh schlafen.						44,9	46,4	-1,5	45,8	-0,9	13B
War früh schlafen möglich?						42,9	56,5	-13,7	50,9	-8,0	13C
Konstitution, sportliche Betätigung											
Sport, Jogging, Gymn. (Jahrz. vor PK)						44,9	39,1	5,8	41,5	3,4	15A
Wie häufig Gymnastik (Jahrz. vor PK)						26,5	21,0	5,5	23,3	3,2	15GYM
Wie häufig Jogging (Jahrz. vor PK)						9,2	7,2	1,9	8,1	1,1	15JOG
Wie oft Sport (Jahrz. vor PK)						23,5	28,3	-4,8	26,3	-2,8	15SPO
Einflußfaktoren auf Symptomatik											
					05 COP %	Verstopfung	keine Verstopfung	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Verschlechterungen durch ...											
schlechter: Überanstrengung						66,3	63,0	3,3	64,4	1,9	36A1
schlechter Aufregung,Sorge						74,5	78,3	-3,8	76,7	-2,2	36A2
schlechter: Hetze						66,3	66,7	-0,3	66,5	-0,2	36A3
schlechter: Zu wenig Schlaf						37,8	31,2	6,6	33,9	3,9	36A4
schlechter: Zu wenig Trinken						12,2	12,3	-0,1	12,3	0,0	36A5
schlechter: Klimastürze						61,2	52,9	8,3	56,4	4,9	36A6
schlechter: Hitze						41,8	36,2	5,6	38,6	3,3	36A7
schlechter: Schlechte Luft						30,6	31,2	-0,5	30,9	-0,3	36A8
schlechter: Tabakrauch						24,5	23,9	0,6	24,2	0,3	36A9
Verbesserungen durch...											
gut: in heiterer Gesellschaft						63,3	55,8	7,5	58,9	4,4	37A
gut: bei leichter Musik						54,1	34,8	19,3	42,8	11,3	37B
gut: nach Gymnastik						40,8	41,3	-0,5	41,1	-0,3	37C
gut: nach dem Schlafen						46,9	38,4	8,5	42,0	5,0	37D
gut: in frischer Luft						68,4	69,6	-1,2	69,1	-0,7	37E
gut: nach Entspannungsübungen						32,7	40,6	-7,9	37,3	-4,6	37F
gut: nach dem Schwimmen						27,6	15,9	11,6	20,8	6,8	37G
Krankheitsverlauf											
					06 SYM %	Verstopfung	keine Verstopfung	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Krankheitsverlauf, Symptomatik											
32 Äquivalenztyp J/N						30,6	31,9	-1,3	31,4	-0,7	32EQUI
32 Rigordominanztyp J/N						46,9	38,4	8,5	42,0	5,0	32RIGO
32 Tremordominanztyp J/N						22,4	29,7	-7,3	26,7	-4,2	32TREM
Beschwerden seit Diag. schlimmer?						76,5	80,4	-3,9	78,8	-2,3	33BS
Versteifung seit Diagnose besser?						27,6	18,8	8,7	22,5	5,1	33VB
Versteifung seit Diagnose schlimmer?						56,1	56,5	-0,4	56,4	-0,2	33VS
Zittern seit Diagnose gebessert?						28,6	29,7	-1,1	29,2	-0,7	33ZB
Zittern seit Diagnose zugenommen?						44,9	55,8	-10,9	63,1	-18,2	33ZS
offene Fragen											
					08 OFF Anzahl	Verstopfung	keine Verstopfung	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Verweise auf Ergebnisse offener Fragen											
Anzahl Medikamente heute						2,9	3,1	-0,2	3,0	-0,1	ANZ30H
Angaben zu 31 Ärzten						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ANZ31ARZ
Angaben zu 31 Behandlungen						3,3	3,3	0,0	3,3	0,0	ANZ31BEH
Anzahl Medikamente V31						0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	ANZ31SUM
Anzahl verschlechternde Umstände (offene Listen)						0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	ANZ36OFF
Anzahl verbessernde Umstände (offene Listen)						0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	ANZ37OFF
Anzahl erwähnenswerte Belastungen (offene Listen)						0,5	0,4	0,0	0,5	0,0	ANZ38OFF
Angaben (offen) zu Krankheitsursachen						7,4	6,7	0,7	7,0	0,4	ANZ6
Angaben zu frühsymptomen						4,9	3,6	1,2	4,1	0,8	ANZ7
Indexe											
					10NDX Index!	Verstopfung	keine Verstopfung	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Indexvariablen											
In gespannten Verhältnissen gelebt						4,4	4,7	-0,3	4,6	-0,2	21
Was früher gegessen?						1,7	1,6	0,1	1,6	0,1	23
beruflicher Aufstieg2						0,4	0,5	0,0			AUFST

beruflicher Aufstieg				0,7	0,8	-0,1	0,7	-0,1	UFSTEIG	
Vorlaufsymptome & Lebensalter										
11 Jr Jahre										
Verstopfung										
keine Verstopfung										
Differenz										
Durchschnitt Ges.										
Differenz zum Durchschnitt										
Zusammenhang mit Lebensalter										41
Alter: Zum Zeitpunkt der Befragung				66,0	65,9	0,2	66,0	0,1	LA00C	
Alter: Berufsaufgabe				55,8	55,8	0,0	55,8	0,0	LA03J	
Alter: Diagnose PK				59,3	58,3	1,0	58,7	0,6	LA04J	
Alter: Auftreten typ. Pk-Beschwerden				54,8	54,9	-0,1	54,9	0,0	LA05J	
Alter: Muskelverspannungen				50,4	50,6	-0,2	50,5	-0,1	LA07AJ	
Alter: Gelenk- oder Muskelschmerzen				48,7	50,8	-2,2	49,7	-1,0	LA07BJ	
Alter: Schlafstörungen				48,3	50,2	-1,9	46,7	1,6	LA07CJ	
Alter: Kopfschmerzen im Hinterkopf				49,0	45,2	3,8	47,2	1,8	LA07DJ	
Alter: Nachlassen des Geruchssinns				51,6	55,2	-3,6	53,6	-2,0	LA07EJ	
Alter: Tränen der Augen				53,0	61,8	-8,8	57,0	-4,1	LA07FJ	
Alter: kleinere/unsichere Schrift				55,3	56,3	-1,0	55,4	0,0	LA07GJ	
Alter: Leiseres Sprechen				57,1	57,1	0,0	57,1	0,0	LA07HJ	
Alter: Gedrücktere Stimmung				51,9	54,7	-2,8	52,4	-0,5	LA07IJ	
Alter: deutlicher Anzeichen Vergeßlichkeit				53,8	52,2	1,6	52,2	1,7	LA09J	
Alter: Beginn Spiel eines Musikinstrumentes				18,3	17,3	1,0	17,5	0,8	LA16B	
Alter: Aufgabe Spiel eines Musikinstrumentes				38,0	36,8	1,3	38,2	-0,2	LA16E	
Alter: Beginn Rauchen				24,1	21,6	2,4	18,2	5,9	LA17AJ	
Alter: Aufgabe Rauchen				52,6	42,7	9,8	46,6	6,0	LA17EJ	
Alter: Beginn trauriger Verstimmungen/Depris				54,1	58,7	-4,6	56,7	-2,6	LA34AJ	
Alter: Ende trauriger Verstimmungen/Depris				62,4	65,2	-2,8	63,6	-1,3	LA34EJ	
Zusammenhang mit Jahr der PK-Diagnose										42
Seit wieviel Jahren Parkinson?				6,6	7,5	-0,8	7,1	-0,5	PK03J	
Berufsaustritt/Aufgabe J				-4,6	-3,8	-0,8	-4,2	-0,5	PK05J	
typische PK-Beschw. (retrospektiv)				-3,5	-3,0	-0,6	-3,2	-0,3	PK07AJ	
Zeitl.Zus.Pk: Muskelverspannung				-8,4	-7,1	-1,3	-7,5	-0,9	PK07BJ	
Zeitl.Zus.Pk: Gelenk-/bzw. Muskelschmerzen				-10,7	-8,3	-2,3	-9,4	-1,3	PK07CJ	
Zeitl.Zus.Pk: Schlafstörungen x Jahre vor (-) bzw. nach(+) PK-Di				-9,2	-8,5	-0,7	-11,7	2,4	PK07DJ	
Zeitl.Zus.Pk: Kopfschmerzen im Hinterkopf				-8,2	-15,6	7,4	-11,7	3,5	PK07EJ	
Zeitl.Zus.Pk: Nachlassen Geruchssinn				-5,8	-5,5	-0,4	-5,4	-0,5	PK07FJ	
Zeitl.Zus.Pk: Tränen der Augen				-6,6	-1,7	-4,9	-4,3	-2,3	PK07GJ	
Zeitl.Zus.Pk: Kleinere (oder unsicherere) Schrift				-2,2	-1,4	-0,8	-2,2	0,0	PK07HJ	
Zeitl.Zus.Pk: Leiseres Sprechen				-1,3	-0,1	-1,2	-0,6	-0,7	PK07IJ	
Zeitl.Zus.Pk: Gedrückte Stimmung				-5,2	-2,5	-2,7	-4,8	-0,5	PK09J	
Zeitl.Zus.Pk: deutl. Anz. von Vergeßlichkeit				-7,8	-5,2	-2,6	-7,3	-0,5	PK16BJ	
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Musizieren				-41,7	-39,9	-1,9	-41,3	-0,5	PK16EJ	
Zeitl.Zus.Pk: Ende Musizieren				-22,0	-20,4	-1,6	-20,3	-1,7	PK17AJ	
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Rauchen				-36,5	-34,3	-2,2	-38,0	1,5	PK17EJ	
Zeitl.Zus.Pk: Aufgabe des Rauchens				-7,2	-12,5	5,3	-12,3	5,1	PK34AJ	
Zeitl.Zus.Pk: Depressionsbeginn				-2,7	0,6	-3,3	-0,9	-1,8	PK34EJ	
Zeitl.Zus.Pk: Ende Depressionen				5,6	7,1	-1,5	6,3	-0,6		
Dauer										43
Dauer Musizieren				19,7	19,4	0,3	19,6	0,2	DAUR16	
Dauer Rauchen				28,5	21,1	7,4	23,3	5,2	DAUR17	
Dauer Depressionen				8,3	6,4	1,9	7,6	0,8	DAUR34	