

32 Äquivalenztyp (Zittern+Versteifung)J/N

32EQUI

allgemeine Angaben		00ALL %	Äquivalenztyp	kein Äquivalenztyp	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
allgemeine Fragen								0
Männerquote (Frauenquote = 100% - Männerquote)			62,2	58,6	3,5	59,3	2,9	00B
Anzahl Probanden			74,0	162,0	-88,0	236,0	-162,0	th SIGEL
Wert/Code			1,0	0,0	1,0	9,0	-8,0	Value
Lebenseinstellung		01LEB %	Äquivalenztyp	kein Äquivalenztyp	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Selbsteinschätzung								11
ernst			40,5	42,6	-2,1	42,0	-1,4	11.1
pflichtbewußt			83,8	85,2	-1,4	84,8	-1,0	11.2
strebsam			52,7	51,2	1,5	51,7	1,0	11.3
gründlich			64,9	51,2	13,6	55,5	9,4	11.4
Empfindsam, "dünnhäutig"			45,9	54,3	-8,4	51,7	-5,7	11.5
fröhlich			45,9	29,6	16,3	34,8	11,2	11.6
spontan			20,3	19,8	0,5	19,9	0,4	11.7
leichtlebig			4,1	3,1	1,0	3,4	0,7	11.8
humorvoll			32,4	25,9	6,5	28,0	4,5	11.9
musikalische Betätigung								12
Instrument gespielt?			21,6	24,1	-2,5	27,5	-5,9	16A
psychosoziale Faktoren								13
Spannungen: im Beruf			28,4	30,2	-1,9	29,7	-1,3	21BER
Spannungen: in der Familie			45,9	48,1	-2,2	47,5	-1,5	21FAM
Spannungen: im Freundes/Bekanntkreis			6,8	3,7	3,1	4,7	2,1	21FREU
Neigung eigene Gefühle zu unterdrücken			59,5	68,5	-9,1	65,7	-6,2	22
Depressionsquote			32,4	34,0	-1,5	64,4	-32,0	34JN
Ernährung, Verdauung, Genußmittel		02ERN %	Äquivalenztyp	kein Äquivalenztyp	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Ernährung allgemein								20
Viel Obst und Rohkost im Jahr. vor Erkrankung			59,5	53,1	6,4	55,1	4,4	24
Gerne süße Speisen/Cola/Limo			73,0	82,7	-9,7	79,7	-6,7	26A
Heißhunger auf Süßes			48,6	50,6	-2,0	50,0	-1,4	26B
Konnte Mahlzeit auslassen			59,5	67,9	-8,4	65,3	-5,8	27A
Aß Kleinigkeit zwischen Mahlzeiten			45,9	35,2	10,8	38,6	7,4	27B
Nahrungsgewohnheiten geändert			37,8	32,7	5,1	34,3	3,5	35
Verdauungsbeschwerden								22
Verdauungsbeschwerde Blähungen			32,4	36,4	-4,0	35,2	-2,7	28BLAE
Verdauungsbeschwerde Durchfall			8,1	4,3	3,8	5,5	2,6	28DURC
Verdauungsbeschwerde Verstopfung			40,5	42,0	-1,4	41,5	-1,0	28VERS
Kaffee/Tee								25
Kaffeetrinker			75,7	64,2	11,5	69,9	5,8	20KAF
Teetrinker			48,6	48,8	-0,1	52,0	-3,4	20TEE
Anzahl Tassen Kaffee/Tag			2,6	2,3	0,3	2,4	0,2	20KTA
Anzahl Tassen Tee/Tag			1,3	1,3	0,0	1,3	0,0	20TTA
Alkohol								26
Alkohol Verträglichkeitsquote			62,2	64,8	-2,7	68,0	-5,8	19
Wein vertragen			29,7	31,5	-1,8	30,9	-1,2	19C1
Sekt vertragen			20,3	19,8	0,5	19,9	0,4	19C2
Bier vertragen			36,5	32,7	3,8	33,9	2,6	19C3
Branntwein vertragen			6,8	9,3	-2,5	8,5	-1,7	19C4
Likör vertragen			10,8	13,0	-2,2	12,3	-1,5	19C5
Rauchen								27
Wie stark geraucht?			31,1	31,5	-0,4	0,4	30,7	17S
Konstitution		03KON %	Äquivalenztyp	kein Äquivalenztyp	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Belastung und Belastbarkeit								32
Erblichkeitsquotient			18,9	9,9	9,0	12,7	6,2	10

Wie belastbar früher?					74,3	81,5	-7,2	79,2	-4,9	12A
Wie belastet im Jahrz. vor Parkinson?					58,1	69,1	-11,0	65,7	-7,6	12B
Konstitution, Schlaf										33
Wie groß war Schlafbedarf?					58,1	50,6	7,5	53,0	5,1	13
Ich ging gerne früh schlafen.					48,6	44,4	4,2	45,8	2,9	13B
War früh schlafen möglich?					44,6	53,7	-9,1	50,9	-6,3	13C
Konstitution, sportliche Betätigung										34
Sport, Jogging, Gymn. (Jahrz. vor PK)					44,6	40,1	4,5	41,5	3,1	15A
Wie häufig Gymnastik (Jahrz. vor PK)					27,0	21,6	5,4	23,3	3,7	15GYM
Wie häufig Jogging (Jahrz. vor PK)					8,1	8,0	0,1	8,1	0,1	15JOG
Wie oft Sport (Jahrz. vor PK)					25,7	26,5	-0,9	26,3	-0,6	15SPO
Einflußfaktoren auf Symptomatik										05COP %
Verschlechterungen durch ...										35
schlechter: Überanstrengung					68,9	62,3	6,6	64,4	4,5	36A1
schlechter Aufregung,Sorge					75,7	77,2	-1,5	76,7	-1,0	36A2
schlechter: Hetze					62,2	68,5	-6,4	66,5	-4,4	36A3
schlechter: Zu wenig Schlaf					32,4	34,6	-2,1	33,9	-1,5	36A4
schlechter: Zu wenig Trinken					20,3	8,6	11,6	12,3	8,0	36A5
schlechter: Klimastürze					56,8	56,2	0,6	56,4	0,4	36A6
schlechter: Hitze					40,5	37,7	2,9	38,6	2,0	36A7
schlechter: Schlechte Luft					29,7	31,5	-1,8	30,9	-1,2	36A8
schlechter: Tabakrauch					28,4	22,2	6,2	24,2	4,2	36A9
Verbesserungen durch...										36
gut: in heiterer Gesellschaft					63,5	56,8	6,7	58,9	4,6	37A
gut: bei leichter Musik					47,3	40,7	6,6	42,8	4,5	37B
gut: nach Gymnastik					48,6	37,7	11,0	41,1	7,5	37C
gut: nach dem Schlafen					37,8	43,8	-6,0	42,0	-4,1	37D
gut: in frischer Luft					70,3	68,5	1,8	69,1	1,2	37E
gut: nach Entspannungsübungen					40,5	35,8	4,7	37,3	3,3	37F
gut: nach dem Schwimmen					23,0	19,8	3,2	20,8	2,2	37G
Krankheitsverlauf										06SYM %
Krankheitsverlauf, Symptomatik										37
32 Äquivalenztyp J/N								31,4		32EQUI
32 Rigordominanztyp J/N					0,0	61,1	-61,1	42,0	-42,0	32RIGO
32 Tremordominanztyp J/N					0,0	38,9	-38,9	26,7	-26,7	32TREM
Beschwerden seit Diag. schlimmer?					78,4	79,0	-0,6	78,8	-0,4	33BS
Versteifung seit Diagnose besser?					21,6	22,8	-1,2	22,5	-0,8	33VB
Versteifung seit Diagnose schlimmer?					59,5	54,9	4,5	56,4	3,1	33VS
Zittern seit Diagnose gebessert?					28,4	29,6	-1,3	29,2	-0,9	33ZB
Zittern seit Diagnose zugenommen?					66,2	44,4	21,8	63,1	3,1	33ZS
offene Fragen										08OFF Anzahl
Verweise auf Ergebnisse offener Fragen										38
Anzahl Medikamente heute					2,9	3,0	-0,1	3,0	-0,1	ANZ30H
Angaben zu 31 Ärzten					0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	ANZ31ARZ
Angaben zu 31 Behandlungen					2,9	3,5	-0,6	3,3	-0,4	ANZ31BEH
Anzahl Medikamente V31					0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	ANZ31SUM
Anzahl verschlechternde Umstände (offene Listen)					0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	ANZ36OFF
Anzahl verbessernde Umstände (offene Listen)					0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	ANZ37OFF
Anzahl erwähnenswerte Belastungen (offene Listen)					0,3	0,5	-0,2	0,5	-0,1	ANZ38OFF
Angaben (offen) zu Krankheitsursachen					6,2	7,3	-1,1	7,0	-0,8	ANZ6
Angaben zu frühsymptomen					4,5	4,0	0,5	4,1	0,4	ANZ7
Indexe										10NDX Index!
Indexvariablen										39
In gespannten Verhältnissen gelebt					5,1	4,3	0,7	4,6	0,5	21
Was früher gegessen?					1,6	1,6	0,0	1,6	0,0	23
beruflicher Aufstieg2					0,4	0,5	-0,1			AUFST

beruflicher Aufstieg		0,6	0,8	-0,2	0,7	-0,1	UFSTEIG
Vorlaufsymptome & Lebensalter		11 Jr Jahre	Äquivalenztyp	kein Äquivalenztyp	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Zusammenhang mit Lebensalter							41
Alter: Zum Zeitpunkt der Befragung		65,7	66,0	-0,3	66,0	-0,2	LA00C
Alter: Berufsaufgabe		54,0	56,6	-2,5	55,8	-1,8	LA03J
Alter: Diagnose PK		57,8	59,1	-1,3	58,7	-0,9	LA04J
Alter: Auftreten typ. Pk-Beschwerden		52,3	56,1	-3,8	54,9	-2,6	LA05J
Alter: Muskelverspannungen		49,1	51,1	-1,9	50,5	-1,3	LA07AJ
Alter: Gelenk- oder Muskelschmerzen		49,5	49,7	-0,3	49,7	-0,2	LA07BJ
Alter: Schlafstörungen		45,8	50,8	-4,9	46,7	-0,8	LA07CJ
Alter: Kopfschmerzen im Hinterkopf		46,4	47,8	-1,4	47,2	-0,8	LA07DJ
Alter: Nachlassen des Geruchssinns		53,6	53,5	0,1	53,6	0,0	LA07EJ
Alter: Tränen der Augen		55,8	58,0	-2,2	57,0	-1,2	LA07FJ
Alter: kleinere/unsichere Schrift		55,8	55,8	0,0	55,4	0,5	LA07GJ
Alter: Leiseres Sprechen		57,3	57,0	0,3	57,1	0,2	LA07HJ
Alter: Gedrücktere Stimmung		54,0	53,1	0,9	52,4	1,6	LA07IJ
Alter: deutlicher Anzeichen Vergeßlichkeit		54,4	52,3	2,1	52,2	2,2	LA09J
Alter: Beginn Spiel eines Musikinstrumentes		17,6	17,8	-0,2	17,5	0,0	LA16B
Alter: Aufgabe Spiel eines Musikinstrumentes		38,6	36,7	1,9	38,2	0,4	LA16E
Alter: Beginn Rauchen		22,2	22,7	-0,5	18,2	4,0	LA17AJ
Alter: Aufgabe Rauchen		48,6	45,7	2,9	46,6	2,0	LA17EJ
Alter: Beginn trauriger Verstimmungen/Depris		56,3	56,5	-0,2	56,7	-0,4	LA34AJ
Alter: Ende trauriger Verstimmungen/Depris		66,0	62,9	3,2	63,6	2,4	LA34EJ
Zusammenhang mit Jahr der PK-Diagnose							42
Seit wieviel Jahren Parkinson?		7,7	6,8	0,8	7,1	0,6	PK03K_JAHRE
Berufsaustritt/Aufgabe J		-3,8	-4,3	0,5	-4,2	0,4	PK03J
typische PK-Beschw. (retrospektiv)		-4,2	-2,7	-1,5	-3,2	-1,0	PK05J
Zeittl.Zus.Pk: Muskelverspannung		-6,8	-8,1	1,3	-7,5	0,7	PK07AJ
Zeittl.Zus.Pk: Gelenk-/bzw. Muskelschmerzen		-8,8	-9,8	1,0	-9,4	0,6	PK07BJ
Zeittl.Zus.Pk: Schlafstörungen x Jahre vor (-) bzw. nach(+) PK-Di		-9,5	-8,6	-0,8	-11,7	2,2	PK07CJ
Zeittl.Zus.Pk: Kopfschmerzen im Hinterkopf		-13,3	-10,9	-2,4	-11,7	-1,6	PK07DJ
Zeittl.Zus.Pk: Nachlassen Geruchssinn		-3,2	-7,2	4,0	-5,4	2,2	PK07EJ
Zeittl.Zus.Pk: Tränen der Augen		-2,9	-5,5	2,7	-4,3	1,4	PK07FJ
Zeittl.Zus.Pk: Kleinere (oder unsicherere) Schrift		-1,1	-2,2	1,1	-2,2	1,1	PK07GJ
Zeittl.Zus.Pk: Leiseres Sprechen		-0,3	-0,9	0,6	-0,6	0,3	PK07HJ
Zeittl.Zus.Pk: Gedrückte Stimmung		-3,7	-3,8	0,1	-4,8	1,1	PK07IJ
Zeittl.Zus.Pk: deutl. Anz. von Vergeßlichkeit		-6,9	-6,3	-0,5	-7,3	0,4	PK09J
Zeittl.Zus.Pk: Beginn Musizieren		-42,8	-39,8	-3,0	-41,3	-1,5	PK16BJ
Zeittl.Zus.Pk: Ende Musizieren		-21,8	-20,8	-0,9	-20,3	-1,5	PK16EJ
Zeittl.Zus.Pk: Beginn Rauchen		-33,9	-35,7	1,8	-38,0	4,1	PK17AJ
Zeittl.Zus.Pk: Aufgabe des Rauchens		-8,1	-11,4	3,3	-12,3	4,2	PK17EJ
Zeittl.Zus.Pk: Depressionsbeginn		-1,6	-0,7	-1,0	-0,9	-0,7	PK34AJ
Zeittl.Zus.Pk: Ende Depressionen		8,0	5,7	2,3	6,3	1,8	PK34EJ
Dauer							43
Dauer Musizieren		21,1	18,9	2,1	19,6	1,5	DAUR16
Dauer Rauchen		26,3	22,9	3,4	23,3	3,0	DAUR17
Dauer Depressionen		9,2	6,5	2,7	7,6	1,7	DAUR34