

32 Rigordominanztyp (Versteifung) J/N

32RIGO

allgemeine Angaben		00ALL %	Rigor dominant	Rigor nicht dominant	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
allgemeine Fragen								0
Männerquote (Frauenquote = 100% - Männerquote)			70,7	51,8	18,9	59,3	11,4	00B
Anzahl Probanden			99,0	137,0	-38,0	236,0	-137,0	thl SIGEL
Wert/Code			1,0	0,0	1,0	9,0	-8,0	Value
Lebenseinstellung		01LEB %	Rigor dominant	Rigor nicht dominant	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Selbsteinschätzung								11
ernst			41,4	42,3	-0,9	42,0	-0,5	11.1
pflichtbewußt			88,9	81,8	7,1	84,8	4,1	11.2
strebsam			53,5	50,4	3,2	51,7	1,8	11.3
gründlich			52,5	57,7	-5,1	55,5	-3,0	11.4
Empfindsam, "dünnhäutig"			56,6	48,2	8,4	51,7	4,9	11.5
fröhlich			30,3	38,0	-7,7	34,8	-4,4	11.6
spontan			23,2	17,5	5,7	19,9	3,3	11.7
leichtlebig			5,1	2,2	2,9	3,4	1,7	11.8
humorvoll			30,3	26,3	4,0	28,0	2,3	11.9
musikalische Betätigung								12
Instrument gespielt?			28,3	19,7	8,6	27,5	0,7	16A
psychosoziale Faktoren								13
Spannungen: im Beruf			38,4	23,4	15,0	29,7	8,7	21BER
Spannungen: in der Familie			44,4	49,6	-5,2	47,5	-3,0	21FAM
Spannungen: im Freundes/Bekanntkreis			3,0	5,8	-2,8	4,7	-1,6	21FREU
Neigung eigene Gefühle zu unterdrücken			73,7	59,9	13,9	65,7	8,1	22
Depressionsquote			43,4	26,3	17,2	64,4	-21,0	34JN
Ernährung, Verdauung, Genußmittel		02ERN %	Rigor dominant	Rigor nicht dominant	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Ernährung allgemein								20
Viel Obst und Rohkost im Jahr. vor Erkrankung			53,5	56,2	-2,7	55,1	-1,5	24
Gerne süße Speisen/Cola/Limo			87,9	73,7	14,2	79,7	8,2	26A
Heißhunger auf Süßes			57,6	44,5	13,1	50,0	7,6	26B
Konnte Mahlzeit auslassen			73,7	59,1	14,6	65,3	8,5	27A
Aß Kleinigkeit zwischen Mahlzeiten			39,4	38,0	1,4	38,6	0,8	27B
Nahrungsgewohnheiten geändert			33,3	35,0	-1,7	34,3	-1,0	35
Verdauungsbeschwerden								22
Verdauungsbeschwerde Blähungen			37,4	33,6	3,8	35,2	2,2	28BLAE
Verdauungsbeschwerde Durchfall			5,1	5,8	-0,8	5,5	-0,5	28DURC
Verdauungsbeschwerde Verstopfung			46,5	38,0	8,5	41,5	4,9	28VERS
Kaffee/Tee								25
Kaffeetrinker			64,6	70,1	-5,4	69,9	-5,3	20KAF
Teetrinker			49,5	48,2	1,3	52,0	-2,5	20TEE
Anzahl Tassen Kaffee/Tag			2,3	2,5	-0,1	2,4	-0,1	20KTA
Anzahl Tassen Tee/Tag			1,4	1,3	0,1	1,3	0,1	20TTA
Alkohol								26
Alkohol Verträglichkeitsquote			74,7	56,2	18,5	68,0	6,7	19
Wein vertragen			32,3	29,9	2,4	30,9	1,4	19C1
Sekt vertragen			21,2	19,0	2,2	19,9	1,3	19C2
Bier vertragen			35,4	32,8	2,5	33,9	1,5	19C3
Branntwein vertragen			10,1	7,3	2,8	8,5	1,6	19C4
Likör vertragen			9,1	14,6	-5,5	12,3	-3,2	19C5
Rauchen								27
Wie stark geraucht?			35,4	28,5	6,9	0,4	35,0	17S
Konstitution		03KON %	Rigor dominant	Rigor nicht dominant	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Belastung und Belastbarkeit								32
Erblichkeitsquotient			11,1	13,9	-2,8	12,7	-1,6	10

Wie belastbar früher?					82,8	76,6	6,2	79,2	3,6	12A
Wie belastet im Jahrz. vor Parkinson?					70,7	62,0	8,7	65,7	5,0	12B
Konstitution, Schlaf										
Wie groß war Schlafbedarf?					52,5	53,3	-0,8	53,0	-0,4	13
Ich ging gerne früh schlafen.					45,5	46,0	-0,5	45,8	-0,3	13B
War früh schlafen möglich?					55,6	47,4	8,1	50,9	4,7	13C
Konstitution, sportliche Betätigung										
Sport, Jogging, Gymn. (Jahrz. vor PK)					41,4	41,6	-0,2	41,5	-0,1	15A
Wie häufig Gymnastik (Jahrz. vor PK)					19,2	26,3	-7,1	23,3	-4,1	15GYM
Wie häufig Jogging (Jahrz. vor PK)					10,1	6,6	3,5	8,1	2,1	15JOG
Wie oft Sport (Jahrz. vor PK)					28,3	24,8	3,5	26,3	2,0	15SPO
Einflußfaktoren auf Symptomatik										
					05 COP %	Rigor dominant	Rigor nicht dominant	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Verschlechterungen durch ...										
schlechter: Überanstrengung					61,6	66,4	-4,8	64,4	-2,8	35A1
schlechter Aufregung,Sorge					76,8	76,6	0,1	76,7	0,1	35A2
schlechter: Hetze					69,7	64,2	5,5	66,5	3,2	35A3
schlechter: Zu wenig Schlaf					38,4	30,7	7,7	33,9	4,5	35A4
schlechter: Zu wenig Trinken					11,1	13,1	-2,0	12,3	-1,2	35A5
schlechter: Klimastürze					57,6	55,5	2,1	56,4	1,2	35A6
schlechter: Hitze					37,4	39,4	-2,0	38,6	-1,2	35A7
schlechter: Schlechte Luft					31,3	30,7	0,7	30,9	0,4	35A8
schlechter: Tabakrauch					23,2	24,8	-1,6	24,2	-0,9	35A9
Verbesserungen durch...										
gut: in heiterer Gesellschaft					57,6	59,9	-2,3	58,9	-1,3	37A
gut: bei leichter Musik					42,4	43,1	-0,6	42,8	-0,4	37B
gut: nach Gymnastik					38,4	43,1	-4,7	41,1	-2,7	37C
gut: nach dem Schlafen					43,4	40,9	2,6	42,0	1,5	37D
gut: in frischer Luft					67,7	70,1	-2,4	69,1	-1,4	37E
gut: nach Entspannungsübungen					36,4	38,0	-1,6	37,3	-0,9	37F
gut: nach dem Schwimmen					17,2	23,4	-6,2	20,8	-3,6	37G
Krankheitsverlauf										
					06 SYM %	Rigor dominant	Rigor nicht dominant	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Krankheitsverlauf, Symptomatik										
32 Äquivalenztyp J/N					0,0	54,0	-54,0	31,4	-31,4	32EQUI
32 Rigordominanztyp J/N								42,0		32RIGO
32 Tremordominanztyp J/N					0,0	46,0	-46,0	26,7	-26,7	32TREM
Beschwerden seit Diag. schlimmer?					78,8	78,8	0,0	78,8	0,0	33BS
Versteifung seit Diagnose besser?					28,3	18,2	10,0	22,5	5,8	33VB
Versteifung seit Diagnose schlimmer?					74,7	43,1	31,7	56,4	18,4	33VS
Zittern seit Diagnose gebessert?					27,3	30,7	-3,4	29,2	-2,0	33ZB
Zittern seit Diagnose zugenommen?					26,3	69,3	-43,1	63,1	-36,9	33ZS
offene Fragen										
					08 OFF Anzahl	Rigor dominant	Rigor nicht dominant	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Verweise auf Ergebnisse offener Fragen										
Anzahl Medikamente heute					3,3	2,8	0,4	3,0	0,3	ANZ30H
Angaben zu 31 Ärzten					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ANZ31ARZ
Angaben zu 31 Behandlungen					3,7	3,0	0,7	3,3	0,4	ANZ31BEH
Anzahl Medikamente V31					0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	ANZ31SUM
Anzahl verschlechternde Umstände (offene Listen)					0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	ANZ36OFF
Anzahl verbessernde Umstände (offene Listen)					0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	ANZ37OFF
Anzahl erwähnenswerte Belastungen (offene Listen)					0,6	0,4	0,2	0,5	0,1	ANZ38OFF
Angaben (offen) zu Krankheitsursachen					7,6	6,5	1,1	7,0	0,6	ANZ6
Angaben zu frühsymptomen					4,3	4,1	0,2	4,1	0,2	ANZ7
Indexe										
					10 INDEX Index!	Rigor dominant	Rigor nicht dominant	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Indexvariablen										
In gespannten Verhältnissen gelebt					4,3	4,7	-0,4	4,6	-0,2	21
Was früher gegessen?					1,6	1,6	-0,1	1,6	0,0	23
beruflicher Aufstieg2					0,5	0,4	0,1			AUFST

beruflicher Aufstieg			0,8	0,7	0,1	0,7	0,0	UFSTEIG
Vorlaufsymptome & Lebensalter		11 Jr Jahre	Rigor dominant	Rigor nicht dominant	Differenz	Durch- schnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Zusammenhang mit Lebensalter								41
Alter: Zum Zeitpunkt der Befragung			64,2	67,2	-3,0	66,0	-1,7	LA00C
Alter: Berufsaufgabe			57,1	54,9	2,2	55,8	1,3	LA03J
Alter: Diagnose PK			57,3	59,7	-2,4	58,7	-1,4	LA04J
Alter: Auftreten typ. Pk-Beschwerden			55,1	54,7	0,4	54,9	0,2	LA05J
Alter: Muskelverspannungen			51,0	50,0	1,1	50,5	0,6	LA07AJ
Alter: Gelenk- oder Muskelschmerzen			48,9	50,4	-1,4	49,7	-0,7	LA07BJ
Alter: Schlafstörungen			49,4	49,0	0,3	46,7	2,7	LA07CJ
Alter: Kopfschmerzen im Hinterkopf			48,5	46,2	2,4	47,2	1,3	LA07DJ
Alter: Nachlassen des Geruchssinns			52,0	54,6	-2,5	53,6	-1,5	LA07EJ
Alter: Tränen der Augen			59,9	55,3	4,6	57,0	2,9	LA07FJ
Alter: kleinere/unsichere Schrift			54,1	56,9	-2,8	55,4	-1,3	LA07GJ
Alter: Leiseres Sprechen			56,0	57,9	-1,9	57,1	-1,1	LA07HJ
Alter: Gedrücktere Stimmung			53,0	53,7	-0,7	52,4	0,7	LA07IJ
Alter: deutlicher Anzeichen Vergeßlichkeit			51,3	54,4	-3,1	52,2	-0,9	LA09J
Alter: Beginn Spiel eines Musikinstrumentes			18,0	17,4	0,6	17,5	0,5	LA16B
Alter: Aufgabe Spiel eines Musikinstrumentes			34,1	40,6	-6,4	38,2	-4,1	LA16E
Alter: Beginn Rauchen			22,3	22,8	-0,5	18,2	4,1	LA17AJ
Alter: Aufgabe Rauchen			44,9	48,1	-3,1	46,6	-1,7	LA17EJ
Alter: Beginn trauriger Verstimmungen/Depris			55,3	57,8	-2,5	56,7	-1,3	LA34AJ
Alter: Ende trauriger Verstimmungen/Depris			61,5	66,6	-5,0	63,6	-2,1	LA34EJ
Zusammenhang mit Jahr der PK-Diagnose								42
Seit wieviel Jahren Parkinson?			6,8	7,3	-0,5	7,1	-0,3	PK03K_JAHRE
Berufsaustritt/Aufgabe J			-2,0	-5,6	3,6	-4,2	2,1	PK03J
typische PK-Beschw. (retrospektiv)			-2,5	-3,8	1,3	-3,2	0,7	PK05J
Zeitl.Zus.Pk: Muskelverspannung			-8,3	-7,2	-1,1	-7,5	-0,8	PK07AJ
Zeitl.Zus.Pk: Gelenk-/bzw. Muskelschmerzen			-9,5	-9,5	0,0	-9,4	-0,1	PK07BJ
Zeitl.Zus.Pk: Schlafstörungen x Jahre vor (-) bzw. nach(+) PK-Di			-7,2	-10,0	2,8	-11,7	4,5	PK07CJ
Zeitl.Zus.Pk: Kopfschmerzen im Hinterkopf			-9,6	-13,6	4,0	-11,7	2,1	PK07DJ
Zeitl.Zus.Pk: Nachlassen Geruchssinn			-7,6	-4,4	-3,1	-5,4	-2,2	PK07EJ
Zeitl.Zus.Pk: Tränen der Augen			-2,7	-5,4	2,7	-4,3	1,6	PK07FJ
Zeitl.Zus.Pk: Kleinere (oder unsichere) Schrift			-2,2	-1,5	-0,7	-2,2	0,0	PK07GJ
Zeitl.Zus.Pk: Leiseres Sprechen			-1,0	-0,4	-0,6	-0,6	-0,5	PK07HJ
Zeitl.Zus.Pk: Gedrückte Stimmung			-3,9	-3,6	-0,4	-4,8	0,8	PK07IJ
Zeitl.Zus.Pk: deutl. Anz. von Vergeßlichkeit			-7,7	-5,7	-2,0	-7,3	-0,5	PK09J
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Musizieren			-37,5	-43,9	6,4	-41,3	3,7	PK16BJ
Zeitl.Zus.Pk: Ende Musizieren			-21,4	-20,8	-0,6	-20,3	-1,1	PK16EJ
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Rauchen			-35,8	-34,5	-1,4	-38,0	2,1	PK17AJ
Zeitl.Zus.Pk: Aufgabe des Rauchens			-11,3	-9,6	-1,7	-12,3	1,0	PK17EJ
Zeitl.Zus.Pk: Depressionsbeginn			-0,8	-1,2	0,4	-0,9	0,2	PK34AJ
Zeitl.Zus.Pk: Ende Depressionen			5,5	7,5	-2,0	6,3	-0,8	PK34EJ
Dauer								43
Dauer Musizieren			16,1	23,1	-7,0	19,6	-3,4	DAUR16
Dauer Rauchen			22,6	25,2	-2,6	23,3	-0,7	DAUR17
Dauer Depressionen			6,5	8,3	-1,9	7,6	-1,1	DAUR34