

32 Tremordominanztyp (Zittern) J/N

32TREM

allgemeine Angaben		00ALL %	Zittern (Tremor) dominant	Tremor (Zittern) nicht	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
allgemeine Fragen								0
Männerquote (Frauenquote = 100% - Männerquote)			39,7	67,1	-27,4	59,3	-19,6	00B
Anzahl Probanden			63,0	173,0	110,0	236,0	-173,0	01SIGEL
Wert/Code			1,0	0,0	1,0	9,0	-8,0	Value
Lebenseinstellung		01LEB %	Zittern (Tremor) dominant	Tremor (Zittern) nicht	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Selbsteinschätzung								11
ernst			44,4	41,0	3,4	42,0	2,5	11.1
pflichtbewußt			79,4	86,7	-7,3	84,8	-5,4	11.2
strebsam			47,6	53,2	-5,6	51,7	-4,1	11.3
gründlich			49,2	57,8	-8,6	55,5	-6,3	11.4
Empfindsam, "dünnhäutig"			50,8	52,0	-1,2	51,7	-0,9	11.5
fröhlich			28,6	37,0	-8,4	34,8	-6,2	11.6
spontan			14,3	22,0	-7,7	19,9	-5,6	11.7
leichtlebig			0,0	4,6	-4,6	3,4	-3,4	11.8
humorvoll			19,0	31,2	-12,2	28,0	-8,9	11.9
musikalische Betätigung								12
Instrument gespielt?			17,5	25,4	-8,0	27,5	-10,1	16A
psychosoziale Faktoren								13
Spannungen: im Beruf			17,5	34,1	-16,6	29,7	-12,2	21BER
Spannungen: in der Familie			54,0	45,1	8,9	47,5	6,5	21FAM
Spannungen: im Freundes/Bekanntkreis			4,8	4,6	0,1	4,7	0,1	21FREU
Neigung eigene Gefühle zu unterdrücken			60,3	67,6	-7,3	65,7	-5,4	22
Depressionsquote			19,0	38,7	-19,7	64,4	-45,4	34JN
Ernährung, Verdauung, Genußmittel		02ERN %	Zittern (Tremor) dominant	Tremor (Zittern) nicht	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Ernährung allgemein								20
Viel Obst und Rohkost im Jahr. vor Erkrankung			52,4	56,1	-3,7	55,1	-2,7	24
Gerne süße Speisen/Cola/Limo			74,6	81,5	-6,9	79,7	-5,1	26A
Heißhunger auf Süßes			39,7	53,8	-14,1	50,0	-10,3	26B
Konnte Mahlzeit auslassen			58,7	67,6	-8,9	65,3	-6,5	27A
Aß Kleinigkeit zwischen Mahlzeiten			28,6	42,2	-13,6	38,6	-10,0	27B
Nahrungsgewohnheiten geändert			31,7	35,3	-3,5	34,3	-2,6	35
Verdauungsbeschwerden								22
Verdauungsbeschwerde Blähungen			34,9	35,3	-0,3	35,2	-0,2	28BLAE
Verdauungsbeschwerde Durchfall			3,2	6,4	-3,2	5,5	-2,3	28DURC
Verdauungsbeschwerde Verstopfung			34,9	43,9	-9,0	41,5	-6,6	28VERS
Kaffee/Tee								25
Kaffeetrinker			63,5	69,4	-5,9	69,9	-6,4	20KAF
Teetrinker			47,6	49,1	-1,5	52,0	-4,4	20TEE
Anzahl Tassen Kaffee/Tag			2,3	2,4	-0,1	2,4	-0,1	20KTA
Anzahl Tassen Tee/Tag			1,2	1,4	-0,2	1,3	-0,1	20TTA
Alkohol								26
Alkohol Verträglichkeitsquote			49,2	69,4	-20,2	68,0	-18,8	19
Wein vertragen			30,2	31,2	-1,1	30,9	-0,8	19C1
Sekt vertragen			17,5	20,8	-3,3	19,9	-2,5	19C2
Bier vertragen			28,6	35,8	-7,3	33,9	-5,3	19C3
Branntwein vertragen			7,9	8,7	-0,7	8,5	-0,5	19C4
Likör vertragen			19,0	9,8	9,2	12,3	6,8	19C5
Rauchen								27
Wie stark geraucht?			25,4	33,5	-8,1	0,4	25,0	17S
Konstitution		03KON %	Zittern (Tremor) dominant	Tremor (Zittern) nicht	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Belastung und Belastbarkeit								32
Erblichkeitsquotient			7,9	14,5	-6,5	12,7	-4,8	10

Wie belastbar früher?					79,4	79,2	0,2	79,2	0,1	12A	
Wie belastet im Jahrz. vor Parkinson?					66,7	65,3	1,3	65,7	1,0	12B	
Konstitution, Schlaf											
Wie groß war Schlafbedarf?					47,6	54,9	-7,3	53,0	-5,4	13	
Ich ging gerne früh schlafen.					42,9	46,8	-4,0	45,8	-2,9	13B	
War früh schlafen möglich?					50,8	50,9	-0,1	50,9	-0,1	13C	
Konstitution, sportliche Betätigung											
Sport, Jogging, Gymn. (Jahrz. vor PK)					38,1	42,8	-4,7	41,5	-3,4	15A	
Wie häufig Gymnastik (Jahrz. vor PK)					25,4	22,5	2,9	23,3	2,1	15GYM	
Wie häufig Jogging (Jahrz. vor PK)					4,8	9,2	-4,5	8,1	-3,3	15JOG	
Wie oft Sport (Jahrz. vor PK)					23,8	27,2	-3,4	26,3	-2,5	15SPO	
Einflußfaktoren auf Symptomatik											
					05COP %	Zittern (Tremor) dominant	Tremor (Zittern) nicht	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Verschlechterungen durch ...											
schlechter: Überanstrengung					63,5	64,7	-1,2	64,4	-0,9	35A1	
schlechter Aufregung,Sorge					77,8	76,3	1,5	76,7	1,1	35A2	
schlechter: Hetze					66,7	66,5	0,2	66,5	0,1	35A3	
schlechter: Zu wenig Schlaf					28,6	35,8	-7,3	33,9	-5,3	35A4	
schlechter: Zu wenig Trinken					4,8	15,0	-10,3	12,3	-7,5	35A5	
schlechter: Klimastürze					54,0	57,2	-3,3	56,4	-2,4	35A6	
schlechter: Hitze					38,1	38,7	-0,6	38,6	-0,5	35A7	
schlechter: Schlechte Luft					31,7	30,6	1,1	30,9	0,8	35A8	
schlechter: Tabakrauch					20,6	25,4	-4,8	24,2	-3,5	35A9	
Verbesserungen durch...											
gut: in heiterer Gesellschaft					55,6	60,1	-4,6	58,9	-3,3	37A	
gut: bei leichter Musik					38,1	44,5	-6,4	42,8	-4,7	37B	
gut: nach Gymnastik					36,5	42,8	-6,3	41,1	-4,6	37C	
gut: nach dem Schlafen					44,4	41,0	3,4	42,0	2,5	37D	
gut: in frischer Luft					69,8	68,8	1,1	69,1	0,8	37E	
gut: nach Entspannungsübungen					34,9	38,2	-3,2	37,3	-2,4	37F	
gut: nach dem Schwimmen					23,8	19,7	4,2	20,8	3,0	37G	
Krankheitsverlauf											
					06SYM %	Zittern (Tremor) dominant	Tremor (Zittern) nicht	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Krankheitsverlauf, Symptomatik											
32 Äquivalenztyp J/N					0,0	42,8	-42,8	31,4	-31,4	32EQUI	
32 Rigordominanztyp J/N					0,0	57,2	-57,2	42,0	-42,0	32RIGO	
32 Tremordominanztyp J/N								26,7		32TREM	
Beschwerden seit Diag. schlimmer?					79,4	78,6	0,8	78,8	0,6	33BS	
Versteifung seit Diagnose besser?					14,3	25,4	-11,1	22,5	-8,2	33VB	
Versteifung seit Diagnose schlimmer?					23,8	68,2	-44,4	56,4	-32,6	33VS	
Zittern seit Diagnose gebessert?					33,3	27,7	5,6	29,2	4,1	33ZB	
Zittern seit Diagnose zugenommen?					73,0	43,4	29,7	63,1	9,9	33ZS	
offene Fragen											
					08OFF Anzahl	Zittern (Tremor) dominant	Tremor (Zittern) nicht	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Verweise auf Ergebnisse offener Fragen											
Anzahl Medikamente heute					2,7	3,1	-0,4	3,0	-0,3	ANZ30H	
Angaben zu 31 Ärzten					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	NZ31ARZ	
Angaben zu 31 Behandlungen					3,2	3,4	-0,2	3,3	-0,1	NZ31BEH	
Anzahl Medikamente V31					0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	NZ31SUM	
Anzahl verschlechternde Umstände (offene Listen)					0,1	0,3	-0,2	0,2	-0,1	NZ36OFF	
Anzahl verbessernde Umstände (offene Listen)					0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	NZ37OFF	
Anzahl erwähnenswerte Belastungen (offene Listen)					0,4	0,5	-0,1	0,5	-0,1	NZ38OFF	
Angaben (offen) zu Krankheitsursachen					6,9	7,0	-0,2	7,0	-0,1	ANZ6	
Angaben zu frühsymptomen					3,6	4,4	-0,8	4,1	-0,5	ANZ7	
Indexe											
					10NDX Index!	Zittern (Tremor) dominant	Tremor (Zittern) nicht	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Indexvariablen											
In gespannten Verhältnissen gelebt					4,4	4,6	-0,3	4,6	-0,2	21	
Was früher gegessen?					1,7	1,6	0,1	1,6	0,1	23	
beruflicher Aufstieg2					0,4	0,5	0,0			AUFST	

beruflicher Aufstieg			0,8	0,7	0,1	0,7	0,1	UFSTEIG
Vorlaufsymptome & Lebensalter		11 Jr Jahre	Zittern (Tremor) dominant	Tremor (Zittern) nicht	Differenz	Durch- schnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Zusammenhang mit Lebensalter								
41								
Alter: Zum Zeitpunkt der Befragung			69,0	64,9	4,1	66,0	3,0	LA00C
Alter: Berufsaufgabe			55,8	55,8	0,0	55,8	0,0	LA03J
Alter: Diagnose PK			62,0	57,5	4,4	58,7	3,3	LA04J
Alter: Auftreten typ. Pk-Beschwerden			57,6	53,9	3,7	54,9	2,7	LA05J
Alter: Muskelverspannungen			51,2	50,3	0,9	50,5	0,7	LA07AJ
Alter: Gelenk- oder Muskelschmerzen			51,4	49,1	2,3	49,7	1,8	LA07BJ
Alter: Schlafstörungen			52,7	47,8	4,9	46,7	6,1	LA07CJ
Alter: Kopfschmerzen im Hinterkopf			45,7	47,5	-1,8	47,2	-1,5	LA07DJ
Alter: Nachlassen des Geruchssinns			56,3	52,8	3,5	53,6	2,7	LA07EJ
Alter: Tränen der Augen			54,0	57,7	-3,7	57,0	-3,0	LA07FJ
Alter: kleinere/unsichere Schrift			58,7	55,0	3,7	55,4	3,3	LA07GJ
Alter: Leiseres Sprechen			59,2	56,6	2,6	57,1	2,1	LA07HJ
Alter: Gedrücktere Stimmung			53,2	53,4	-0,2	52,4	0,8	LA07IJ
Alter: deutlicher Anzeichen Vergeßlichkeit			54,5	52,8	1,7	52,2	2,3	LA09J
Alter: Beginn Spiel eines Musikinstrumentes			17,3	17,8	-0,6	17,5	-0,2	LA16B
Alter: Aufgabe Spiel eines Musikinstrumentes			43,4	35,8	7,6	38,2	5,1	LA16E
Alter: Beginn Rauchen			23,7	22,3	1,4	18,2	5,5	LA17AJ
Alter: Aufgabe Rauchen			47,3	46,4	1,0	46,6	0,7	LA17EJ
Alter: Beginn trauriger Verstimmungen/Depris			60,7	55,7	5,0	56,7	4,0	LA34AJ
Alter: Ende trauriger Verstimmungen/Depris			67,6	63,1	4,5	63,6	4,0	LA34EJ
Zusammenhang mit Jahr der PK-Diagnose								
42								
Seit wieviel Jahren Parkinson?			6,9	7,2	-0,3	7,1	-0,2	PK03K_JAHRE
Berufsaustritt/Aufgabe J			-7,6	-2,8	-4,8	-4,2	-3,4	PK03J
typische PK-Beschw. (retrospektiv)			-3,2	-3,2	0,0	-3,2	0,0	PK05J
Zeitl.Zus.Pk: Muskelverspannung			-7,7	-7,7	0,0	-7,5	-0,2	PK07AJ
Zeitl.Zus.Pk: Gelenk-/bzw. Muskelschmerzen			-10,4	-9,2	-1,2	-9,4	-1,0	PK07BJ
Zeitl.Zus.Pk: Schlafstörungen x Jahre vor (-) bzw. nach(+) PK-Di			-10,7	-8,2	-2,5	-11,7	1,0	PK07CJ
Zeitl.Zus.Pk: Kopfschmerzen im Hinterkopf			-14,2	-11,4	-2,8	-11,7	-2,5	PK07DJ
Zeitl.Zus.Pk: Nachlassen Geruchssinn			-6,5	-5,4	-1,1	-5,4	-1,2	PK07EJ
Zeitl.Zus.Pk: Tränen der Augen			-11,6	-2,8	-8,8	-4,3	-7,3	PK07FJ
Zeitl.Zus.Pk: Kleinere (oder unsicherere) Schrift			-2,1	-1,6	-0,5	-2,2	0,0	PK07GJ
Zeitl.Zus.Pk: Leiseres Sprechen			-0,6	-0,7	0,1	-0,6	0,0	PK07HJ
Zeitl.Zus.Pk: Gedrückte Stimmung			-3,3	-3,8	0,5	-4,8	1,4	PK07IJ
Zeitl.Zus.Pk: deutl. Anz. von Vergeßlichkeit			-3,6	-7,3	3,7	-7,3	3,6	PK09J
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Musizieren			-45,5	-39,5	-6,0	-41,3	-4,2	PK16BJ
Zeitl.Zus.Pk: Ende Musizieren			-19,4	-21,5	2,2	-20,3	0,9	PK16EJ
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Rauchen			-35,3	-35,1	-0,2	-38,0	2,6	PK17AJ
Zeitl.Zus.Pk: Aufgabe des Rauchens			-11,7	-10,1	-1,6	-12,3	0,6	PK17EJ
Zeitl.Zus.Pk: Depressionsbeginn			-0,3	-1,1	0,7	-0,9	0,6	PK34AJ
Zeitl.Zus.Pk: Ende Depressionen			6,6	6,4	0,2	6,3	0,3	PK34EJ
Dauer								
43								
Dauer Musizieren			26,1	17,9	8,2	19,6	6,5	DAUR16
Dauer Rauchen			23,6	24,1	-0,5	23,3	0,3	DAUR17
Dauer Depressionen			6,7	7,4	-0,8	7,6	-0,9	DAUR34