

Beschwerden seit Diag. schlimmer?

33BS

allgemeine Angaben		00ALL %	ja, Beschwerden schlimmer	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
allgemeine Fragen								0
Männerquote (Frauenquote = 100% - Männerquote)			62,4	50,0	12,4	59,3	3,1	00B
Anzahl Probanden			186,0	50,0	136,0	236,0	-50,0	01SIGEL
Wert/Code			1,0	0,0	1,0	9,0	-8,0	Value
Lebenseinstellung		01LEB %	ja, Beschwerden schlimmer	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Selbsteinschätzung								11
ernst			44,1	34,0	10,1	42,0	2,1	11.1
pflichtbewußt			84,9	84,0	0,9	84,8	0,2	11.2
strebsam			54,3	42,0	12,3	51,7	2,6	11.3
gründlich			54,8	58,0	-3,2	55,5	-0,7	11.4
Empfindsam, "dünnhäutig"			52,2	50,0	2,2	51,7	0,5	11.5
fröhlich			30,6	50,0	-19,4	34,8	-4,1	11.6
spontan			19,4	22,0	-2,6	19,9	-0,6	11.7
leichtlebig			3,8	2,0	1,8	3,4	0,4	11.8
humorvoll			28,0	28,0	0,0	28,0	0,0	11.9
musikalische Betätigung								12
Instrument gespielt?			22,6	26,0	-3,4	27,5	-5,0	16A
psychosoziale Faktoren								13
Spannungen: im Beruf			32,8	18,0	14,8	29,7	3,1	21BER
Spannungen: in der Familie			47,3	48,0	-0,7	47,5	-0,1	21FAM
Spannungen: im Freundes/Bekanntkreis			4,8	4,0	0,8	4,7	0,2	21FREU
Neigung eigene Gefühle zu unterdrücken			66,7	62,0	4,7	65,7	1,0	22
Depressionsquote			34,9	28,0	6,9	64,4	-29,5	34JN
Ernährung, Verdauung, Genußmittel		02ERN %	ja, Beschwerden schlimmer	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Ernährung allgemein								20
Viel Obst und Rohkost im Jahr. vor Erkrankung			55,9	52,0	3,9	55,1	0,8	24
Gerne süße Speisen/Cola/Limo			79,6	80,0	-0,4	79,7	-0,1	26A
Heißhunger auf Süßes			47,8	58,0	-10,2	50,0	-2,2	26B
Konnte Mahlzeit auslassen			62,4	76,0	-13,6	65,3	-2,9	27A
Aß Kleinigkeit zwischen Mahlzeiten			36,6	46,0	-9,4	38,6	-2,0	27B
Nahrungsgewohnheiten geändert			32,3	42,0	-9,7	34,3	-2,1	35
Verdauungsbeschwerden								22
Verdauungsbeschwerde Blähungen			34,4	38,0	-3,6	35,2	-0,8	28BLAE
Verdauungsbeschwerde Durchfall			5,9	4,0	1,9	5,5	0,4	28DURC
Verdauungsbeschwerde Verstopfung			40,3	46,0	-5,7	41,5	-1,2	28VERS
Kaffee/Tee								25
Kaffeetrinker			65,6	76,0	-10,4	69,9	-4,3	20KAF
Teetrinker			49,5	46,0	3,5	52,0	-2,5	20TEE
Anzahl Tassen Kaffee/Tag			2,3	2,7	-0,3	2,4	-0,1	20KTA
Anzahl Tassen Tee/Tag			1,3	1,3	0,1	1,3	0,0	20TTA
Alkohol								26
Alkohol Verträglichkeitsquote			62,9	68,0	-5,1	68,0	-5,1	19
Wein vertragen			33,3	22,0	11,3	30,9	2,4	19C1
Sekt vertragen			21,0	16,0	5,0	19,9	1,0	19C2
Bier vertragen			36,6	24,0	12,6	33,9	2,7	19C3
Branntwein vertragen			8,1	10,0	-1,9	8,5	-0,4	19C4
Likör vertragen			12,4	12,0	0,4	12,3	0,1	19C5
Rauchen								27
Wie stark geraucht?			31,7	30,0	1,7	0,4	31,4	17S
Konstitution		03KON %	ja, Beschwerden schlimmer	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Belastung und Belastbarkeit								32
Erblichkeitsquotient			11,3	18,0	-6,7	12,7	-1,4	10

Wie belastbar früher?					79,0	80,0	-1,0		79,2	-0,2	12A
Wie belastet im Jahrz. vor Parkinson?					62,9	76,0	-13,1		65,7	-2,8	12B
Konstitution, Schlaf											
Wie groß war Schlafbedarf?					50,0	64,0	-14,0		53,0	-3,0	13
Ich ging gerne früh schlafen.					44,1	52,0	-7,9		45,8	-1,7	13B
War früh schlafen möglich?					48,9	58,0	-9,1		50,9	-1,9	13C
Konstitution, sportliche Betätigung											
Sport, Jogging, Gymn. (Jahrz. vor PK)					40,9	44,0	-3,1		41,5	-0,7	15A
Wie häufig Gymnastik (Jahrz. vor PK)					21,5	30,0	-8,5		23,3	-1,8	15GYM
Wie häufig Jogging (Jahrz. vor PK)					8,1	8,0	0,1		8,1	0,0	15JOG
Wie oft Sport (Jahrz. vor PK)					25,8	28,0	-2,2		26,3	-0,5	15SPO
Einflußfaktoren auf Symptomatik											
					05COP	ja, Beschwerden schlimmer	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Verschlechterungen durch ...											
schlechter: Überanstrengung					66,1	58,0	8,1		64,4	1,7	36A1
schlechter Aufregung,Sorge					78,5	70,0	8,5		76,7	1,8	36A2
schlechter: Hetze					69,4	56,0	13,4		66,5	2,8	36A3
schlechter: Zu wenig Schlaf					37,6	20,0	17,6		33,9	3,7	36A4
schlechter: Zu wenig Trinken					13,4	8,0	5,4		12,3	1,2	36A5
schlechter: Klimastürze					64,0	28,0	36,0		56,4	7,6	36A6
schlechter: Hitze					42,5	24,0	18,5		38,6	3,9	36A7
schlechter: Schlechte Luft					35,5	14,0	21,5		30,9	4,6	36A8
schlechter: Tabakrauch					24,7	22,0	2,7		24,2	0,6	36A9
Verbesserungen durch...											
gut: in heiterer Gesellschaft					58,6	60,0	-1,4		58,9	-0,3	37A
gut: bei leichter Musik					43,0	42,0	1,0		42,8	0,2	37B
gut: nach Gymnastik					39,2	48,0	-8,8		41,1	-1,9	37C
gut: nach dem Schlafen					41,4	44,0	-2,6		42,0	-0,6	37D
gut: in frischer Luft					69,9	66,0	3,9		69,1	0,8	37E
gut: nach Entspannungsübungen					38,2	34,0	4,2		37,3	0,9	37F
gut: nach dem Schwimmen					18,8	28,0	-9,2		20,8	-1,9	37G
Krankheitsverlauf											
					06SYM	ja, Beschwerden schlimmer	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Krankheitsverlauf, Symptomatik											
32 Äquivalenztyp J/N					31,2	32,0	-0,8		31,4	-0,2	32EQUI
32 Rigordominanztyp J/N					41,9	42,0	-0,1		42,0	0,0	32RIGO
32 Tremordominanztyp J/N					26,9	26,0	0,9		26,7	0,2	32TREM
Beschwerden seit Diag. schlimmer?									78,8		33BS
Versteifung seit Diagnose besser?					15,6	48,0	-32,4		22,5	-6,9	33VB
Versteifung seit Diagnose schlimmer?					70,4	4,0	66,4		56,4	14,1	33VS
Zittern seit Diagnose gebessert?					21,5	58,0	-36,5		29,2	-7,7	33ZB
Zittern seit Diagnose zugenommen?					64,5	2,0	62,5		63,1	1,4	33ZS
offene Fragen											
					08OFF	ja, Beschwerden schlimmer	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Verweise auf Ergebnisse offener Fragen											
Anzahl Medikamente heute					3,2	2,3	0,9		3,0	0,2	ANZ30H
Angaben zu 31 Ärzten					0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	ANZ31ARZ
Angaben zu 31 Behandlungen					3,4	3,1	0,3		3,3	0,1	ANZ31BEH
Anzahl Medikamente V31					0,2	0,2	0,0		0,2	0,0	ANZ31SUM
Anzahl verschlechternde Umstände (offene Listen)					0,3	0,1	0,1		0,2	0,0	ANZ36OFF
Anzahl verbessernde Umstände (offene Listen)					0,2	0,2	0,1		0,2	0,0	ANZ37OFF
Anzahl erwähnenswerte Belastungen (offene Listen)					0,5	0,3	0,2		0,5	0,0	ANZ38OFF
Angaben (offen) zu Krankheitsursachen					7,3	5,9	1,3		7,0	0,3	ANZ6
Angaben zu frühsymptomen					4,2	3,8	0,4		4,1	0,1	ANZ7
Indexe											
					10NDX	ja, Beschwerden schlimmer	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Indexvariablen											
In gespannten Verhältnissen gelebt					4,6	4,6	0,0		4,6	0,0	21
Was früher gegessen?					1,6	1,7	-0,1		1,6	0,0	23
beruflicher Aufstieg2					0,5	0,4	0,1				AUFST

beruflicher Aufstieg		0,8	0,5	0,2	0,7	0,0	UFSTEIG
Vorlaufsymptome & Lebensalter		11 Jr Jahre	ja, Beschwerden schlimmer	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Zusammenhang mit Lebensalter							41
Alter: Zum Zeitpunkt der Befragung		65,9	66,2	-0,4	66,0	-0,1	LA00C
Alter: Berufsaufgabe		55,7	56,0	-0,2	55,8	0,0	LA03J
Alter: Diagnose PK		57,5	63,1	-5,6	58,7	-1,2	LA04J
Alter: Auftreten typ. Pk-Beschwerden		53,9	58,7	-4,8	54,9	-1,0	LA05J
Alter: Muskelverspannungen		50,3	51,3	-1,0	50,5	-0,2	LA07AJ
Alter: Gelenk- oder Muskelschmerzen		50,4	47,3	3,1	49,7	0,7	LA07BJ
Alter: Schlafstörungen		49,0	50,1	-1,1	46,7	2,4	LA07CJ
Alter: Kopfschmerzen im Hinterkopf		45,9	53,8	-7,8	47,2	-1,3	LA07DJ
Alter: Nachlassen des Geruchssinns		53,6	53,4	0,1	53,6	0,0	LA07EJ
Alter: Tränen der Augen		56,9	57,5	-0,6	57,0	-0,1	LA07FJ
Alter: kleinere/unsichere Schrift		54,3	61,4	-7,1	55,4	-1,0	LA07GJ
Alter: Leiseres Sprechen		55,8	61,4	-5,6	57,1	-1,3	LA07HJ
Alter: Gedrücktere Stimmung		52,9	55,2	-2,2	52,4	0,6	LA07IJ
Alter: deutlicher Anzeichen Vergeßlichkeit		52,7	54,3	-1,7	52,2	0,5	LA09J
Alter: Beginn Spiel eines Musikinstrumentes		17,1	19,6	-2,5	17,5	-0,4	LA16B
Alter: Aufgabe Spiel eines Musikinstrumentes		35,7	42,4	-6,7	38,2	-2,5	LA16E
Alter: Beginn Rauchen		22,4	23,3	-0,9	18,2	4,2	LA17AJ
Alter: Aufgabe Rauchen		45,6	50,4	-4,8	46,6	-1,0	LA17EJ
Alter: Beginn trauriger Verstimmungen/Depris		57,5	51,1	6,4	56,7	0,8	LA34AJ
Alter: Ende trauriger Verstimmungen/Depris		65,1	57,2	7,9	63,6	1,5	LA34EJ
Zusammenhang mit Jahr der PK-Diagnose							42
Seit wieviel Jahren Parkinson?		8,2	3,2	5,0	7,1	1,1	K_JAHRE
Berufsaustritt/Aufgabe J		-3,2	-8,2	5,0	-4,2	1,0	PK03J
typische PK-Beschw. (retrospektiv)		-3,2	-3,1	-0,1	-3,2	0,0	PK05J
Zeittl.Zus.Pk: Muskelverspannung		-7,5	-8,4	0,9	-7,5	0,0	PK07AJ
Zeittl.Zus.Pk: Gelenk-/bzw. Muskelschmerzen		-8,5	-12,9	4,3	-9,4	0,9	PK07BJ
Zeittl.Zus.Pk: Schlafstörungen x Jahre vor (-) bzw. nach(+) PK-Di		-9,2	-7,5	-1,7	-11,7	2,5	PK07CJ
Zeittl.Zus.Pk: Kopfschmerzen im Hinterkopf		-12,8	-6,9	-5,9	-11,7	-1,0	PK07DJ
Zeittl.Zus.Pk: Nachlassen Geruchssinn		-5,6	-6,0	0,4	-5,4	-0,2	PK07EJ
Zeittl.Zus.Pk: Tränen der Augen		-3,2	-10,4	7,2	-4,3	1,1	PK07FJ
Zeittl.Zus.Pk: Kleinere (oder unsicherere) Schrift		-1,5	-2,7	1,1	-2,2	0,7	PK07GJ
Zeittl.Zus.Pk: Leiseres Sprechen		-0,2	-2,3	2,1	-0,6	0,4	PK07HJ
Zeittl.Zus.Pk: Gedrückte Stimmung		-3,5	-4,5	1,0	-4,8	1,2	PK07IJ
Zeittl.Zus.Pk: deutl. Anz. von Vergeßlichkeit		-6,1	-7,7	1,6	-7,3	1,2	PK09J
Zeittl.Zus.Pk: Beginn Musizieren		-39,5	-44,3	4,8	-41,3	1,7	PK16BJ
Zeittl.Zus.Pk: Ende Musizieren		-21,0	-21,5	0,6	-20,3	-0,7	PK16EJ
Zeittl.Zus.Pk: Beginn Rauchen		-34,6	-37,2	2,6	-38,0	3,4	PK17AJ
Zeittl.Zus.Pk: Aufgabe des Rauchens		-10,5	-10,1	-0,4	-12,3	1,8	PK17EJ
Zeittl.Zus.Pk: Depressionsbeginn		-0,6	-2,8	2,2	-0,9	0,3	PK34AJ
Zeittl.Zus.Pk: Ende Depressionen		6,9	3,6	3,4	6,3	0,7	PK34EJ
Dauer							43
Dauer Musizieren		18,6	22,8	-4,2	19,6	-1,0	DAUR16
Dauer Rauchen		23,2	27,1	-3,9	23,3	-0,1	DAUR17
Dauer Depressionen		7,6	6,2	1,4	7,6	0,0	DAUR34