

schlechter: Tabakrauch

36A9

allgemeine Angaben		00ALL %	Tabakrauch	nein/k. A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
allgemeine Fragen								0
Männerquote (Frauenquote = 100% - Männerquote)			59,6	59,8	-0,1	59,3	0,3	00B
Anzahl Probanden			57,0	179,0	122,0	236,0	-179,0	thi SIGEL
Wert/Code			1,0	0,0	1,0	9,0	-8,0	Value
Lebenseinstellung		01LEB %	Tabakrauch	nein/k. A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Selbsteinschätzung								11
ernst			42,1	41,9	0,2	42,0	0,2	11.1
pflichtbewußt			87,7	83,8	3,9	84,8	3,0	11.2
strebsam			71,9	45,3	26,7	51,7	20,2	11.3
gründlich			73,7	49,7	24,0	55,5	18,2	11.4
Empfindsam, "dünnhäutig"			68,4	46,4	22,1	51,7	16,7	11.5
fröhlich			43,9	31,8	12,0	34,8	9,1	11.6
spontan			24,6	18,4	6,1	19,9	4,6	11.7
leichtlebig			5,3	2,8	2,5	3,4	1,9	11.8
humorvoll			31,6	26,8	4,8	28,0	3,6	11.9
musikalische Betätigung								12
Instrument gespielt?			24,6	22,9	1,7	27,5	-3,0	16A
psychosoziale Faktoren								13
Spannungen: im Beruf			42,1	25,7	16,4	29,7	12,4	21BER
Spannungen: in der Familie			57,9	44,1	13,8	47,5	10,4	21FAM
Spannungen: im Freundes/Bekanntkreis			7,0	3,9	3,1	4,7	2,4	21FREU
Neigung eigene Gefühle zu unterdrücken			75,4	62,6	12,9	65,7	9,8	22
Depressionsquote			36,8	32,4	4,4	64,4	-27,6	34JN
Ernährung, Verdauung, Genußmittel		02ERN %	Tabakrauch	nein/k. A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Ernährung allgemein								20
Viel Obst und Rohkost im Jahr. vor Erkrankung			49,1	57,0	-7,9	55,1	-6,0	24
Gerne süße Speisen/Cola/Limo			87,7	77,1	10,6	79,7	8,1	26A
Heißhunger auf Süßes			56,1	48,0	8,1	50,0	6,1	26B
Konnte Mahlzeit auslassen			64,9	65,4	-0,5	65,3	-0,3	27A
Aß Kleinigkeit zwischen Mahlzeiten			36,8	39,1	-2,3	38,6	-1,7	27B
Nahrungsgewohnheiten geändert			52,6	28,5	24,1	34,3	18,3	35
Verdauungsbeschwerden								22
Verdauungsbeschwerde Blähungen			43,9	32,4	11,5	35,2	8,7	28BLAE
Verdauungsbeschwerde Durchfall			10,5	3,9	6,6	5,5	5,0	28DURC
Verdauungsbeschwerde Verstopfung			42,1	41,3	0,8	41,5	0,6	28VERS
Kaffee/Tee								25
Kaffeetrinker			66,7	68,2	-1,5	69,9	-3,2	20KAF
Teetrinker			50,9	48,0	2,8	52,0	-1,1	20TEE
Anzahl Tassen Kaffee/Tag			2,3	2,4	-0,2	2,4	-0,1	20KTA
Anzahl Tassen Tee/Tag			1,4	1,3	0,0	1,3	0,0	20TTA
Alkohol								26
Alkohol Verträglichkeitsquote			63,2	64,2	-1,1	68,0	-4,8	19
Wein vertragen			38,6	28,5	10,1	30,9	7,7	19C1
Sekt vertragen			24,6	18,4	6,1	19,9	4,6	19C2
Bier vertragen			35,1	33,5	1,6	33,9	1,2	19C3
Branntwein vertragen			8,8	8,4	0,4	8,5	0,3	19C4
Likör vertragen			21,1	9,5	11,6	12,3	8,8	19C5
Rauchen								27
Wie stark geraucht?			28,1	32,4	-4,3	0,4	27,7	17S
Konstitution		03KON %	Tabakrauch	nein/k. A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Belastung und Belastbarkeit								32
Erblichkeitsquotient			14,0	12,3	1,7	12,7	1,3	10

Wie belastbar früher?					77,2	79,9	-2,7	79,2	-2,0	12A
Wie belastet im Jahrz. vor Parkinson?					71,9	63,7	8,2	65,7	6,2	12B
Konstitution, Schlaf										
Wie groß war Schlafbedarf?					66,7	48,6	18,1	53,0	13,7	13
Ich ging gerne früh schlafen.					45,6	45,8	-0,2	45,8	-0,1	13B
War früh schlafen möglich?					45,6	52,5	-6,9	50,9	-5,2	13C
Konstitution, sportliche Betätigung										
Sport, Jogging, Gymn. (Jahrz. vor PK)					36,8	43,0	-6,2	41,5	-4,7	15A
Wie häufig Gymnastik (Jahrz. vor PK)					26,3	22,3	4,0	23,3	3,0	15GYM
Wie häufig Jogging (Jahrz. vor PK)					10,5	7,3	3,3	8,1	2,5	15JOG
Wie oft Sport (Jahrz. vor PK)					31,6	24,6	7,0	26,3	5,3	15SPO
Einflußfaktoren auf Symptomatik										
					05 COP %	Tabakrauch	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Verschlechterungen durch ...										
schlechter: Überanstrengung					87,7	57,0	30,7	64,4	23,3	36A1
schlechter Aufregung,Sorge					87,7	73,2	14,5	76,7	11,0	36A2
schlechter: Hetze					86,0	60,3	25,6	66,5	19,4	36A3
schlechter: Zu wenig Schlaf					59,6	25,7	34,0	33,9	25,7	36A4
schlechter: Zu wenig Trinken					29,8	6,7	23,1	12,3	17,5	36A5
schlechter: Klimastürze					82,5	48,0	34,4	56,4	26,1	36A6
schlechter: Hitze					59,6	31,8	27,8	38,6	21,1	36A7
schlechter: Schlechte Luft					80,7	15,1	65,6	30,9	49,8	36A8
schlechter: Tabakrauch								24,2		36A9
Verbesserungen durch...										
gut: in heiterer Gesellschaft					66,7	56,4	10,2	58,9	7,8	37A
gut: bei leichter Musik					59,6	37,4	22,2	42,8	16,8	37B
gut: nach Gymnastik					43,9	40,2	3,6	41,1	2,8	37C
gut: nach dem Schlafen					43,9	41,3	2,5	42,0	1,9	37D
gut: in frischer Luft					87,7	63,1	24,6	69,1	18,6	37E
gut: nach Entspannungsübungen					61,4	29,6	31,8	37,3	24,1	37F
gut: nach dem Schwimmen					35,1	16,2	18,9	20,8	14,3	37G
Krankheitsverlauf										
					06SYM %	Tabakrauch	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Krankheitsverlauf, Symptomatik										
32 Äquivalenztyp J/N					36,8	29,6	7,2	31,4	5,5	32EQUI
32 Rigordominanztyp J/N					40,4	42,5	-2,1	42,0	-1,6	32RIGO
32 Tremordominanztyp J/N					22,8	27,9	-5,1	26,7	-3,9	32TREM
Beschwerden seit Diag. schlimmer?					80,7	78,2	2,5	78,8	1,9	33BS
Versteifung seit Diagnose besser?					28,1	20,7	7,4	22,5	5,6	33VB
Versteifung seit Diagnose schlimmer?					59,6	55,3	4,3	56,4	3,3	33VS
Zittern seit Diagnose gebessert?					40,4	25,7	14,7	29,2	11,1	33ZB
Zittern seit Diagnose zugenommen?					56,1	49,7	6,4	63,1	-7,0	33ZS
offene Fragen										
					08OFF Anzahl	Tabakrauch	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Verweise auf Ergebnisse offener Fragen										
Anzahl Medikamente heute					2,9	3,0	-0,1	3,0	-0,1	ANZ30H
Angaben zu 31 Ärzten					0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	ANZ31ARZ
Angaben zu 31 Behandlungen					3,7	3,2	0,5	3,3	0,4	ANZ31BEH
Anzahl Medikamente V31					0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	ANZ31SUM
Anzahl verschlechternde Umstände (offene Listen)					0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	ANZ36OFF
Anzahl verbessernde Umstände (offene Listen)					0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	ANZ37OFF
Anzahl erwähnenswerte Belastungen (offene Listen)					0,5	0,4	0,0	0,5	0,0	ANZ38OFF
Angaben (offen) zu Krankheitsursachen					7,2	6,9	0,3	7,0	0,2	ANZ6
Angaben zu frühsymptomen					5,1	3,8	1,3	4,1	1,0	ANZ7
Indexe										
					10NDX Index!	Tabakrauch	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Indexvariablen										
In gespannten Verhältnissen gelebt					4,2	4,7	-0,5	4,6	-0,3	21
Was früher gegessen?					1,6	1,6	-0,1	1,6	0,0	23
beruflicher Aufstieg2					0,5	0,4	0,0			AUFST

beruflicher Aufstieg				0,9	0,7	0,2	0,7	0,2	UFSTEIG
Vorlaufsymptome & Lebensalter		11 Jr	Tabakrauch	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt		
		Jahre							
Zusammenhang mit Lebensalter									41
Alter: Zum Zeitpunkt der Befragung				63,6	66,7	-3,1	66,0	-2,3	LA00C
Alter: Berufsaufgabe				54,7	56,1	-1,4	55,8	-1,1	LA03J
Alter: Diagnose PK				56,9	59,2	-2,3	58,7	-1,8	LA04J
Alter: Auftreten typ. Pk-Beschwerden				53,1	55,5	-2,4	54,9	-1,8	LA05J
Alter: Muskelverspannungen				45,4	52,1	-6,6	50,5	-5,0	LA07AJ
Alter: Gelenk- oder Muskelschmerzen				47,1	50,5	-3,5	49,7	-2,6	LA07BJ
Alter: Schlafstörungen				45,5	50,6	-5,1	46,7	-1,2	LA07CJ
Alter: Kopfschmerzen im Hinterkopf				45,0	48,4	-3,5	47,2	-2,3	LA07DJ
Alter: Nachlassen des Geruchssinns				52,7	54,0	-1,2	53,6	-0,8	LA07EJ
Alter: Tränen der Augen				54,1	58,3	-4,1	57,0	-2,9	LA07FJ
Alter: kleinere/unsichere Schrift				54,8	56,3	-1,6	55,4	-0,6	LA07GJ
Alter: Leiseres Sprechen				55,4	57,9	-2,5	57,1	-1,7	LA07HJ
Alter: Gedrücktere Stimmung				53,3	53,4	-0,2	52,4	0,9	LA07IJ
Alter: deutlicher Anzeichen Vergeßlichkeit				49,9	54,3	-4,4	52,2	-2,2	LA09J
Alter: Beginn Spiel eines Musikinstrumentes				19,4	17,1	2,3	17,5	1,9	LA16B
Alter: Aufgabe Spiel eines Musikinstrumentes				39,5	36,5	3,0	38,2	1,3	LA16E
Alter: Beginn Rauchen				21,6	22,9	-1,3	18,2	3,4	LA17AJ
Alter: Aufgabe Rauchen				45,3	46,9	-1,7	46,6	-1,4	LA17EJ
Alter: Beginn trauriger Verstimmungen/Depris				54,0	57,4	-3,4	56,7	-2,7	LA34AJ
Alter: Ende trauriger Verstimmungen/Depris				62,9	64,1	-1,3	63,6	-0,8	LA34EJ
Zusammenhang mit Jahr der PK-Diagnose									42
Seit wieviel Jahren Parkinson?				6,5	7,3	-0,9	7,1	-0,6	PK03K_JAHRE
Berufsaustritt/Aufgabe J				-5,0	-4,0	-1,0	-4,2	-0,8	PK03J
typische PK-Beschw. (retrospektiv)				-3,6	-3,1	-0,5	-3,2	-0,4	PK05J
Zeitl.Zus.Pk: Muskelverspannung				-9,8	-7,0	-2,7	-7,5	-2,3	PK07AJ
Zeitl.Zus.Pk: Gelenk-/bzw. Muskelschmerzen				-10,9	-9,1	-1,9	-9,4	-1,5	PK07BJ
Zeitl.Zus.Pk: Schlafstörungen x Jahre vor (-) bzw. nach(+) PK-Di				-9,6	-8,6	-1,0	-11,7	2,1	PK07CJ
Zeitl.Zus.Pk: Kopfschmerzen im Hinterkopf				-12,4	-11,6	-0,8	-11,7	-0,7	PK07DJ
Zeitl.Zus.Pk: Nachlassen Geruchssinn				-5,7	-5,6	-0,1	-5,4	-0,4	PK07EJ
Zeitl.Zus.Pk: Tränen der Augen				-8,2	-2,7	-5,5	-4,3	-3,9	PK07FJ
Zeitl.Zus.Pk: Kleinere (oder unsicherere) Schrift				-2,5	-1,4	-1,1	-2,2	-0,3	PK07GJ
Zeitl.Zus.Pk: Leiseres Sprechen				-2,4	0,1	-2,4	-0,6	-1,8	PK07HJ
Zeitl.Zus.Pk: Gedrückte Stimmung				-4,0	-3,6	-0,3	-4,8	0,8	PK07IJ
Zeitl.Zus.Pk: deutl. Anz. von Vergeßlichkeit				-9,5	-5,4	-4,1	-7,3	-2,3	PK09J
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Musizieren				-38,4	-41,4	3,0	-41,3	2,8	PK16BJ
Zeitl.Zus.Pk: Ende Musizieren				-18,4	-22,0	3,7	-20,3	1,9	PK16EJ
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Rauchen				-38,8	-34,1	-4,7	-38,0	-0,9	PK17AJ
Zeitl.Zus.Pk: Aufgabe des Rauchens				-13,1	-9,7	-3,4	-12,3	-0,7	PK17EJ
Zeitl.Zus.Pk: Depressionsbeginn				-1,6	-0,8	-0,8	-0,9	-0,6	PK34AJ
Zeitl.Zus.Pk: Ende Depressionen				7,7	6,0	1,7	6,3	1,4	PK34EJ
Dauer									43
Dauer Musizieren				20,1	19,4	0,7	19,6	0,5	DAUR16
Dauer Rauchen				23,7	24,1	-0,4	23,3	0,4	DAUR17
Dauer Depressionen				9,2	6,6	2,6	7,6	1,6	DAUR34