

gut: bei leichter Musik

37B

allgemeine Angaben		00ALL %	leichte Musik	nein/k. A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
allgemeine Fragen								0
Männerquote (Frauenquote = 100% - Männerquote)			57,4	61,5	-4,1	59,3	-1,9	00B
Anzahl Probanden			101,0	135,0	-34,0	236,0	-135,0	01SIGEL
Wert/Code			1,0	0,0	1,0	9,0	-8,0	Value
Lebenseinstellung		01LEB %	leichte Musik	nein/k. A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Selbsteinschätzung								11
ernst			42,6	41,5	1,1	42,0	0,6	11.1
pflichtbewußt			87,1	83,0	4,2	84,8	2,4	11.2
strebsam			55,4	48,9	6,6	51,7	3,8	11.3
gründlich			60,4	51,9	8,5	55,5	4,9	11.4
Empfindsam, "dünnhäutig"			57,4	47,4	10,0	51,7	5,7	11.5
fröhlich			41,6	29,6	12,0	34,8	6,8	11.6
spontan			20,8	19,3	1,5	19,9	0,9	11.7
leichtlebig			5,0	2,2	2,7	3,4	1,6	11.8
humorvoll			34,7	23,0	11,7	28,0	6,7	11.9
musikalische Betätigung								12
Instrument gespielt?			19,8	25,9	-6,1	27,5	-7,7	16A
psychosoziale Faktoren								13
Spannungen: im Beruf			40,6	21,5	19,1	29,7	10,9	21BER
Spannungen: in der Familie			54,5	42,2	12,2	47,5	7,0	21FAM
Spannungen: im Freundes/Bekanntkreis			6,9	3,0	4,0	4,7	2,3	21FREU
Neigung eigene Gefühle zu unterdrücken			77,2	57,0	20,2	65,7	11,5	22
Depressionsquote			40,6	28,1	12,4	64,4	-23,8	34JN
Ernährung, Verdauung, Genußmittel		02ERN %	leichte Musik	nein/k. A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Ernährung allgemein								20
Viel Obst und Rohkost im Jahr. vor Erkrankung			50,5	58,5	-8,0	55,1	-4,6	24
Gerne süße Speisen/Cola/Limo			79,2	80,0	-0,8	79,7	-0,5	26A
Heißhunger auf Süßes			50,5	49,6	0,9	50,0	0,5	26B
Konnte Mahlzeit auslassen			69,3	62,2	7,1	65,3	4,1	27A
Aß Kleinigkeit zwischen Mahlzeiten			45,5	33,3	12,2	38,6	7,0	27B
Nahrungsgewohnheiten geändert			45,5	25,9	19,6	34,3	11,2	35
Verdauungsbeschwerden								22
Verdauungsbeschwerde Blähungen			37,6	33,3	4,3	35,2	2,5	28BLAE
Verdauungsbeschwerde Durchfall			7,9	3,7	4,2	5,5	2,4	28DURC
Verdauungsbeschwerde Verstopfung			52,5	33,3	19,1	41,5	10,9	28VERS
Kaffee/Tee								25
Kaffeetrinker			66,3	68,9	-2,6	69,9	-3,6	20KAF
Teetrinker			48,5	48,9	-0,4	52,0	-3,5	20TEE
Anzahl Tassen Kaffee/Tag			2,3	2,4	-0,1	2,4	-0,1	20KTA
Anzahl Tassen Tee/Tag			1,3	1,4	-0,1	1,3	0,0	20TTA
Alkohol								26
Alkohol Verträglichkeitsquote			66,3	62,2	4,1	68,0	-1,7	19
Wein vertragen			33,7	28,9	4,8	30,9	2,7	19C1
Sekt vertragen			23,8	17,0	6,7	19,9	3,8	19C2
Bier vertragen			35,6	32,6	3,1	33,9	1,7	19C3
Branntwein vertragen			10,9	6,7	4,2	8,5	2,4	19C4
Likör vertragen			16,8	8,9	7,9	12,3	4,5	19C5
Rauchen								27
Wie stark geraucht?			32,7	30,4	2,3	0,4	32,3	17S
Konstitution		03KON %	leichte Musik	nein/k. A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Belastung und Belastbarkeit								32
Erblichkeitsquotient			13,9	11,9	2,0	12,7	1,2	10

Wie belastbar früher?						78,2	80,0	-1,8	79,2	-1,0	12A
Wie belastet im Jahrz. vor Parkinson?						67,3	64,4	2,9	65,7	1,6	12B
Konstitution, Schlaf											
Wie groß war Schlafbedarf?						53,5	52,6	0,9	53,0	0,5	13
Ich ging gerne früh schlafen.						46,5	45,2	1,3	45,8	0,8	13B
War früh schlafen möglich?						46,5	54,1	-7,5	50,9	-4,3	13C
Konstitution, sportliche Betätigung											
Sport, Jogging, Gymn. (Jahrz. vor PK)						40,6	42,2	-1,6	41,5	-0,9	15A
Wie häufig Gymnastik (Jahrz. vor PK)						25,7	21,5	4,3	23,3	2,4	15GYM
Wie häufig Jogging (Jahrz. vor PK)						9,9	6,7	3,2	8,1	1,9	15JOG
Wie oft Sport (Jahrz. vor PK)						25,7	26,7	-0,9	26,3	-0,5	15SPO
Einflußfaktoren auf Symptomatik											
						05COP %	leichte Musik	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Verschlechterungen durch ...											
schlechter: Überanstrengung						75,2	56,3	19,0	64,4	10,8	36A1
schlechter Aufregung,Sorge						90,1	66,7	23,4	76,7	13,4	36A2
schlechter: Hetze						77,2	58,5	18,7	66,5	10,7	36A3
schlechter: Zu wenig Schlaf						45,5	25,2	20,4	33,9	11,6	36A4
schlechter: Zu wenig Trinken						12,9	11,9	1,0	12,3	0,6	36A5
schlechter: Klimastürze						65,3	49,6	15,7	56,4	9,0	36A6
schlechter: Hitze						49,5	30,4	19,1	38,6	10,9	36A7
schlechter: Schlechte Luft						45,5	20,0	25,5	30,9	14,6	36A8
schlechter: Tabakrauch						33,7	17,0	16,6	24,2	9,5	36A9
Verbesserungen durch...											
gut: in heiterer Gesellschaft						72,3	48,9	23,4	58,9	13,4	37A
gut: bei leichter Musik									42,8		37B
gut: nach Gymnastik						49,5	34,8	14,7	41,1	8,4	37C
gut: nach dem Schlafen						49,5	36,3	13,2	42,0	7,6	37D
gut: in frischer Luft						82,2	59,3	22,9	69,1	13,1	37E
gut: nach Entspannungsübungen						50,5	27,4	23,1	37,3	13,2	37F
gut: nach dem Schwimmen						27,7	15,6	12,2	20,8	7,0	37G
Krankheitsverlauf											
						06SYM %	leichte Musik	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Krankheitsverlauf, Symptomatik											
32 Äquivalenztyp J/N						34,7	28,9	5,8	31,4	3,3	32EQUI
32 Rigordominanztyp J/N						41,6	42,2	-0,6	42,0	-0,4	32RIGO
32 Tremordominanztyp J/N						23,8	28,9	-5,1	26,7	-2,9	32TREM
Beschwerden seit Diag. schlimmer?						79,2	78,5	0,7	78,8	0,4	33BS
Versteifung seit Diagnose besser?						28,7	17,8	10,9	22,5	6,3	33VB
Versteifung seit Diagnose schlimmer?						52,5	59,3	-6,8	56,4	-3,9	33VS
Zittern seit Diagnose gebessert?						32,7	26,7	6,0	29,2	3,4	33ZB
Zittern seit Diagnose zugenommen?						50,5	51,9	-1,4	63,1	-12,6	33ZS
offene Fragen											
						08OFF Anzahl	leichte Musik	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Verweise auf Ergebnisse offener Fragen											
Anzahl Medikamente heute						3,1	3,0	0,1	3,0	0,1	ANZ30H
Angaben zu 31 Ärzten						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ANZ31ARZ
Angaben zu 31 Behandlungen						3,8	2,9	0,9	3,3	0,5	ANZ31BEH
Anzahl Medikamente V31						0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	ANZ31SUM
Anzahl verschlechternde Umstände (offene Listen)						0,3	0,1	0,2	0,2	0,1	ANZ36OFF
Anzahl verbessernde Umstände (offene Listen)						0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	ANZ37OFF
Anzahl erwähnenswerte Belastungen (offene Listen)						0,6	0,4	0,2	0,5	0,1	ANZ38OFF
Angaben (offen) zu Krankheitsursachen						7,8	6,4	1,4	7,0	0,8	ANZ6
Angaben zu frühsymptomen						4,9	3,6	1,4	4,1	0,8	ANZ7
Indexe											
						10NDX Index!	leichte Musik	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt
Indexvariablen											
In gespannten Verhältnissen gelebt						3,7	5,2	-1,6	4,6	-0,9	21
Was früher gegessen?						1,6	1,6	0,0	1,6	0,0	23
beruflicher Aufstieg2						0,5	0,4	0,0			AUFST

beruflicher Aufstieg				0,8	0,7	0,1	0,7	0,0	UFSTEIG
Vorlaufsymptome & Lebensalter		11 Jr Jahre	leichte Musik	nein/k.A.	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt		
Zusammenhang mit Lebensalter									41
Alter: Zum Zeitpunkt der Befragung				65,1	66,6	-1,5	66,0	-0,9	LA00C
Alter: Berufsaufgabe				54,8	56,5	-1,7	55,8	-1,0	LA03J
Alter: Diagnose PK				57,5	59,6	-2,1	58,7	-1,2	LA04J
Alter: Auftreten typ. Pk-Beschwerden				52,5	56,7	-4,3	54,9	-2,4	LA05J
Alter: Muskelverspannungen				48,9	51,9	-2,9	50,5	-1,5	LA07AJ
Alter: Gelenk- oder Muskelschmerzen				47,8	51,1	-3,3	49,7	-1,9	LA07BJ
Alter: Schlafstörungen				45,1	53,8	-8,7	46,7	-1,6	LA07CJ
Alter: Kopfschmerzen im Hinterkopf				45,1	50,5	-5,4	47,2	-2,1	LA07DJ
Alter: Nachlassen des Geruchssinns				52,3	55,3	-3,0	53,6	-1,3	LA07EJ
Alter: Tränen der Augen				53,1	60,7	-7,6	57,0	-3,9	LA07FJ
Alter: kleinere/unsichere Schrift				54,0	57,6	-3,5	55,4	-1,3	LA07GJ
Alter: Leiseres Sprechen				53,7	60,4	-6,7	57,1	-3,4	LA07HJ
Alter: Gedrücktere Stimmung				49,7	57,2	-7,5	52,4	-2,6	LA07IJ
Alter: deutlicher Anzeichen Vergeßlichkeit				50,6	55,6	-5,0	52,2	-1,6	LA09J
Alter: Beginn Spiel eines Musikinstrumentes				17,4	17,9	-0,6	17,5	-0,2	LA16B
Alter: Aufgabe Spiel eines Musikinstrumentes				36,3	37,9	-1,6	38,2	-1,9	LA16E
Alter: Beginn Rauchen				25,7	20,1	5,6	18,2	7,5	LA17AJ
Alter: Aufgabe Rauchen				48,4	45,1	3,4	46,6	1,8	LA17EJ
Alter: Beginn trauriger Verstimmungen/Depris				53,7	59,3	-5,6	56,7	-3,0	LA34AJ
Alter: Ende trauriger Verstimmungen/Depris				61,6	66,1	-4,6	63,6	-2,1	LA34EJ
Zusammenhang mit Jahr der PK-Diagnose									42
Seit wieviel Jahren Parkinson?				7,4	6,9	0,6	7,1	0,3	PK03K_JAHRE
Berufsaustritt/Aufgabe J				-3,7	-4,5	0,8	-4,2	0,5	PK03J
typische PK-Beschw. (retrospektiv)				-4,1	-2,5	-1,6	-3,2	-0,9	PK05J
Zeitl.Zus.Pk: Muskelverspannung				-7,4	-8,0	0,7	-7,5	0,1	PK07AJ
Zeitl.Zus.Pk: Gelenk-/bzw. Muskelschmerzen				-8,3	-10,4	2,1	-9,4	1,1	PK07BJ
Zeitl.Zus.Pk: Schlafstörungen x Jahre vor (-) bzw. nach(+) PK-Di				-9,2	-8,6	-0,5	-11,7	2,5	PK07CJ
Zeitl.Zus.Pk: Kopfschmerzen im Hinterkopf				-13,0	-10,2	-2,8	-11,7	-1,3	PK07DJ
Zeitl.Zus.Pk: Nachlassen Geruchssinn				-5,0	-6,5	1,5	-5,4	0,3	PK07EJ
Zeitl.Zus.Pk: Tränen der Augen				-5,7	-3,1	-2,6	-4,3	-1,4	PK07FJ
Zeitl.Zus.Pk: Kleinere (oder unsicherere) Schrift				-2,1	-1,5	-0,6	-2,2	0,1	PK07GJ
Zeitl.Zus.Pk: Leiseres Sprechen				-2,3	0,9	-3,2	-0,6	-1,7	PK07HJ
Zeitl.Zus.Pk: Gedrückte Stimmung				-6,1	-1,4	-4,7	-4,8	-1,3	PK07IJ
Zeitl.Zus.Pk: deutl. Anz. von Vergeßlichkeit				-8,4	-4,8	-3,6	-7,3	-1,2	PK09J
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Musizieren				-39,6	-41,3	1,7	-41,3	1,7	PK16BJ
Zeitl.Zus.Pk: Ende Musizieren				-20,6	-21,4	0,8	-20,3	-0,3	PK16EJ
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Rauchen				-28,9	-40,0	11,1	-38,0	9,1	PK17AJ
Zeitl.Zus.Pk: Aufgabe des Rauchens				-6,7	-13,3	6,6	-12,3	5,6	PK17EJ
Zeitl.Zus.Pk: Depressionsbeginn				-2,1	0,1	-2,2	-0,9	-1,1	PK34AJ
Zeitl.Zus.Pk: Ende Depressionen				5,9	6,9	-1,1	6,3	-0,4	PK34EJ
Dauer									43
Dauer Musizieren				19,0	19,9	-1,0	19,6	-0,6	DAUR16
Dauer Rauchen				22,7	25,0	-2,3	23,3	-0,6	DAUR17
Dauer Depressionen				7,9	6,7	1,2	7,6	0,3	DAUR34