

zuletzt ausgeübter Beruf ("Hand/Kopfarbeit")

L1Ber2

allgemeine Angaben		00ALL %	"Kopfarbeiter"	"Handarbeiter"	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
allgemeine Fragen								0
Männerquote (Frauenquote = 100% - Männerquote)			66,0	50,0	16,0	59,3	6,7	00B
Anzahl Probanden			144,0	92,0	52,0	236,0	-92,0	01SIGEL
Lebenseinstellung		01LEB %	"Kopfarbeiter"	"Handarbeiter"	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Selbsteinschätzung								11
ernst			46,5	34,8	11,7	42,0	4,6	11.1
pflichtbewußt			86,1	82,6	3,5	84,8	1,4	11.2
strebsam			53,5	48,9	4,6	51,7	1,8	11.3
gründlich			53,5	58,7	-5,2	55,5	-2,0	11.4
Empfindsam, "dünnhäutig"			50,7	53,3	-2,6	51,7	-1,0	11.5
fröhlich			31,9	39,1	-7,2	34,8	-2,8	11.6
spontan			20,8	18,5	2,4	19,9	0,9	11.7
leichtlebig			4,9	1,1	3,8	3,4	1,5	11.8
humorvoll			26,4	30,4	-4,0	28,0	-1,6	11.9
musikalische Betätigung								12
Instrument gespielt?			27,8	16,3	11,5	27,5	0,2	16A
psychosoziale Faktoren								13
Spannungen: im Beruf			36,8	18,5	18,3	29,7	7,1	21BER
Spannungen: in der Familie			48,6	45,7	3,0	47,5	1,2	21FAM
Spannungen: im Freundes/Bekanntkreis			6,3	2,2	4,1	4,7	1,6	21FREU
Neigung eigene Gefühle zu unterdrücken			68,8	60,9	7,9	65,7	3,1	22
Depressionsquote			33,3	33,7	-0,4	64,4	-31,1	34JN
Ernährung, Verdauung, Genußmittel		02ERN %	"Kopfarbeiter"	"Handarbeiter"	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Ernährung allgemein								20
Viel Obst und Rohkost im Jahr. vor Erkrankung			50,7	62,0	-11,3	55,1	-4,4	24
Gerne süße Speisen/Cola/Limo			79,9	79,3	0,5	79,7	0,2	26A
Heißhunger auf Süßes			49,3	51,1	-1,8	50,0	-0,7	26B
Konnte Mahlzeit auslassen			64,6	66,3	-1,7	65,3	-0,7	27A
Aß Kleinigkeit zwischen Mahlzeiten			37,5	40,2	-2,7	38,6	-1,1	27B
Nahrungsgewohnheiten geändert			34,0	34,8	-0,8	34,3	-0,3	35
Verdauungsbeschwerden								22
Verdauungsbeschwerde Blähungen			40,3	27,2	13,1	35,2	5,1	28BLAE
Verdauungsbeschwerde Durchfall			5,6	5,4	0,1	5,5	0,0	28DURC
Verdauungsbeschwerde Verstopfung			45,8	34,8	11,1	41,5	4,3	28VERS
Kaffee/Tee								25
Kaffeetrinker			69,4	65,2	4,2	69,9	-0,5	20KAF
Teetrinker			50,7	45,7	5,0	52,0	-1,3	20TEE
Anzahl Tassen Kaffee/Tag			2,5	2,2	0,3	2,4	0,1	20KTA
Anzahl Tassen Tee/Tag			1,5	1,1	0,3	1,3	0,1	20TTA
Alkohol								26
Alkohol Verträglichkeitsquote			68,1	57,6	10,4	68,0	0,1	19
Wein vertragen			33,3	27,2	6,2	30,9	2,4	19C1
Sekt vertragen			20,8	18,5	2,4	19,9	0,9	19C2
Bier vertragen			34,0	33,7	0,3	33,9	0,1	19C3
Branntwein vertragen			9,0	7,6	1,4	8,5	0,6	19C4
Likör vertragen			11,1	14,1	-3,0	12,3	-1,2	19C5
Rauchen								27
Wie stark geraucht?			32,6	29,3	3,3	0,4	32,3	17S
Konstitution		03KON %	"Kopfarbeiter"	"Handarbeiter"	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Belastung und Belastbarkeit								32
Erblichkeitsquotient			13,2	12,0	1,2	12,7	0,5	10
Wie belastbar früher?			78,5	80,4	-2,0	79,2	-0,8	12A

Wie belastet im Jahr. vor Parkinson?						72,9	54,3	18,6	65,7	7,2	12B	
Konstitution, Schlaf												
Wie groß war Schlafbedarf?						54,9	50,0	4,9	53,0	1,9	13	
Ich ging gerne früh schlafen.						47,2	43,5	3,7	45,8	1,5	13B	
War früh schlafen möglich?						54,2	45,7	8,5	50,9	3,3	13C	
Konstitution, sportliche Betätigung												
Sport, Jogging, Gymn. (Jahrz. vor PK)						46,5	33,7	12,8	41,5	5,0	15A	
Wie häufig Gymnastik (Jahrz. vor PK)						25,7	19,6	6,1	23,3	2,4	15GYM	
Wie häufig Jogging (Jahrz. vor PK)						9,7	5,4	4,3	8,1	1,7	15JOG	
Wie oft Sport (Jahrz. vor PK)						29,2	21,7	7,4	26,3	2,9	15SPO	
Einflußfaktoren auf Symptomatik												
						05COP %	"Kopfarbeiter"	"Handarbeiter"	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Verschlechterungen durch ...												
schlechter: Überanstrengung						61,8	68,5	-6,7	64,4	-2,6	36A1	
schlechter Aufregung,Sorge						76,4	77,2	-0,8	76,7	-0,3	36A2	
schlechter: Hetze						67,4	65,2	2,1	66,5	0,8	36A3	
schlechter: Zu wenig Schlaf						35,4	31,5	3,9	33,9	1,5	36A4	
schlechter: Zu wenig Trinken						11,1	14,1	-3,0	12,3	-1,2	36A5	
schlechter: Klimastürze						56,9	55,4	1,5	56,4	0,6	36A6	
schlechter: Hitze						38,2	39,1	-0,9	38,6	-0,4	36A7	
schlechter: Schlechte Luft						33,3	27,2	6,2	30,9	2,4	36A8	
schlechter: Tabakrauch						23,6	25,0	-1,4	24,2	-0,5	36A9	
Verbesserungen durch...												
gut: in heiterer Gesellschaft						56,9	62,0	-5,0	58,9	-2,0	37A	
gut: bei leichter Musik						43,8	41,3	2,4	42,8	1,0	37B	
gut: nach Gymnastik						41,7	40,2	1,4	41,1	0,6	37C	
gut: nach dem Schlafen						39,6	45,7	-6,1	42,0	-2,4	37D	
gut: in frischer Luft						67,4	71,7	-4,4	69,1	-1,7	37E	
gut: nach Entspannungsübungen						39,6	33,7	5,9	37,3	2,3	37F	
gut: nach dem Schwimmen						26,4	12,0	14,4	20,8	5,6	37G	
Krankheitsverlauf												
						06SYM %	"Kopfarbeiter"	"Handarbeiter"	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Krankheitsverlauf, Symptomatik												
32 Äquivalenztyp J/N						27,8	37,0	-9,2	31,4	-3,6	32EQUI	
32 Rigordominanztyp J/N						47,2	33,7	13,5	42,0	5,3	32RIGO	
32 Tremordominanztyp J/N						25,0	29,3	-4,3	26,7	-1,7	32TREM	
Beschwerden seit Diag. schlimmer?						81,3	75,0	6,3	78,8	2,4	33BS	
Versteifung seit Diagnose besser?						25,7	17,4	8,3	22,5	3,2	33VB	
Versteifung seit Diagnose schlimmer?						55,6	57,6	-2,1	56,4	-0,8	33VS	
Zittern seit Diagnose gebessert?						27,8	31,5	-3,7	29,2	-1,5	33ZB	
Zittern seit Diagnose zugenommen?						47,9	56,5	-8,6	63,1	-15,2	33ZS	
offene Fragen												
						08OFF Anzahl	"Kopfarbeiter"	"Handarbeiter"	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Verweise auf Ergebnisse offener Fragen												
Anzahl Medikamente heute						3,1	2,9	0,2	3,0	0,1	ANZ30H	
Angaben zu 31 Ärzten						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	NZ31ARZ	
Angaben zu 31 Behandlungen						3,6	2,9	0,7	3,3	0,3	NZ31BEH	
Anzahl Medikamente V31						0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	I31SUM	
Anzahl verschlechternde Umstände (offene Listen)						0,2	0,3	-0,1	0,2	0,0	NZ36OFF	
Anzahl verbessernde Umstände (offene Listen)						0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	NZ37OFF	
Anzahl erwähnenswerte Belastungen (offene Listen)						0,4	0,5	-0,1	0,5	0,0	NZ38OFF	
Angaben (offen) zu Krankheitsursachen						7,6	6,0	1,6	7,0	0,6	ANZ6	
Angaben zu frühsymptomen						4,1	4,2	-0,1	4,1	0,0	ANZ7	
Indexe												
						10NDX Index!	"Kopfarbeiter"	"Handarbeiter"	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Indexvariablen												
In gespannten Verhältnissen gelebt						4,6	4,5	0,1	4,6	0,0	21	
Was früher gegessen?						1,6	1,6	0,0	1,6	0,0	23	
beruflicher Aufstieg2						0,7	0,1	0,6			AUFST	
beruflicher Aufstieg						1,1	0,1	0,9	0,7	0,4	UFSTEIG	

Vorlaufsymptome & Lebensalter		11 Jr Jahre	"Kopfarbeiter"	"Handarbeit- r"	Differenz	Durch- schnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
Zusammenhang mit Lebensalter								41
Alter: Zum Zeitpunkt der Befragung			66,2	65,6	0,6	66,0	0,2	LA00C
Alter: Berufsaufgabe			57,4	52,8	4,6	55,8	1,6	LA03J
Alter: Diagnose PK			59,3	57,7	1,6	58,7	0,6	LA04J
Alter: Auftreten typ. Pk-Beschwerden			55,3	54,1	1,1	54,9	0,4	LA05J
Alter: Muskelverspannungen			49,7	51,6	-1,9	50,5	-0,8	LA07AJ
Alter: Gelenk- oder Muskelschmerzen			47,5	52,6	-5,1	49,7	-2,2	LA07BJ
Alter: Schlafstörungen			48,7	49,9	-1,2	46,7	2,0	LA07CJ
Alter: Kopfschmerzen im Hinterkopf			48,2	45,3	2,9	47,2	1,0	LA07DJ
Alter: Nachlassen des Geruchssinns			51,8	57,2	-5,4	53,6	-1,8	LA07EJ
Alter: Tränen der Augen			57,1	56,8	0,3	57,0	0,1	LA07FJ
Alter: kleinere/unsichere Schrift			57,1	53,8	3,3	55,4	1,8	LA07GJ
Alter: Leiseres Sprechen			58,9	54,3	4,6	57,1	1,8	LA07HJ
Alter: Gedrücktere Stimmung			53,9	52,6	1,3	52,4	1,6	LA07IJ
Alter: deutlicher Anzeichen Vergeßlichkeit			52,5	53,8	-1,3	52,2	0,3	LA09J
Alter: Beginn Spiel eines Musikinstrumentes			19,0	14,3	4,7	17,5	1,5	LA16B
Alter: Aufgabe Spiel eines Musikinstrumentes			40,3	29,2	11,1	38,2	2,1	LA16E
Alter: Beginn Rauchen			22,3	23,1	-0,8	18,2	4,1	LA17AJ
Alter: Aufgabe Rauchen			46,4	46,8	-0,4	46,6	-0,2	LA17EJ
Alter: Beginn trauriger Verstimmungen/Depris			55,7	57,5	-1,8	56,7	-0,9	LA34AJ
Alter: Ende trauriger Verstimmungen/Depris			63,1	64,9	-1,8	63,6	-0,5	LA34EJ
Zusammenhang mit Jahr der PK-Diagnose								42
Seit wieviel Jahren Parkinson?			6,8	7,6	-0,8	7,1	-0,3	PK03K_JAHRE
Berufsaustritt/Aufgabe J			-3,3	-5,8	2,4	-4,2	0,8	PK03J
typische PK-Beschw. (retrospektiv)			-3,1	-3,4	0,3	-3,2	0,1	PK05J
Zeittl.Zus.Pk: Muskelverspannung			-9,7	-4,7	-4,9	-7,5	-2,2	PK07AJ
Zeittl.Zus.Pk: Gelenk-/bzw. Muskelschmerzen			-11,6	-6,8	-4,9	-9,4	-2,2	PK07BJ
Zeittl.Zus.Pk: Schlafstörungen x Jahre vor (-) bzw. nach(+) PK-Di			-9,6	-7,9	-1,7	-11,7	2,1	PK07CJ
Zeittl.Zus.Pk: Kopfschmerzen im Hinterkopf			-11,3	-12,9	1,6	-11,7	0,4	PK07DJ
Zeittl.Zus.Pk: Nachlassen Geruchssinn			-6,8	-3,5	-3,3	-5,4	-1,4	PK07EJ
Zeittl.Zus.Pk: Tränen der Augen			-5,8	-1,9	-3,9	-4,3	-1,5	PK07FJ
Zeittl.Zus.Pk: Kleinere (oder unsicherere) Schrift			-1,8	-1,7	-0,2	-2,2	0,4	PK07GJ
Zeittl.Zus.Pk: Leiseres Sprechen			-0,5	-0,8	0,3	-0,6	0,0	PK07HJ
Zeittl.Zus.Pk: Gedrückte Stimmung			-3,8	-3,7	-0,1	-4,8	1,0	PK07IJ
Zeittl.Zus.Pk: deutl. Anz. von Vergeßlichkeit			-8,0	-4,9	-3,1	-7,3	-0,8	PK09J
Zeittl.Zus.Pk: Beginn Musizieren			-39,7	-43,3	3,6	-41,3	1,6	PK16BJ
Zeittl.Zus.Pk: Ende Musizieren			-18,4	-28,4	10,1	-20,3	2,0	PK16EJ
Zeittl.Zus.Pk: Beginn Rauchen			-36,3	-33,1	-3,3	-38,0	1,6	PK17AJ
Zeittl.Zus.Pk: Aufgabe des Rauchens			-11,8	-8,1	-3,7	-12,3	0,5	PK17EJ
Zeittl.Zus.Pk: Depressionsbeginn			-1,8	0,3	-2,1	-0,9	-0,9	PK34AJ
Zeittl.Zus.Pk: Ende Depressionen			5,6	7,6	-2,0	6,3	-0,7	PK34EJ
Dauer								43
Dauer Musizieren			21,3	14,9	6,5	19,6	1,8	DAUR16
Dauer Rauchen			24,1	23,7	0,4	23,3	0,8	DAUR17
Dauer Depressionen			7,2	7,5	-0,3	7,6	-0,3	DAUR34