

## Kontrollvar: "ältere" vs. "Jüngere Erkrankte

age

allgemeine Angaben		00ALL %	ältere Erkrankte	jüngere Erkrankte	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
<b>allgemeine Fragen</b>								0
Männerquote (Frauenquote = 100% - Männerquote)			52,1	67,8	-15,8	59,3	-7,2	00B
Anzahl Probanden			121,0	115,0	6,0	236,0	-115,0	01S
<b>Lebenseinstellung</b>		01LEB %	ältere Erkrankte	jüngere Erkrankte	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
<b>Selbsteinschätzung</b>								11
ernst			41,3	42,6	-1,3	42,0	-0,6	11.1
pflichtbewußt			81,0	88,7	-7,7	84,8	-3,8	11.2
strebsam			50,4	53,0	-2,6	51,7	-1,3	11.3
gründlich			54,5	56,5	-2,0	55,5	-1,0	11.4
Empfindsam, "dünnhäutig"			42,1	61,7	-19,6	51,7	-9,5	11.5
fröhlich			31,4	38,3	-6,9	34,8	-3,3	11.6
spontan			12,4	27,8	-15,4	19,9	-7,5	11.7
leichtlebig			2,5	4,3	-1,9	3,4	-0,9	11.8
humorvoll			24,8	31,3	-6,5	28,0	-3,2	11.9
<b>musikalische Betätigung</b>								12
Instrument gespielt?			20,7	26,1	-5,4	27,5	-6,9	16A
<b>psychosoziale Faktoren</b>								13
Spannungen: im Beruf			24,8	34,8	-10,0	29,7	-4,9	21BER
Spannungen: in der Familie			35,5	60,0	-24,5	47,5	-11,9	21FAM
Spannungen: im Freundes/Bekanntkreis			4,1	5,2	-1,1	4,7	-0,5	21FREU
Neigung eigene Gefühle zu unterdrücken			57,0	74,8	-17,8	65,7	-8,7	22
Depressionsquote			30,6	36,5	-5,9	64,4	-33,8	34JN
<b>Ernährung, Verdauung, Genußmittel</b>		02ERN %	ältere Erkrankte	jüngere Erkrankte	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
<b>Ernährung allgemein</b>								20
Viel Obst und Rohkost im Jahr. vor Erkrankung			54,5	55,7	-1,1	55,1	-0,5	24
Gerne süße Speisen/Cola/Limo			79,3	80,0	-0,7	79,7	-0,3	26A
Heißhunger auf Süßes			45,5	54,8	-9,3	50,0	-4,5	26B
Konnte Mahlzeit auslassen			71,9	58,3	13,6	65,3	6,7	27A
Aß Kleinigkeit zwischen Mahlzeiten			33,1	44,3	-11,3	38,6	-5,5	27B
Nahrungsgewohnheiten geändert			26,4	42,6	-16,2	34,3	-7,9	35
<b>Verdauungsbeschwerden</b>								22
Verdauungsbeschwerde Blähungen			33,9	36,5	-2,6	35,2	-1,3	28BLAE
Verdauungsbeschwerde Durchfall			4,1	7,0	-2,8	5,5	-1,4	28DURC
Verdauungsbeschwerde Verstopfung			41,3	41,7	-0,4	41,5	-0,2	28VERS
<b>Kaffee/Tee</b>								25
Kaffeetrinker			66,9	68,7	-1,8	69,9	-3,0	20KAF
Teetrinker			50,4	47,0	3,5	52,0	-1,6	20TEE
Anzahl Tassen Kaffee/Tag			2,3	2,5	-0,3	2,4	-0,1	20KTA
Anzahl Tassen Tee/Tag			1,3	1,4	-0,1	1,3	0,0	20TTA
<b>Alkohol</b>								26
Alkohol Verträglichkeitsquote			61,2	67,0	-5,8	68,0	-6,8	19
Wein vertragen			34,7	27,0	7,8	30,9	3,8	19C1
Sekt vertragen			20,7	19,1	1,5	19,9	0,7	19C2
Bier vertragen			37,2	30,4	6,8	33,9	3,3	19C3
Branntwein vertragen			9,1	7,8	1,3	8,5	0,6	19C4
Likör vertragen			12,4	12,2	0,2	12,3	0,1	19C5
<b>Rauchen</b>								27
Wie stark geraucht?			28,9	33,9	-5,0	0,4	28,6	17S
<b>Konstitution</b>		03KON %	ältere Erkrankte	jüngere Erkrankte	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
<b>Belastung und Belastbarkeit</b>								32
Erblichkeitsquotient			14,0	11,3	2,7	12,7	1,3	10
Wie belastbar früher?			77,7	80,9	-3,2	79,2	-1,6	12A

Wie belastet im Jahr. vor Parkinson?		60,3	71,3	-11,0	65,7	-5,3	12B
<b>Konstitution, Schlaf</b>							
Wie groß war Schlafbedarf?		43,0	63,5	-20,5	53,0	-10,0	13
Ich ging gerne früh schlafen.		45,5	46,1	-0,6	45,8	-0,3	13B
War früh schlafen möglich?		49,6	52,2	-2,6	50,9	-1,3	13C
<b>Konstitution, sportliche Betätigung</b>							
Sport, Jogging, Gymn. (Jahrz. vor PK)		30,6	53,0	-22,5	41,5	-11,0	15A
Wie häufig Gymnastik (Jahrz. vor PK)		18,2	28,7	-10,5	23,3	-5,1	15GYM
Wie häufig Jogging (Jahrz. vor PK)		4,1	12,2	-8,0	8,1	-3,9	15JOG
Wie oft Sport (Jahrz. vor PK)		17,4	35,7	-18,3	26,3	-8,9	15SPO
<b>Einflußfaktoren auf Symptomatik</b>							
	05 COP %	ältere Erkrankte	jüngere Erkrankte	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
<b>Verschlechterungen durch ...</b>							
schlechter: Überanstrengung		57,9	71,3	-13,5	64,4	-6,6	36A1
schlechter Aufregung,Sorge		67,8	86,1	-18,3	76,7	-8,9	36A2
schlechter: Hetze		57,0	76,5	-19,5	66,5	-9,5	36A3
schlechter: Zu wenig Schlaf		27,3	40,9	-13,6	33,9	-6,6	36A4
schlechter: Zu wenig Trinken		6,6	18,3	-11,6	12,3	-5,7	36A5
schlechter: Klimastürze		55,4	57,4	-2,0	56,4	-1,0	36A6
schlechter: Hitze		33,9	43,5	-9,6	38,6	-4,7	36A7
schlechter: Schlechte Luft		27,3	34,8	-7,5	30,9	-3,7	36A8
schlechter: Tabakrauch		16,5	32,2	-15,6	24,2	-7,6	36A9
<b>Verbesserungen durch...</b>							
gut: in heiterer Gesellschaft		53,7	64,3	-10,6	58,9	-5,2	37A
gut: bei leichter Musik		38,0	47,8	-9,8	42,8	-4,8	37B
gut: nach Gymnastik		35,5	47,0	-11,4	41,1	-5,6	37C
gut: nach dem Schlafen		40,5	43,5	-3,0	42,0	-1,5	37D
gut: in frischer Luft		61,2	77,4	-16,2	69,1	-7,9	37E
gut: nach Entspannungsübungen		25,6	49,6	-23,9	37,3	-11,7	37F
gut: nach dem Schwimmen		10,7	31,3	-20,6	20,8	-10,0	37G
<b>Krankheitsverlauf</b>							
	06SYM %	ältere Erkrankte	jüngere Erkrankte	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
<b>Krankheitsverlauf, Symptomatik</b>							
32 Äquivalenztyp J/N		26,4	36,5	-10,1	31,4	-4,9	32EQUI
32 Rigordominanztyp J/N		39,7	44,3	-4,7	42,0	-2,3	32RIGO
32 Tremordominanztyp J/N		33,9	19,1	14,8	26,7	7,2	32TREM
Beschwerden seit Diag. schlimmer?		80,2	77,4	2,8	78,8	1,4	33BS
Versteifung seit Diagnose besser?		18,2	27,0	-8,8	22,5	-4,3	33VB
Versteifung seit Diagnose schlimmer?		52,1	60,9	-8,8	56,4	-4,3	33VS
Zittern seit Diagnose gebessert?		31,4	27,0	4,4	29,2	2,2	33ZB
Zittern seit Diagnose zugenommen?		49,6	53,0	-3,5	63,1	-13,6	33ZS
<b>offene Fragen</b>							
	08OFF Anzahl	ältere Erkrankte	jüngere Erkrankte	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
<b>Verweise auf Ergebnisse offener Fragen</b>							
Anzahl Medikamente heute		2,8	3,3	-0,5	3,0	-0,2	ANZ30H
Angaben zu 31 Ärzten		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	NZ31ARZ
Angaben zu 31 Behandlungen		2,8	3,9	-1,1	3,3	-0,5	NZ31BEH
Anzahl Medikamente V31		0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	I31SUM
Anzahl verschlechternde Umstände (offene Listen)		0,1	0,4	-0,3	0,2	-0,1	NZ36OFF
Anzahl verbessernde Umstände (offene Listen)		0,1	0,3	-0,2	0,2	-0,1	NZ37OFF
Anzahl erwähnenswerte Belastungen (offene Listen)		0,4	0,5	-0,1	0,5	0,0	NZ38OFF
Angaben (offen) zu Krankheitsursachen		6,7	7,3	-0,6	7,0	-0,3	ANZ6
Angaben zu frühsymptomen		3,6	4,7	-1,2	4,1	-0,5	ANZ7
<b>Indexe</b>							
	10NDX Index!	ältere Erkrankte	jüngere Erkrankte	Differenz	Durchschnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
<b>Indexvariablen</b>							
In gespannten Verhältnissen gelebt		5,1	4,0	1,1	4,6	0,5	21
Was früher gegessen?		1,6	1,6	0,0	1,6	0,0	23
beruflicher Aufstieg2		0,5	0,5	0,0			AUFST
beruflicher Aufstieg		0,8	0,7	0,1	0,7	0,0	UFSTEIG

Vorlaufsymptome & Lebensalter		11 Jr Jahre	ältere Erkrankte	jüngere Erkrankte	Differenz	Durch- schnitt Ges.	Differenz zum Durchschnitt	
<b>Zusammenhang mit Lebensalter</b>								41
Alter: Zum Zeitpunkt der Befragung			73,3	57,6	15,7	66,0	7,3	LA00C
Alter: Berufsaufgabe			58,8	51,5	7,3	55,8	3,0	LA03J
Alter: Diagnose PK			65,9	50,8	15,1	58,7	7,2	LA04J
Alter: Auftreten typ. Pk-Beschwerden			62,7	48,2	14,5	54,9	7,8	LA05J
Alter: Muskelverspannungen			56,7	45,0	11,7	50,5	6,2	LA07AJ
Alter: Gelenk- oder Muskelschmerzen			55,0	45,0	10,0	49,7	5,3	LA07BJ
Alter: Schlafstörungen			57,4	42,2	15,2	46,7	10,7	LA07CJ
Alter: Kopfschmerzen im Hinterkopf			53,8	41,0	12,8	47,2	6,6	LA07DJ
Alter: Nachlassen des Geruchssinns			60,5	47,5	13,1	53,6	7,0	LA07EJ
Alter: Tränen der Augen			64,4	49,0	15,3	57,0	7,4	LA07FJ
Alter: kleinere/unsichere Schrift			65,4	48,9	16,5	55,4	10,1	LA07GJ
Alter: Leiseres Sprechen			66,5	49,9	16,6	57,1	9,4	LA07HJ
Alter: Gedrücktere Stimmung			63,4	45,5	17,9	52,4	11,1	LA07IJ
Alter: deutlicher Anzeichen Vergeßlichkeit			63,0	45,5	17,5	52,2	10,8	LA09J
Alter: Beginn Spiel eines Musikinstrumentes			14,8	20,1	-5,3	17,5	-2,7	LA16B
Alter: Aufgabe Spiel eines Musikinstrumentes			41,3	34,0	7,3	38,2	3,1	LA16E
Alter: Beginn Rauchen			23,0	22,2	0,7	18,2	4,8	LA17AJ
Alter: Aufgabe Rauchen			51,7	42,0	9,7	46,6	5,1	LA17EJ
Alter: Beginn trauriger Verstimmungen/Depris			65,3	48,8	16,5	56,7	8,7	LA34AJ
Alter: Ende trauriger Verstimmungen/Depris			71,8	56,9	14,9	63,6	8,2	LA34EJ
<b>Zusammenhang mit Jahr der PK-Diagnose</b>								42
Seit wieviel Jahren Parkinson?			7,5	6,7	0,8	7,1	0,4	PK03K
Berufsaustritt/Aufgabe J			-6,9	-0,6	-6,3	-4,2	-2,8	PK03J
typische PK-Beschw. (retrospektiv)			-3,0	-3,3	0,3	-3,2	0,2	PK05J
Zeitl.Zus.Pk: Muskelverspannung			-9,4	-6,3	-3,1	-7,5	-1,9	PK07AJ
Zeitl.Zus.Pk: Gelenk-/bzw. Muskelschmerzen			-12,0	-7,5	-4,4	-9,4	-2,6	PK07BJ
Zeitl.Zus.Pk: Schlafstörungen x Jahre vor (-) bzw. nach(+) PK-Di			-9,6	-8,3	-1,4	-11,7	2,0	PK07CJ
Zeitl.Zus.Pk: Kopfschmerzen im Hinterkopf			-14,4	-9,7	-4,7	-11,7	-2,7	PK07DJ
Zeitl.Zus.Pk: Nachlassen Geruchssinn			-6,2	-5,2	-1,0	-5,4	-0,8	PK07EJ
Zeitl.Zus.Pk: Tränen der Augen			-3,1	-5,7	2,6	-4,3	1,2	PK07FJ
Zeitl.Zus.Pk: Kleinere (oder unsichere) Schrift			-1,0	-2,3	1,3	-2,2	1,2	PK07GJ
Zeitl.Zus.Pk: Leiseres Sprechen			0,4	-1,4	1,8	-0,6	0,9	PK07HJ
Zeitl.Zus.Pk: Gedrückte Stimmung			-1,8	-5,2	3,4	-4,8	2,9	PK07IJ
Zeitl.Zus.Pk: deutl. Anz. von Vergeßlichkeit			-4,0	-8,2	4,1	-7,3	3,2	PK09J
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Musizieren			-51,0	-32,0	-19,0	-41,3	-9,8	PK16BJ
Zeitl.Zus.Pk: Ende Musizieren			-24,6	-18,2	-6,4	-20,3	-4,3	PK16EJ
Zeitl.Zus.Pk: Beginn Rauchen			-43,5	-27,8	-15,7	-38,0	-5,5	PK17AJ
Zeitl.Zus.Pk: Aufgabe des Rauchens			-13,1	-8,1	-5,1	-12,3	-0,8	PK17EJ
Zeitl.Zus.Pk: Depressionsbeginn			-0,3	-1,5	1,3	-0,9	0,7	PK34AJ
Zeitl.Zus.Pk: Ende Depressionen			6,2	6,6	-0,4	6,3	-0,1	PK34EJ
<b>Dauer</b>								43
Dauer Musizieren			26,4	13,8	12,6	19,6	6,9	DAUR16
Dauer Rauchen			28,7	19,7	9,0	23,3	5,4	DAUR17
Dauer Depressionen			6,6	8,0	-1,4	7,6	-1,0	DAUR34